



~~14. 10. 269~~

14. 10. 270

~~14. 10. 269~~

8 B 5




LXIV

Buhen

C. 6

22. 1. 1881



STORIA
NATURALE,
GENERALE, E PARTICOLARE

DEL SIG.

DE BUFFON

INTENDENTE DEL GIARDINO DEL RE,
DELL' ACCADEMIA FRANCESE, E
DI QUELLA DELLE SCIENZE, ec.

Colla Descrizione

DEL GABINETTO DEL RE

DEL SIG.

DAUBENTON

CUSTODE E DIMOSTRATORE
DEL GABINETTO DI STORIA NATURALE.

Trasportata dal Francese.

TOMO XXVIII.

IN MILANO. MDCCLXXIII.
APPRESSO GIUSEPPE GALEAZZI
REGIO STAMPATORE.
Con licenza de' Superiori, e Privilegio.





STORIA³ NATURALE.

NOMENCLATURA DELLE SCIMIE.



Scorre l'ammaestrare Scolari, o il parlare a uomini sono due cose differenti, poichè i primi ricevono avidamente e senza diffamina l'arbitrario egualmente che il reale, il falso egualmente che il vero, qualora ciò venga loro presentato a guisa di documenti, e i secondi al contrario rigettano con dispetto siffatti documenti, allorchè non li comprendono ad un sodo fondamento appoggiati, così noi non ci serviremo di nessuno de' metodi, che sono stati immaginati per ammassare sotto lo stesso nome di *Scimia* una moltitudine d'animali di specie diverse ed anche remotissime.

Io chiamo *Scimia* un animale senza coda, che ha la faccia piatta, e i denti, le mani, le dita e le unghie simili a quelle dell'uomo.

A 2

e che , com' esso , cammina ritto su due piedi . Questa definizione cavata dalla natura stessa dell' animale e da' suoi rapporti con quella dell' uomo , esclude , come vedesi , tutti gli animali forniti di coda ; tutti quelli , che hanno la faccia rilevata o il muso lungo ; tutti quelli , che hanno le ugne curve , adunche o aguzze ; tutti quelli , che camminano più volentieri su quattro che su due piedi . Posta questa nozione fissa e precisa , veggiam ora quante specie esistano d' animali , a cui debbasi dare il nome di *Scimia* . Gli Antichi non ne conoscevano che una sola : il *pithecos* de' Greci , e la *simia* de' Latini sono una vera *scimia* e dinotano quella appunto , su cui Aristotele , Plinio e Galieno hanno fatte tutte le loro fisiche comparazioni , e fondate tutte le relazioni della scimia all' uomo . Ma questo piteco , questa scimia degli Antichi , sì rassomigliante all' uomo per l' esteriore struttura , e più simile ancora per l' interna organizzazione , n' è tuttavia differente per un attributo , che sebbene relativo in se stesso , non è qui non per tanto meno essenziale , cioè per la grandezza . La statura dell' uomo in generale sorpassa i cinque piedi , e quella del piteco non arriva che a un quarto in circa di tale altezza . Se questa scimia fosse stata anche più simile all' uomo , gli Antichi avrebbero avuta ragione di non riguardarla che come un

Nomenclatura delle Scimie. 5

omiciatto, un nano imperfetto, un pigmeo capace tutto al più di combattere colle gru, mentre l'uomo fa domar l'elefante e vincere il leone.

Ma dopo gli Antichi, dopo la scoperta delle parti meridionali dell' Africa e delle Indie si è trovata un' altra scimia fornita di questo attributo di grandezza, una scimia alta e forte egualmente che l'uomo, e ardente del pari per le donne che per le sue femmine; una scimia che sa portar armi, che si serve di sassi per attaccare, e di bastoni per difendersi, e che d'altra parte rassomiglia anche più all'uomo che al piteco; imperciocchè indipendentemente dal non aver essa la coda, dall' esser piatta la sua faccia, dall' esser le sue braccia, le sue mani, le sue dita, le sue ungue simili alle nostre, e dal camminar ch'ella fa sempre ritto su due piedi; ha in oltre una specie di viso e di fattezze, che s'accostano a quelle dell'uomo, ha orecchie della stessa figura, capelli sulla testa, barba al mento, e pelo nè più nè meno nello stato di natura. Perciò gli abitanti del suo paese, cioè gl' Indiani colti han creduto di doverla associare alla specie umana col nome d'*orang-outang*, che significa *uomo selvaggio*: i Negri però, che sono uomini selvaggi, e deformati quasi del pari che tali scimie, e che non fanno consistere l'esser più o men uomo nell' esser più o men colto, hanno ad essi

dato un nome proprio [*Pongo*], cioè un nome di bestia e non già d'uomo. Ma questo orang-outang, o questo pongo non è in realtà che un animale, il quale però è singolarissimo, e l'uomo non può vederlo senza rientrare in se stesso, senza riconoscersi, e senza convincersi che il suo corpo non è la parte più essenziale della sua natura.

Ecco dunque due animali, cioè il piteco e l'orang-outang, a' quali debbesi applicare il nome di scimia: ve n'ha però un terzo, che merita pure di portar questo nome, benchè sia difforme sì relativamente all'uomo che alla scimia. Questo animale, ch'è stato finora sconosciuto, e che venne portato dalle Indie orientali sotto il nome di *Gibbone*, cammina ritto su due piedi come gli altri due, ed ha piatta la faccia: egli è pure senza coda; ma le sue braccia invece d'esser proporzionate all'altezza del corpo, come quelle dell'uomo, o per lo meno come quelle dell'orang-outang o del piteco, sono d'una sì smisurata lunghezza, che l'animale stando ritto sopra i suoi due piedi, tocca terra tuttavia colle sue due mani senza incurvare il corpo e senza piegar le gambe. Questa scimia è la terza e l'ultima, a cui si debbe dar questo nome: ella è in questo genere una specie moltruosa ed eteroclita, siccome lo è nella specie umana la razza degli uomini

dalle gambe grosse, detta di *San Tommaso* (a).

Dopo le scimie ci si presenta un'altra famiglia d'animali, che indicheremo sotto il nome generico di *Babbuino*, e per distinguerli chiaramente da tutti gli altri, diremo che il babbuino è un animale dalla coda corta, dalla faccia allungata, dal muso largo e rilevato, con denti canini più grossi a proporzione di quelli dell'uomo, e con callosità sulle natiche. Per mezzo di questa definizione escluderemo da questa famiglia tutte le scimie, che sono affatto sprovviste di coda, tutt'i guenoni, tutt'i sapajous e i saguini, che non hanno la coda corta, ma che l'hanno tutti egualmente lunga o più lunga del corpo, e tutt'i makis, i loris e gli altri quadrumani, che hanno il muso sottile, e aguzzo. Gli Antichi non ebbero giammai un nome proprio per dinotare siffatti animali. Aristotele è il solo che sembra aver indicato uno di questi babbuini col nome di *Simia porcaria* (b); nondimeno egli non ne

A 4

(a) Vedi il Discorso sulle varietà della specie umana. Tomo V. di quest'Opera.

(b) Nota. Questa denominazione *Simia porcaria*, che non si trova che in Aristotele, e che non è stata adottata da nessun altro Autore, era nondimeno un'ottima espressione per dinotare il babbuino, poichè ho trovato nei Viaggiatori, che probabilmente non avevano mai letto Aristotele,

dà che un' indicazione molto indiretta. Gl' Italiani sono stati i primi a chiamarlo *babbuino*. I Tedeschi l'hanno appellato *bavion*; i Francesi *babouin*, e tutti gli Autori, che in questi ultimi secoli hanno scritto in latino, l'hanno dinotato col nome di *papio*. Noi ancora adunque lo chiamerem *papione* per distinguerlo dagli altri babbuini, che si sono di poi trovati nelle provincie meridionali dell' Africa e delle Indie. Noi conosciamo tre specie di questi animali; 1. il *papione* o *babbuino* propriamente detto, di cui pur ora abbiám parlato, che si trova nella Libia, nell' Arabia, ec., e che verosimilmente è la *simia porcaria* d'Aristotele; 2. il *mandrillo*, ch' è un babbuino anche più grande del *papione*, colla faccia pavonazza, che ha il naso e le guance solcate di rughe profonde e oblique, e che si trova nella Guinea e nelle parti più calde dell' Africa; 3. l'*ovanderò*, ch' è men grosso del *papione*, e men grande del *mandrillo*, il cui corpo è men pastuto, e che ha la testa e tutta la faccia circondata d'una specie di chioma lunghissima e assai folta: esso trovasi in Ceylan, nel Malabar, e nelle altre provincie

lo stesso paragone del muso del babbuino con quello del porco, e d'altra parte questi due animali si rassomigliano alquanto per la figura del corpo.

Nomenclatura delle Scimie.

meridionali delle Indie. Ecco pertanto tre scimie e tre babbuini ben definiti, ben separati, e tutti e sei distintamente differenti gli uni dagli altri.

Ma siccome la Natura non conosce le nostre definizioni, e non ha giammai disposte le sue opere per via di congerie, nè gli eseri per via di generi, e siccome per lo contrario essa suol sempre procedere per gradi, e il suo piano è formato per via di continui digradamenti, e s'estende in tutt'i versi, così tra 'l genere della scimia (a) e quello del babbuino debbesi trovare qualche specie intermedia, che precisamente non sia nè l'una nè l'altro, e che non ostante partecipi d'amendue. Questa specie intermedia esiste in fatti, ed è l'animale, che noi chiamiamo *Magot*: esso si trova collocato tra le nostre due definizioni; fa il digradamento tra le scimie e i babbuini; è diverso dalle prime perchè ha il muso allungato e de' grossi denti canini; è diverso dai secondi, perchè realmente è affatto privo di coda, benchè abbia

A 5

(a) *Nota.* Il gibbone comincia già un digradamento tra le scimie e i babbuini, perchè ha delle callosità sulle natiche come i babbuini, e le ungue de' piedi posteriori più puntute di quelle dell'orang-outang, che non ha callosità sulle natiche, e che ha le ungue piatte e ritondate come l'uomo.

una piccola appendice di pelle che ha l'apparenza d'un'origine di coda; per conseguenza egli non è nè scimia nè babbuino, e nel tempo stesso tiene della natura d'amendue. Questo animale, ch'è molto comune nell'alto Egitto, egualmente che nella Barberia, era noto agli Antichi. I Greci e i Latini lo chiamarono *cinocefalo*, perchè il suo muso rassomiglia molto a quello d'un cane alano. Per rappresentare adunque questi animali, ecco l'ordine, con cui si debbono distribuire: l'*orang-outang* o *pongo*, prima scimia; il *piteco*, seconda scimia; il *gibbone*, terza scimia; il *cinocefalo* o *magot*, quarta scimia o primo babbuino; il *papione*, primo babbuino; il *mandrillo*, secondo babbuino; l'*ovanderò*, terzo babbuino. Quest'ordine non è nè arbitrario nè fittizio, ma relativo alla scala stessa della Natura.

Dopo le scimie e i babbuini vengono i guenoni; così io chiamo, seguendo il nostro vecchio idioma, gli animali, che rassomigliano alle scimie o ai babbuini, ma che hanno lunghe code, cioè code egualmente lunghe o più lunghe che il corpo. La parola *guenone* in questi ultimi secoli ha avuto due significati diversi da quello che noi le diamo: la voce *guenone* è stata usata generalmente per dinotare le scimie di piccola statura (a),

(a) Le differenze delle scimie si prendono in tran-

Nomenclatura delle Scimie. 11

e nel tempo stesso è stata adoperata particolarmente per nominare la femmina della scimmia: ma più anticamente noi appellavamo *scimie* o *magotti* le scimie senza coda, e *guenoni* o *mone* quelle che avevano una lunga coda: potrei ciò provare con alcuni passi de' nostri Viaggiatori (a) dei secoli sedicesimo e diciassettesimo. La parola stessa di *guenone* non si scosta, e forse è derivata da *kēbos* o *kēpos*, nome che i Greci davano alle scimie dalla coda lunga. Questi *kēbos* o *guenoni* son più piccoli e men forti dei babbuini e delle scimie; essi si possono facilmente distinguere dagli uni e dalle altre per questa differenza, e massimamente per la loro lunga coda. Si

A 6

cese principalmente dalla loro grandezza; poichè le grandi sono semplicemente chiamate *scimmie*, o abbian coda, o ne sian prive, o abbian il muso lungo come un cane, o l'abbian corto; e le scimmie, che son piccole, sono appellate *guenoni*. *Mémoires pour servir à l'Histoire des animaux*, pag. 120.

- (a) Trovansi al Senegal varie specie di scimmie, come *guenoni*, con una lunga coda, e *magotti*, che ne son privi. *Voyage de le Maire*, pag. 101. Nelle montagne dell'America meridionale si trova una specie di *mone*, che i Selvaggi chiamano *cacayen*, della stessa grandezza che le comuni, senz'altra differenza se non che hanno barba al mento..... Con queste *mone* si trovano delle piccole bestie gialle, appellate *sagvini*. *Singularités de la France antarctique*, par Thewet, pag. 103.

possono pure facilmente separare dai makis, perchè non hanno il muso aguzzo, e perchè invece di sei denti incisivi, che hanno i makis, essi non ne hanno che quattro come le scimie e i babbuini. Noi ne conosciamo nove specie, le quali indicheremo ciascuna con un nome diverso, affine di evitarne ogni confusione. Tali nove specie di guenoni sono: 1. i macachi; 2. i pataffi; 3. i malbruchi; 4. i mangabei; 5. la mona; 6. il callitricce; 7. il mustace; 8. il talapoino; 9. il douc. Gli antichi Greci non conoscevano che due di questi guenoni, cioè la mona e il callitricce, che sono originarj dell' Arabia e delle parti settentrionali dell' Africa; eglino non avevano veruna cognizione degli altri, poichè non si trovano che nelle provincie meridionali dell' Africa e delle Indie orientali, paesi a' tempi d' Aristotele interamente sconosciuti. Questo gran Filosofo e i Greci in generale usavano tanta attenzione per non confondere gli esseri con nomi comuni e perciò equivochi, che avendo chiamata *pithecos* la scimia senza coda, appellarono *kébos* il guenone o scimia dalla lunga coda; siccome eglino avevano conosciuto che questi animali erano di specie differenti ed anche molto remote, così avevano dato a ciascuna di loro un nome proprio, il qual nome era tratto dal carattere più apparente: tutte le scimie e i babbuini, che

Nomenclatura delle Scimie. 13

egolino conoscevano , cioè il *piteco* o *scimia* propriamente detta , il *cinocefalo* o *magot* , e la *simia porcaria* o *papione* , hanno il pelo d'un colore presso a poco uniforme: al contrario il *guenone* , che qui chiamiamo *mona* , e che i Greci appellavano *kébos* , ha il pelo variato di diversi colori ; volgarmente esso vien anche chiamato la *scimia variata* ; a' tempi d'Aristotele era la specie di *guenone* la più comune e la meglio conosciuta , e da siffatto carattere è derivato il nome di *kébos* , che in greco dinota la varietà nei colori . Tutti gli animali pertanto della classe delle scimie , de' babbuini e de' *guenoni* , indicati da Aristotele , si riducono a quattro , il *pithecos* , il *cynocephalos* , la *simia porcaria* , e il *kébos* ; i quali animali con fondamento noi crediamo che realmente rappresentino oggigiorno il *piteco* o *scimia* propriamente detta , il *magot* , il *papione* o *babbuino* propriamente detto , e la *mona* ; imperciocchè non solo i caratteri particolari , che loro dà Aristotele , convengono loro effettivamente , ma ancora perchè le altre specie , che abbiamo accennate , e quelle altresì che accenneremo , dovevano necessariamente essete a lui sconosciute , poichè son nate ed esclusivamente abitanti di terre , ove i Greci Viaggiatori non eransi per anco a' suoi tempi inoltrati .

Due o tre secoli dopo quello d'Aristotele trovansi negli Autori Greci due nuovi nomi ,

callithrix e *cercopithecus*, tutt'edue relativi ai *guenoni* o *scimie* dalla lunga coda. A misura che si facevano sulla terra nuove scoperte e nuovi avanzamenti verso il mezzodì sì in Africa come in Asia, trovavansi nuovi animali ed altre specie di *guenoni*; e siccome la maggior parte di siffatti *guenoni* non avevano, come il *kébos*, i colori variati, così i Greci immaginarono di fare un nome generico *cercopithecus*, cioè *scimia rodada*, per dinotare tutte le specie di *guenoni* o *scimie* dalla coda lunga; ed avendo notato tra tali novelle specie un *guenone* d'un pelo verdiccio e di color vivo, chiamarono siffatta specie *callithrix*, che significa *bel pelo*. Questo *callitric* si trova in fatti nella parte meridionale della Mauritania, e nelle terre vicine al Capo-verde, ed è il *guenone*, che volgarmente è conosciuto sotto il nome di *scimia verde*. Avendo noi però in quest'Opera rigettate tutte le denominazioni composte, gli abbiám conservato il suo antico nome *callitric*.

Riguardo alle altre sette specie di *guenoni*, che di sopra abbiamo indicate co i nomi di *macaco*, *patasso*, *malbruko*, *mangabei*, *mustace*, *talapoino* e *douc*, esse erano incognite ai Greci ed ai Latini. Il *macaco* è natío del Congo, il *patasso* del Senegal, il *mangabei* di Madagascar, il *malbruko* di Bengala, il *mustace* della Guinea,

Nomenclatura delle Scimie. 15

il talapoino di Siam, e il douc della Cocincina. Tutte queste terre erano egualmente sconosciute presso gli Antichi, e noi abbiamo avuta una somma cura di conservare agli animali, ch'ivi sono stati trovati, i nomi proprj del lor paese.

Ma siccome la Natura procede costantemente nelle sue operazioni, e non va giammai per salti, ma sempre gradatamente, così tra i babbuini e i guenoni si trova una specie intermedia, come quella del magot lo è tra le scimie e i babbuini. L'animale che riempie quest'intervallo, e forma questa specie intermedia, rassomiglia molto ai guenoni, massimamente ai macachi, e nel tempo stesso ha il muso molto largo e la coda corta come i babbuini. Non sapendo noi ch'egli porti altro nome, l'abbiam chiamato *Maimone* per distinguerlo dagli altri: egli trovasi in Sumatra, ed è il solo fra tutti gli animali sì babbuini che guenoni, la cui coda sia sfornita di pelo; e per questa ragione gli Autori, che ne han parlato, l'hanno dinotato colla denominazione di *scimia dalla coda di porco*, o di *scimia dalla coda di ratto*.

Ecco gli animali dell'antico Continente, a' quali si è dato il nome comune di *scimia*, bench'essi sieno non solo di specie remote, ma anche di generi assai diversi; e ciò che ha accresciuto l'errore e la confusione, si è

che questi stessi nomi di *scimia*, di *cinocéfalo*, di *kebe* e di *cercopiteco*, nomi fatti dai Greci mille e cinquecent'anni sono, sono stati dati ad animali d'un nuovo Mondo, che non sono stati scoperti che dopo due o tre secoli. Non dubitavasi che non esistesse nelle parti meridionali del nuovo Continente alcuno degli animali dell'Africa e delle Indie orientali. Si son trovate in America bestie con mani e con diti, e questo sol rapporto è stato bastevole perch'esse fossero chiamate *scimie*, senza riflettere che per trasferire un nome convien per lo meno che il genere sia lo stesso, e che per applicarlo con aggiustatezza sia d'uopo parimente che la specie sia identifica. Or questi animali d'America, di cui noi faremo due classi sotto i nomi di *sapajous* e di *sagoini*, sono differentissimi da tutte le scimie dell'Africa e dell'Asia; e in quella guisa che nel nuovo Continente non trovansi nè scimie, nè babbuini, nè guenoni, così non esistono nè *sapajous*, nè *sagoini* nell'antico. Quantunque abbiamo già esposti questi fatti in generale nel nostro discorso sopra gli animali dei due Continenti, ora possiam provarli in una maniera più particolare, e dimostrare che le diciassette specie, alle quali si possono ridurre tutti gli animali, chiamati *scimie* nell'antico Continente, e di dodici o tredici, alle quali si è applicato questo nome

nel nuovo, nessuna è la stessa, nè si trova egualmente in ambedue; imperciocchè dalle diciassette specie dell'antico Continente convien separare le tre o quattro scimie, che certamente non si trovano in America, e alle quali i sapajous e i sagoini non rassomiglian punto. 2. Convien separarne i tre o quattro babbuini, che son molto più grossi dei sapajous e dei sagoini, e che sono altresì d'una differentissima figura. Non restanvi adunque che i nove guenoni, a' quali essi si possono paragonare. Or tutt' i guenoni hanno, egualmente che le scimie e i babbuini, de' caratteri generali e particolari, che li separano interamente dai sapajous, e dai sagoini: il primo di siffatti caratteri è d'aver le natiche pelate e delle callosità naturali e inerenti a tali parti: il secondo è d'aver delle borse al basso delle guance, ov' essi possono conservare i loro alimenti; e il terzo d'aver il tramezzo delle narici stretto, e le stesse narici aperte al disotto del naso come quelle dell'uomo. I sapajous e i sagoini non hanno nessuno di tai caratteri: eglino han tutti il tramezzo delle narici molto grosso, le narici aperte su i lati del naso e non già al disotto; hanno del pelo sulle natiche, sulle quali non vedesi veruna callosità; parimente non hanno borse alle guance: per lo che essi son differenti dai guenoni non solo per la specie, ma anche pel ge-

nere , poichè non hanno nessuno dei caratteri generali , che a tutti essi son comuni: e questa differenza nel genere ne suppone necessariamente delle molto maggiori nelle specie , e dimostra ch'esse sono rimotissime .

Adunque molto mal a proposito si è dato il nome di *scimia* e di *guenone* ai *sapajous* e ai *sagoini* ; era d'uopo loro conservare i proprj lor nomi , e invece di accoppiarli alle scimie , cominciare dal paragonarli tra loro . Queste due famiglie son differenti l'una dall'altra per un carattere rimarchevole : tutt' i *sapajous* si servono della lor coda come d'un dito per attaccarsi a qualche cosa ed anche per afferrare ciò che non possono prender colla mano ; i *sagoini* al contrario non possono servirsi della loro coda per tale uso ; la loro faccia , le loro orecchie e il lor pelo sono pure differenti . Se ne possono dunque fare facilmente due generi distinti e separati .

Senza servirci di denominazioni , che non si possono applicare che alle scimie , ai *bahubini* ed ai *guenoni* ; senza far uso di nomi che loro appartengono e che non si debbono dare ad altri , abbiain creduto di dover indicare tutt' i *sapajous* e tutt' i *sagoini* co' nomi proprj , ch'essi hanno nel lor paese natío . Noi conosciamo sei o sette specie di *sapajous* , e sei specie di *sagoini* , la maggior parte delle quali hanno delle varietà . Ne daremo la storia e la descrizione in questo Tomo . Ab-

biamo ricercati colla maggior cura i loro nomi in tutti gli Autori, e massimamente ne' Viaggiatori che furono i primi ad indicarli. In generale, quando non abbiain potuto sapere il nome, che ciascun d'essi porta nel suo paese, abbiain creduto di doverlo ricavare dalla natura stessa dell' animale, cioè da un carattere, che solo fosse bastevole per farlo riconoscere e distinguere da tutti gli altri. In ciascun articolo si vedranno le ragioni, che ci han fatti adottare siffatti nomi.

Quanto alle varietà, le quali nell' intera classe di questi animali sono forse più numerose che le specie, si troveranno esse pure accuratissimamente paragonate a ciascuna delle loro proprie specie. Noi conosciamo e abbiain avuti, la maggior parte vivi, quaranta di questi animali più o meno tra loro differenti: ci è sembrato ch' essi si debbano ridurre a trenta specie, cioè tre scimie, una specie intermedia tra le scimie e i babbuini, tre babbuini, una specie intermedia tra i babbuini e i guenoni, nove guenoni, sette sapajous, e sei sagoini, e che tutti gli altri animali non si debbano, almeno per la maggior parte, considerare che come varietà; ma siccome non siamo assolutamente sicuri che alcune di tali varietà non possano esser infatti specie distinte, procureremo pertanto di dar loro altresì de' nomi, che non saranno che precarj, supposto che gli animali non

fiano che varietà, e che potranno divenir proprij e specifici, quand' essi fiano realmente specie dittinte e separate.

A proposito di tutte queste bestie, alcune delle quali rassomigliano sì grandemente all' uomo, consideriamo per un momento gli animali della terra sotto un nuovo punto di vista. Senza una bastevol ragione si è dato generalmente a tutti il nome di quadrupedi. Se le eccezioni non fossero che in picciol numero, non biasimeremmo l'applicazione di tale denominazione. Abbiain detto e sappiamo che le nostre definizioni e i nostri nomi, per quanto possan essere generali, non comprendono mai tutto, che esistono sempre degli esseri al di qua o al di là di quelli, che son denominati, che se ne trovano d'intermedj, che varj, benchè situati nel mezzo degli altri, non lasciano di sfuggire dalla lista, che il nome generale, che si vorrebbe loro applicare, è una formola imperfetta, una somma di cui spesse volte essi non fanno parte, perchè la Natura non debbe mai esser rappresentata che per via di unità, e non per via d'aggregati, perchè l'uomo non ha immaginati i nomi generali che per accomodarli alla sua memoria e per procurare di supplire alla troppo piccola capacità del suo intendimento, perchè in seguito egli ne ha fatto abuso, riguardando questo nome generale come qualche cosa di

reale, perchè finalmente ha voluto estenderlo ad esseri ed anche a classi di esseri, che richiedevano un altro nome. Io posso recarne l'esempio e la prova, senza uscir dall'ordine dei quadrupedi, che fra tutti gli animali son quelli che l'uomo conosce meglio, e a' quali per conseguenza egli era in istato di dare le denominazioni più precise.

Il nome di *quadrupedi* suppone che l'animale abbia quattro piedi: s'egli manca di due piedi, come il lamantino, non è più quadrupede; se ha braccia e mani come la scimia, non è più quadrupede; se ha ale come il pipistrello, non è più quadrupede, e si fa abuso di questa generale denominazione quando vien applicata a siffatti animali. Perchè siavi la precisione nelle parole richiedesi la verità nelle idee ch'esse rappresentano. Facciamo per le mani un nome simile a quello che si è fatto pe' piedi, e allor diremo con verità e con precisione che l'uomo è il solo che sia bimana e bipede, perchè è il solo che abbia due mani e due piedi; che il lamantino non è che bimana; che il pipistrello non è che bipede, e che la scimia è quadrumana. Applichiamo però queste nuove denominazioni generali a tutti gli esseri particolari, a' quali esse convengono, poichè questa è la maniera, con cui debbesi ognora veder la Natura; troveremo che da dugento specie in circa d'animali,

che popolano la superficie della terra, e a' quali si è dato il nome di *quadrupedi*, vi sono primieramente trentacinque specie di scimie; babbuini, guenoni, sapajous, sagoini e makis, che se ne debbono separare, perchè son quadrumani, che a queste trentacinque specie convien aggiugnere quelle del loris, del sarigua, della marmosa, del rajopollino, del tarsiere, del falangere ec., che son pure quadrumani come le scimie, i guenoni, i sapajous, e i sagoini; che per conseguenza essendo per lo meno di quaranta specie (a) la lista de' quadrumani, il numero reale de' quadrupedi è già ridotto d'un quinto; che in seguito levandone dodici o quindici specie di bipedi, cioè, i pipitrelli e i cani-volanti, i cui piedi anteriori sono piuttosto ale che piedi, e levandone pure quattro gerboise, che non possono camminare che su i piedi posteriori, perchè gli anteriori son troppo corti; levandone anche il lamantino, che manca dei piedi posteriori, le morse, il dugone e le foche, alle quali essi sono inutili, l'accennato numero de' quadrupedi si troverà diminuito quasi

(a) *Nota.* Noi non diciam troppo, non contandone che quaranta specie nella lista de' quadrumani, poichè nei guenoni, sapajous, sagoini, sarigue, ec. vi sono molte varietà, che potrebbero non essere specie realmente distinte.

d'un terzo; e se volessimo sottrarne anche gli animali, che si servono de' piedi anteriori a guisa di mani, come gli orsi, le marmotte, i coati, gli scojattoli, i ratti, e molti altri, la denominazione di quadrupede parrà mal applicata a più della metà degli animali: e in fatti i veri quadrupedi sono i solipedi e i piefforcuti; tostochè si discende alla classe de' sessipedi, trovansi de' quadrumani o de' quadrupedi ambigui, che si servono de' lor piedi anteriori come di mani; e che debbon esser separati e distinti dagli altri. Vi sono tre specie di solipedi, il cavallo, il zebro e l'asino; aggiugnendovi l'elefante, il rinoceronte, l'ippopotamo e il cammello, i cui piedi benchè terminanti con ugne son solidi e non servono loro che per camminare; si hanno già sette specie, alle quali il nome di quadrupede si conviene perfettamente. Vi ha un numero molto maggiore di piefforcuti che di solipedi: i buoi, i montoni, le capre, le gazelle, i bubali, i capri selvatici, il lama, la vigogna, la giraffa, la gran bestia, il renne, i cervi, i daini, i capriuoli ec. son tutti piefforcuti; e compongono in tutto un numero di quaranta specie in circa. Onde ecco già cinquanta animali, cioè dieci solipedi e quaranta piefforcuti, a cui il nome di quadrupede è stato ben applicato. Nei sessipedi, il leone, la tigre, le pantere, il leopardo,

la lince, il gatto, il lupo, il cane, la volpe, l'iena, le civette, il tasso, le faine, le donnole, i furetti, i ricci, gl'istrici, i tatus, i formichieri e i porci, che fanno il digradamento tra i fessipedi e i piefforcuti, formano un numero di più di quaranta altre specie, alle quali parimente il nome di quadrupede si conviene, con tutto il rigore del suo significato; imperciocchè sebbene questi animali abbiano il piede anteriore diviso in quattro o cinque diti, nondimeno non se ne servono giammai come di mano. Ma tutti gli altri fessipedi, che si servono de' lor piedi anteriori per afferrare e per recare alla bocca qualche cosa, non son puri quadrupedi. Queste specie, che son pure al numero di quaranta, formano una classe intermedia tra i quadrupedi e i quadrumani, e non sono precisamente nè gli uni nè gli altri. Per la qual cosa vi ha realmente più d'un quarto degli animali, a cui il nome di quadrupede disconviene, e più d'una metà, a cui esso non conviene in tutta l'estensione del suo significato.

I quadrumani riempiono il grand'intervallo, che si trova tra l'uomo e i quadrupedi. I bimanii sono un termine medio nella distanza anche maggiore dell'uomo ai cetacei (a):
i bi-

(a) Nota. In questa frase e in tutte le altre simili, non intendo parlare che dell'uomo fisico,

i bipedi con ale fanno il digradamento dai quadrupedi agli uccelli, e i fessipedi, che si servono de' lor piedi come di mani, riempiono tutt' i gradi, che si trovano tra i quadrumani e i quadrupedi. Ma ci fermiam troppo su questo punto di vista; per quanto esso possa esser utile alla cognizione distinta degli animali, lo è anche più per l' esempio e per la nuova prova, che ci dà, che non v' ha nessuna delle nostre definizioni che sia precisa, nessuno de' nostri termini generali che sia esatto, quando si viene ad applicarli in particolare a cose o ad esseri, ch' essi rappresentano.

Ma per qual ragione questi termini generali, che sembrano essere il miglior ritrovato del pensiero, sono sì difettosi? Perchè mai queste definizioni, che sembrano non essere che i puri risultati della combinazione degli esseri, sono sì fallaci nell' applicazione? E' egli un errore necessario, un difetto di rettitudine nello spirito umano? O non è piuttosto una semplice incapacità, una pura impotenza di combinare ed anche di vedere ad un tempo un gran numero di cose? Paragoniamo le opere della Natura colle opere dell' uomo, cerchiamo come operino tuttedue, e veggiamo se lo spirito,

Tom. XXVIII. B

cioè, della forma del corpo dell' uomo, paragonata alla forma del corpo degli animali.

per quanto attivo e per quanto esteso egli sia, possa andar del pari e seguir le stesse tracce, senza perdersi esso pure o nell' immensità dello spazio, o nelle tenebre del tempo, o nel numero infinito delle combinazioni degli esseri. Diriga l'uomo i passi del suo spirito sopra un oggetto qualunque esso sia, s'egli vede rettamente, prende la linea dritta, trascorre lo spazio minore, e impiega il minor tempo possibile per giugnere alla sua meta. Or quante riflessioni e quante combinazioni non gli son necessarie perchè non entri in linee oblique, perchè sappia evitare le false strade, i viottoli, e i sentieri vortici, i quali tutti si presentano i primi e in sì gran numero che la scelta del vero sentiero suppone la maggiore agiustatezza di discernimento? Ciò nondimeno è possibile, cioè, non oltrepassa le forze d'un buono spirito; egli può camminar dritto sulla sua linea e senza sviarsi; ecco la sua maniera più sicura e più ferma di procedere: egli va per dritta sopra una linea per arrivare ad un punto; se vuole afferrare un altro punto, non vi può giugnere che per un'altra linea: la trama delle sue idee è un sottil filo, che s'estende in lunghezza senz'altre dimensioni: la Natura all'opposto non fa un sol passo, che non sia rivolto in tutt'i versi; mentre va innanzi, s'estende da lato e si solleva al di sopra; tra-

scorre e riempie ad un tempo le tre dimensioni ; e mentre l'uomo non giugne che ad un punto , essa arriva al solido , ne abbraccia il volume e penetra la massa in tutte le sue parti . Che fanno i nostri Fidia , allorchè danno una figura alla materia informe ? A forza d' arte e di tempo arrivano a fare una superficie , che rappresenta esattamente l'esterno dell' oggetto che si hanno proposto : ciascun punto di tale superficie , ch' eglino han creata , costò loro mille combinazioni : il lor genio camminò diritto su tante linee , quante fattezze vi sono nella loro figura ; il menomo sviamento l'avrebbe difformata . Quel marmo adunque sì ben effigiato che sembra respirare , non è che una moltitudine di punti , a' quali l'Artefice non è arrivato che con fatica e successivamente , poichè lo spirito umano non afferrando ad un tempo che una sola dimensione , e i nostri sensi non applicandosi che alle superficie , noi non possiam penetrar la materia e non sappiamo che intaccarla leggermente . La Natura al contrario sa agitarla e moverla a fondo : ella produce le sue forme con atti quasi istantanei ; ella le sviluppa e le estende ad un tempo nelle tre dimensioni ; nel tempo stesso che il suo moto perviene alla superficie , le forze penetranti , di cui è animata , operano nell' interno ; ciascuna molecola è penetrata ; il più piccol atomo , tosto

ch' ella vuole impiegarlo, è forzato ad obbedire. Ella dunque opera in tutt' i versi, lavora all' innanzi, all' indietro, al basso, all' alto, a dritta, a sinistra, da tutt' i lati in una volta, e per conseguenza abbraccia non solo la superficie, ma il volume, la massa, il solido intero in tutte le sue parti. Onde qual differenza nella produzione, qual paragone della statua al corpo organizzato, ma quale ineguaglianza eziandio nel potere, quale sproporzione negli strumenti? L'uomo non può impiegare che la forza che ha; limitato a una piccola quantità di moti, ch' egli non può comunicare che per mezzo dell' impulsione, non può agire che sulle superficie, poichè in generale la forza d' impulsione non si trasmette che pel contatto delle superficie. Egli adunque non vede, e non tocca che la superficie dei corpi, e quando per procurare di meglio conoscerli gli apre, li divide e li separa, non vede e non tocca ancora che superficie: per penetrar l'interno, gli converrebbe aver una parte di quella forza, che agisce sulla massa, che fa la gravità, e ch' è il principale strumento della Natura. Se l'uomo potesse disporre di questa forza penetrante, come dispone di quella d' impulsione, se solamente avesse un senso che vi fosse relativo, vedrebbe il fondo della materia, e potrebbe disporla e ordinarla in picciolo, come la Natura la lavora.

in grande. Egli è adunque per mancanza di strumenti che l'arte dell'uomo non può accostarsi a quella della Natura: le sue figure, i suoi rilievi, i suoi quadri, i suoi disegni non sono che superficie o imitazioni di superficie, poichè le immagini, ch'egli riceve per mezzo de' suoi sensi, sono tutte superficiali, e non vi ha nessun mezzo di dare ad esse corpo.

Ciò, ch'è vero per le arti, lo è pure per le scienze; solamente esse sono men limitate, perchè lo spirito è il loro solo strumento, perchè nelle arti egli è subordinato ai sensi, e nelle scienze comanda ad essi, per quanto si tratta di conoscere e non d'operare, di paragonare e non d'imitare. Ora lo spirito benchè circoscritto da' sensi, benchè spesso abusato da' loro falsi rapporti, non è tuttavia nè minore nè meno attivo. L'uomo, che ha voluto esser sapiente, ha cominciato dal rettificare i sensi e dal dimostrare i loro errori: li trattò come organi meccanici, come strumenti che convien mettere alle prove per verificarli e per giudicare de' loro effetti: camminando in seguito colla bilancia in una mano e col compasso nell'altra, ha misurato il tempo e lo spazio, ha conosciute tutte le parti esterne della Natura, e non potendo penetrarne l'interno per via de' sensi, lo ha indovinato per via di paragoni e giudicato per via d'ana-

logie; ha trovato ch' esisteva nella materia una forza generale, differente da quella d'impulsione, una forza che non cade sotto i nostri sensi, e di cui per conseguenza noi non possiamo disporre, ma che la Natura impiega come suo agente universale; ha dimostrato che questa forza apparteneva egualmente a qualunque materia, cioè proporzionalmente alla sua massa o quantità reale; che questa forza, o piuttosto la sua azione s' estendeva a distanze immense, diminuendosi a proporzione che gli spazj s' aumentano; in seguito rivolgendo le sue viste su gli esseri viventi, ha veduto che il calore era un' altra forza necessaria alla loro produzione; che la luce era una materia viva, dotata d'un' elasticità e d'un' attività senza limiti; che la formazione e lo sviluppamento degli esseri organizzati si facino pel concorso di tutte queste forze riunite; che l'estensione e l'accrescimento de' corpi viventi o vegetanti segue esattamente le leggi della forza attrattiva, e s' opera in fatti accrescendone ad un tempo le tre dimensioni; che una stampa una volta formata dee per queste stesse leggi d'affinità produrne dell' altre del tutto simili, e queste parimente dell' altre, senza veruna alterazione della forza primitiva. Combinando in seguito questi caratteri comuni, questi attributi eguali della Natura vivente e vegetante, ha cono-

sciuto ch' esisteva nell' una e nell' altra un fondo inesaurito e sempre fecondo di sostanza organica e vivente, sostanza egualmente reale, egualmente durevole che la materia informe; sostanza ognor permanente nel suo stato di vita, come l'altra nel suo stato di morte; sostanza universalmente sparsa, che passando dai vegetabili agli animali per la via della nutrizione, e ritornando dagli animali ai vegetabili per quella della putrefazione, circola incessantemente per animare gli esseri: ha veduto che queste molecole organiche viventi esistevano in tutt' i corpi organizzati, ch' esse vi erano combinate in minore o maggior quantità colla materia morta, più abbondanti negli animali, ove il tutto è pieno di vita, più scarse ne' vegetabili, ove le parti morte dominano, e le vive sembrano estinte, ove le parti organiche oppresse dalle informi non hanno più nè moto progressivo, nè sentimento, nè calore, nè vita, e non si manifestano che per lo sviluppamento e per la riproduzione; e riflettendo sulla maniera con cui l'uno, e l'altra si operano, ha conosciuto che ciascun essere vivente è una stampa, in cui si lavorano le sostanze, di cui egli si nutre; che per mezzo di tali sostanze nella stampa lavorate si fa l'accrescimento del corpo; che il suo sviluppamento non è una semplice aumentazione del volume, ma un' estensione

in tutte le dimensioni, una penetrazione di materia nuova in tutte le parti della massa; che queste parti s'aumentano proporzionalmente al tutto, e il tutto proporzionalmente alle parti, e perciò la forma si conserva e dimora sempre la stessa fino al suo intero sviluppo; che finalmente il corpo avendo acquistata tutta la sua estensione, la stessa materia fino ad allora impiegata al suo accrescimento è dipoi rimandata, come superflua, da tutte le parti, in cui si era lavorata; e che riunendosi in un punto comune, vi forma un nuovo essere simile al primo, che non n'è diverso che dal piccolo al grande, e che non ha bisogno, per rappresentarlo, che di giugnere alle medesime dimensioni, sviluppandosi egli pure per la via della nutrizione. Egli ha conosciuto che l'uomo, il quadrupede, il cetaceo, l'uccello, il rettile, l'insetto, l'albero, la pianta, l'erba, si nutrono, si sviluppano e si riproducono colla stessa accennata legge; e che, se la maniera con cui si eseguiscano la loro nutrizione e la loro generazione pare sì differente, ciò avviene perch'essa, sebben dipendente da una causa generale e comune, pure non può esercitarsi che in un modo relativo alla forma di ciascuna specie d'esseri; e andando oltre [poichè abbisognarono de' secoli all'umano spirito per arrivare a queste grandi verità, dalle quali dipendo-

Nomenclatura delle Scimie. 33

no tutte le altre] non ha cessato di paragonare gli esseri ; ha loro dati de' nomi particolari per distinguerli gli uni dagli altri, e de' nomi generali per accoppiarli sotto uno stesso punto di vista ; prendendo il suo corpo pel modello fisico di tutti gli esseri viventi, e avendoli esaminati, misurati e paragonati in tutte le loro parti, ha veduto che la forma di tutto ciò, che respira, è presso a poco la stessa ; che anatomizzando la scimia si poteva dar l'anatomia dell'uomo ; che prendendo un altro animale, si trovava sempre il medesimo fondo d'organizzazione, i medesimi sensi, le medesime viscere, gli stessi ossi, la stessa carne, lo stesso moto nei fluidi, lo stesso giuoco, la stessa azione nei solidi ; ha trovato in tutti un cuore, vene ed arterie ; in tutti gli stessi organi di circolazione, di respirazione, di digestione, di nutrizione, d'evacuazione ; in tutti un materiale solido, composto dei medesimi pezzi presso a poco adunati nella stessa maniera ; e questo piano ognor lo stesso, ognor profeguito dall'uomo alla scimia, dalla scimia ai quadrupedi, dai quadrupedi ai cetacei, agli uccelli, ai pesci, ai rettili, questo piano, io dico, ben compreso dallo spirito umano, è un fedele esemplare della Natura vivente, e il punto di vista più semplice e più generale, sotto cui essa si possa considerare ; e quando si vuole estenderlo e pas-

sare da ciò che vive a ciò che vegeta, si vede questo piano, che dappprincipio non era variato che per via di digradamenti, sfigurarsi per gradi dai rettili agl' insetti, dagl' insetti ai vermi, dai vermi ai zoofiti, dai zoofiti alle piante; e benchè alterato in tutte le sue parti esteriori, conserva nondimeno lo stesso fondo e lo stesso carattere, i cui lineamenti principali sono la nutrizione, lo sviluppamento e la riproduzione; lineamenti generali e comuni ad ogni sostanza organizzata, lineamenti eterni e divini, che il tempo ben lungi dal cancellare e distruggere, non fa che rinnovare e rendere più evidenti.

Se da questo gran quadro di rassomiglianze, in cui vien rappresentato l'Universo vivente come non costituente che una sola famiglia, passiamo a quello delle differenze, ove ciascuna specie esige un sito isolato, e debb' avere il suo ritratto a parte; si comprenderà che, eccettuate alcune specie maggiori, come l'elefante, il rinoceronte, l'ippopotamo, la tigre, il leone, che debbono avere il lor posto separato, tutti gli altri animali sembrano unirsi co' lor vicini e formar de' gruppi di similitudini digradate di generi, che i nostri Nomenclatori han rappresentate per mezzo d'una rete di figure, le une delle quali si tengono pe' piedi, le altre pe' denti, per le corna, pel pelo e per

Nomenclatura delle Scimie. 35

altri rapporti anche più piccoli. E quelli pure, la cui forma non sembra la più perfetta, cioè la più simile alla nostra, le scimie, io dico, si rappresentano insieme, e già domandano occhi attenti per esser distinte le une dalle altre, perchè il privilegio della specie isolata si deduce meno dalla forma che dalla grandezza, e perchè l'uomo stesso, benchè di specie unica e infinitamente differente da tutte quelle degli animali, non essendo che d'una mediocre grandezza, è meno isolato, ed ha maggior numero di vicini che i grandi animali. Nella Storia dell'orang-outang si vedrà che se non si facesse attenzione che alla figura, si potrebbe egualmente riguardare quest'animale come la prima delle scimie o l'ultimo degli uomini, perchè trattane l'anima, non gli manca niente di tutto ciò, che noi abbiamo, e perchè pel corpo egli è men diverso dall'uomo che dagli altri animali, a' quali si è dato il nome di scimia.

L'anima, il pensiero e la parola non dipendono adunque della forma o dall'organizzazione del corpo: niente prova meglio che questo è un dono particolare e fatto per l'uomo solo, quanto il vedere che l'orang-outang non parla e non pensa, ed ha non ostante il corpo, le membra, i sensi, il cervello e la lingua interamente simili all'uomo, poich' egli può fare o contraffare tutt' i

movimenti, e tutte le azioni umane. Ma, si dirà, questo è forse difetto d'educazione, e fors'anche difetto del vostro retto giudicare: voi paragonate molto ingiustamente le scimie dei boschi all'uomo delle città: convien collocarlo allato dell'uom selvaggio, dell'uomo che nulla ha acquistato dall'educazione, e poi giudicare dell'uno e dell'altro. Si ha forse una giusta idea dell'uomo nello stato di natura pura? la testa coperta d'ispidi capelli, o d'una lana ricciuta; la faccia velata d'una lunga barba, sopraaccariata da due ciuffi di peli anche più grossolani, che per la loro larghezza e pel loro sporto raccorciano la fronte e le fanno perdere del suo carattere augusto, e non solo adombrano gli occhi, ma li rendono incavati e rotondi come quelli degli animali; le labbra grosse e innoltrate; il naso piatto; lo sguardo stupido o feroce; le orecchie, il corpo e le membra pelose; la pelle dura come un cuojo, nera o di color castagno; le ugne lunghe, grosse e adunche; una suola callosa a guisa di materia cornea sotto la pianta de' piedi: e per attributi del sesso, mammelle lunghe e molli, la pelle del ventre pendente fino sulle ginocchia; i fanciulli che s'avvoltono nelle lordure, e che si strascinano carponi; il padre e la madre affissi su' lor talloni, orridi a vedersi, e coperti d'un impastato fucidume: tale è l'ab-

bozzo d'un selvaggio Ottentotto, il quale abbozzo è tuttavia un ritratto abbellito, poichè vi ha maggior distanza dall' uomo nello stato di Natura pura all' Ottentotto; che dall' Ottentotto a noi. Caricate adunque ancor più il quadro, se volete paragonar la scimia all' uomo; aggiungetevi i rapporti d'organizzazione, le convenienze di temperamento, l'appetito veemente delle scimie maschie per le donne, la stessa struttura nelle parti genitali dei due sessi, i menstrui periodici nelle scimie femmine, i miscugli forzati o volontarj delle donne nere colle scimie, la cui produzione è rientrata nell' una e nell' altra specie; e vedete, supposto ch' esse non siano la medesima specie, quanto sia difficile l'afferrare l'intervallo che le separa.

Io confesso che, se non si dovesse giudicare che dalla forma, la specie della scimia potrebbe esser presa per una varietà nella specie umana. Il Creatore non ha voluto fare pel corpo dell' uomo un modello assolutamente diverso da quello dell' animale: ha compresa la sua forma, come quella di tutti gli animali, in un piano generale, ma nel tempo stesso gli ha data a parte una forma materiale simile a quella della scimia, e ha penetrato questo corpo animale col suo divin soffio: s'egli avesse compartito lo stesso favore, non dico alla scimia, ma alla spe-

c'è più vile e all' animale, che ci sembra il peggio organizzato, siffatta specie sarebbe ben tosto divenuta la rivale dell' uomo; vivificata dallo spirito ella avrebbe pensato e parlato, e avrebbe il primato sulle altre. Sebbene adunque vi sia molta rassomiglianza tra l' Ottentotto e la scimia, nondimeno l' intervallo, che li separa, è immenso, poichè interiormente egli è dotato del pensiero, e esteriormente della parola.

Chi potrà mai dire in che cosa l' organizzazione d' un fatuo sia diversa da quella d' un altr' uomo? Il difetto è certamente negli organi materiali, poichè il fatuo ha la sua anima com' un altro. Ora poichè da uomo a uomo, ove il tutto è interamente conforme e perfettamente simile, una differenza sì piccola, che non si può neppure afferrarla, basta per distruggere il pensiero o impedire ch' esso nasca, dee recar maraviglia ch' esso non sia giammai nato nelle scimmie, che non ne hanno nemmeno i principj?

L' anima in generale ha la sua azione propria e indipendente dalla materia: ma siccome è piaciuto al suo divino Autore d' unirli al corpo, così l' esercizio de' suoi atti particolari dipende dalla costituzione degli organi materiali: e questa dipendenza è provata non solamente dall' esempio del fatuo, ma anche dimostrata da quelli dell' amma-

lato in delirio, dell' uomo sano che dorme, del fanciullo appena nato, che non pensa ancora, e del vecchio decrepito che non pensa più. Sembra altresì che l'effetto principale dell' educazione sia meno d'istruir l'anima o di perfezionar le sue operazioni spirituali, che di modificar gli organi materiali e di procurar loro lo stato più acconcio all' esercizio del principio pensante: ora vi sono due educazioni, che mi sembrano dover essere accuratamente distinte, perchè i loro effetti son molto differenti; l'educazione dell' individuo, ch' è comune all' uomo e agli animali, e l'educazione della specie che non appartiene che all' uomo. Un giovane animale si per l'incitamento che per l'esempio, in poche settimane di età apprende tutto ciò che fanno il suo padre e la sua madre; al fanciullo però fa d'uopo di anni, perchè nascendo egli è senza paragone molto meno avanzato, men forte e men formato che i piccoli animali: in oltre ne' suoi primi tempi egli è un niente per lo spirito relativamente a ciò che debb' essere un giorno. Il fanciullo adunque è molto più lento che l'animale a ricevere l'educazione individuale; ma per questa stessa ragione egli divien suscettibile di quella della specie: i soccorsi moltiplicati, e le cure continue, che esige per molto tempo il suo stato di debolezza, intrattengono e accrescono l'affetto de' padri

e delle madri: eglino avendo cura del corpo coltivano lo spirito; il tempo che abbisogna al primo per renderlo forte, torna a profitto del secondo: la maggior parte degli animali rispetto alle facoltà del corpo sono a due mesi più avanzati di quello che possa essere il fanciullo a due anni. Fa d'uopo adunque che s'impieghi due volte più di tempo per la sua prima educazione, senza contare i frutti di quella che viene in seguito, senza considerare che gli animali si staccano da' lor figliuoli, tosto che li veggono in istato di provvedersi da se stessi, che appena se ne son separati, più non si conoscono; cosicchè prestissimo è dopo il momento, in cui gli ajuti non son più necessari, cessa ogni affetto, e ogni educazione. Essendo pertanto sì corto questo tempo d'educazione, il profitto non ne può esser che piccolissimo, ed è anche sorprendente che gli animali acquistino in due mesi tutto ciò, che loro è necessario per l'uso del resto della vita; e se noi supponessimo che un fanciullo in questo breve spazio di tempo divenisse abbastanza formato, e abbastanza forte di corpo per abbandonare i suoi parenti e per separarsene senza averne più bisogno e senza più ritornarvi, farebbevi per avventura una differenza sensibile e apparente tra questo fanciullo e l'animale? Comunque pie-
ni di spirito fossero i parenti, avrebbero po-

Nomenclatura delle Scimie. 41

tuto in sì corto spazio di tempo preparate e modificare i suoi organi, e stabilire la menoma comunicazione di pensieri tra la loro anima e la sua? avrebbero potuto svegliare la sua memoria, nè toccarla per via di atti molto spesso replicati per farvi impressione? avrebbero potuto parimente esercitare o sviluppare l'organo della parola? Prima che il fanciullo sappia pronunziare una sola parola, è d'uopo che la sua orecchia sia mille e mille volte percossa dal medesimo suono; e prima ch'egli la possa applicare e pronunziare a proposito, è necessario altresì che mille e mille volte gli si presenti la stessa combinazione della parola e dell'oggetto, a cui essa ha rapporto. L'educazione adunque, la qual sola può sviluppare la sua anima, vuol esser proseguita lungo tempo, e sempre sostenuta; se essa cessasse, non dico già a due mesi, come quella degli animali, ma anche ad un anno di età, l'anima del fanciullo, che nulla avrebbe ricevuto, farebbe senz'esercizio, e per mancanza di moto comunicato resterebbe in una totale incapacità di agire, come quella del fatuo, alla quale il difetto degli organi impedisce che nulla vi sia trasmesso: e per venire a una ragion più forte, se il fanciullo fosse nato nello stato di Natura pura, s'egli non avesse per suo institutore che la sua madre Ottentotta, e a due mesi di età fosse bastevolmente formato

di corpo per togliersi alle sue cure e per separarsene per sempre, questo fanciullo non farebb'egli d'inferior condizione di quella del fatuo, e quanto all' esterno affatto del pari cogli animali? Ma in questo medesimo stato di Natura la prima educazione, cioè l'educazione di necessità esige tanto di tempo quanto nello stato civile; imperciocchè in amendue il fanciullo è egualmente debole, ed egualmente lento a crescere, e per conseguenza egli ha bisogno di ajuti per un eguale spazio di tempo, e finalmente egli perirebbe se venisse abbandonato prima dell'età di tre anni. Or questa abitudine necessaria, continua e comune tra la madre e il fanciullo per un sì lungo tempo, basta perchè essa gli comunichi tutto ciò che possiede, e quando si volesse falsamente supporre che questa madre nello stato di Natura non possedesse niente, nemmeno la parola, una sì lunga abitudine col suo fanciullo non dovrebbe bastare per far nascere un linguaggio? Perciò questo stato di pura Natura, in cui si suppone l'uomo senza pensiero e senza parola, è uno stato ideale e immaginario, che non è giammai esistito. La necessità del lungo conversare de' parenti col fanciullo produce la società in mezzo al deserto: la famiglia s'intende per via di segni e di suoni, e questo primo raggio d'intendimento, intrattenuto, coltivato e comuni-

cato ha fatti schiudere tutt' i germi del pensiero: siccome l'abitudine o sia il conversar insieme non ha potuto esercitarsi, nè sostenerli sì lungo tempo senza produrre de' segni scambievoli e de' suoni reciprochi, siffatti segni o suoni ognor ripetuti e poco a poco stampati nella memoria del fanciullo divengono espressioni costanti: comunque ne sia corta la lista, tali espressioni sono un linguaggio, che diverrà ben tosto più esteso, accrescendosi la famiglia, e che andando oltre seguirà ognora tutt' i progressi della Società. Tosto ch' essa comincia a formarsi, l'educazione del fanciullo non è più un' educazione puramente individuale, poichè i suoi parenti gli comunicano non solo ciò, che han ricevuto dalla Natura, ma anche ciò, che hanno acquistato dai loro Avi e dalla Società, di cui fanno parte: questa non è più una comunicazione fatta per via d'individui isolati, che, come negli animali, si limiterebbe a trasmettere le loro semplici facoltà; è un' istituzione, alla quale l'intera specie ha parte, e il cui prodotto fa la base e il vincolo della Società.

Tra gli animali ancora, benchè tutti sprovveduti del principio pensante, quelli, la cui educazione è la più lunga, sono altresì quelli, che sembrano aver maggiore intendimento. L'Elefante, che fra tutti è quello che impiega più lungo tempo a crescere, e che ha

bisogno degli ajuti della sua madre per tutto il primo anno, è parimente il più intelligente fra tutti. Il porco d'India, a cui non fa d'uopo che di tre settimane di età per acquistare tutto il suo accrescimento, e per trovarsi in istato d'ingravidare, è forse per questa sola ragione uno de' più stupidi. Riguardo alla scimia, della cui natura qui si tratta di decidere, benchè sia molto rassomigliante all'uomo, ha nondimeno un carattere sì forte d'animalità, che comprendesi fino dal momento della sua nascita, poich' essa è a proporzione più forte e più formata che l' fanciullo, cresce molto più presto, gli ajuti della madre non le son necessari che pe' primi mesi, non riceve che un' educazione puramente individuale, e per conseguenza così sterile come quella degli altri animali. :

Essa è dunque animale, e malgrado la sua rassomiglianza all'uomo, ben lungi d'essere il secondo nella nostra specie, non è tampoco il primo nell'ordine degli animali; poichè non è il più intelligente. Unicamente su questo rapporto di rassomiglianza corporale è appoggiato il pregiudizio della grand'opinione che si è formata delle facoltà delle scimie. Essa ci rassomiglia, si va dicendo, sì esteriormente come interiormente, dunque non solo debbe imitarci, ma fare eziandio da se stessa tutto ciò che noi facciamo. Si è

Nomenclatura delle Scimie. 45

veduto che tutte le azioni, che debbonfi chiamare *umane*, sono relative alla società; ch'esse dipendono primieramente dall'anima e in seguito dall'educazione, il cui principio fisico è la necessità del lungo conversare de' parenti col fanciullo; che nella scimia siffatta abitudine o sia conversare è di assai corta durata, e ch'essa non riceve che un'educazione puramente individuale, come gli altri animali, e che non è tampoco suscettibile di quella della specie. Per conseguenza essa non può far nulla di tutto ciò, che fa l'uomo, poichè nessuna delle sue azioni ha lo stesso principio, nè il medesimo fine: e quanto all'imitazione, che sembra essere il carattere più notevole, e l'attributo più evidente della specie della scimia, e che il volgo le accorda come un talento unico, prima di decidere convien esaminare se tale imitazione è libera o forzata. La scimia e' imita perch' ella lo vuole, ovvero perchè senza volerlo lo può? Io mi rimetto volentieri sopra ciò a tutti quelli, che hango osservato questo animale senza prevenzione, e son persuaso ch'eglino diranno con me che in tale imitazione non v'ha niente di libero; niente di volontario; la scimia avendo braccia e mani, se ne serve come noi, ma senza pensare a noi; la rassomiglianza delle membra e degli organi produce necessariamente de' moti, e talvolta ancora delle

continuazioni di moti, che son simili ai nostri; essendo la scimia formata come l'uomo, non può che muoversi come lui: ma il muoversi in egual maniera non è agire per imitare: dialsì a due corpi informi la stessa impulsione; si costruiscano due penduli, due macchine somiglianti, esse si muoveranno in egual modo, e si direbbe male, asserendo che questi corpi informi o queste macchine non si muovono in tal guisa che per imitarsi. Lo stesso accade della scimia relativamente al corpo dell'uomo; sono essi due macchine costruite e organizzate in egual modo, che per necessità di natura si muovono presso a poco nella stessa maniera; nondimeno il muoversi del pari non è imitare; l'uno consiste nella maniera, e l'altro non esiste che nello spirito: l'imitazione suppone l'intenzione d'imitare, la scimia però è incapace di eccitare tale intenzione; la quale richiede una continuazione di pensieri; e per questa ragione l'uomo può, se vuole, imitar la scimia, e la scimia non può nemmeno volere imitar l'uomo.

E questo muoversi del pari, che non è che il fisico dell'imitazione, non è qui sì compiuto come la rassomiglianza, da cui per altro esso deriva come un effetto immediato. La scimia rassomiglia più all'uomo pel corpo e per le membra che per l'uso che ne fa: osservandola con qualche attenzione si

comprenderà facilmente che tutt' i suoi moti son aspri, intermittenti, precipitosi, e che per paragonarli a quelli dell' uomo, converrebbe supporre ad essi un' altra scala o piuttosto un modello diverso. Tutte le azioni della scimia annunziano la sua educazione, ch' è puramente animale; esse ci sembrano ridicole, inconseguenti, stravaganti, perchè falliamo di scala riferendole a noi, e perchè l' unità, che dee servir loro di misura, è differentissima dalla nostra: siccome la sua natura è vivace, il suo temperamento caldo, il suo natural petulante, e siccome nessuna delle sue passioni è stata mitigata dall' educazione, perciò tutte le sue abitudini sono eccessive, e rassomigliano molto più al movimento d' un maniaco che alle azioni d' un uomo, o anche d' un animal tranquillo. Per la stessa ragione noi la troviamo indocile, e veggiamo ch' ella riceve difficilmente le abitudini che le si vorrebbero trasmettere; è insensibile alle carezze, e non obbedisce che pel gastigo; si può tenerla assoggettata ma non già renderla domestica; è ognor sì trista e ritrosa, ognor sì ripugnante e smorfiosa che si giugne bensì a domarla ma non già ad addomesticarla; e perciò questa specie non è mai stata domestica in nessun luogo: e per questo rapporto essa è più distante dall' uomo che la maggior parte degli animali; imperciocchè la docilità suppone qual-

che analogia tra quello che dà e quello che riceve, ed è una qualità relativa, che non può essere esercitata che quando si trova fra due parti un certo numero di facoltà comuni, che non son diverse tra esse se non perchè sono attive in chi dà e passive in chi riceve. Ora il passivo della scimia ha minor rapporto coll' attivo dell' uomo, che il passivo del cane o dell' elefante, i quali basta trattar bene per comunicar loro i sentimenti dolci e delicati dell' attaccamento fedele, della volontaria obbedienza, del servizio gratuito e dell' intera loro sommissione.

La scimia adunque è più lungi dall' uomo per le qualità relative che la maggior parte degli altri animali: n' è parimente molto diversa pel temperamento: l' uomo può abitare in tutt' i climi, egli vive e si moltiplica in quelli del Settentrione e in quelli del Merzodì: la scimia dura fatica a vivere nelle contrade temperate, e non può moltiplicarsi che ne' paesi più caldi. Questa differenza nel temperamento ne suppone delle altre nell' organizzazione, le quali benchè nascoste, non son tuttavia men reali: essa debbe altresì influir molto sul naturale; l' eccessivo calore, ch' è necessario alla compiuta vita di quest' animale, rende eccessive tutte le sue passioni e qualità; e non fa d' uopo cercare altra cagione della sua petulanza,

lanza , della sua lascivia , e delle altre sue passioni , che ci sembrano tutte violente del pari che disordinate .

Questa scimia adunque , che i Filosofi unitamente al volgo hanno riguardata come un essere difficile a definirsi , la cui natura era per lo meno equivoca e media tra quella dell' uomo e quella degli animali , non è per verità che un animale , che porta esteriormente una maschera di figura umana , ma è sfornito interiormente del pensiero , e di tutto ciò che costituisce l' uomo ; un animale inferiore a varj altri per le facoltà relative , e insieme essenzialmente diverso dall' uomo pel naturale , pel temperamento e per la misura altresì del tempo necessario all' educazione , alla gravidanza , all' accrescimento del corpo , alla durata della vita , cioè per tutte le abitudini reali , che costituiscono ciò che in un essere particolare chiamasi *Natura* .



GLI ORANG-OUTANG,

O SIA

IL PONGO (a) ED IL JOCKO (b).

Presentiamo questi due animali unitamente, perchè può darsi che non facciano tutt'edue che una sola e medesima specie.

-
- (a) *Orang-outang*, nome di quest' animale nelle Indie Orientali: *Pongo*, nome di quest' animale in Lowando, provincia del Congo: *Kukurluato* in alcuni luoghi dell' Indie Orientali, secondo Kjoep, cap. 86., citato da Linneo.
- Homo silvestris*. *Orang-outang*. Bonzius, pag. 84., fig. ibid. *Nota*. Questa figura rappresenta piuttosto una donna che una scimia femmina.
- Satyri silvestres*. *Orang-outang dicti*. *Icones arborum* ut & animalium. Lugd. Bat. apud. Vanderhaeg. Tab. antepenult. dua figura.
- Troglodites*. *Homo nocturnus*. Linn. *Syst. nat.* edit. x., pag. 24.
- Oran-outan*. Capt. Beakmans. *Travel to Borneo*. London, 1718. 2. fig.
- Derangs-outangs*, de Ceylan. *Voyages de Gauthier Schoutten aux Indes orientales*. Amsterdam, 1707.
- Drill*, secondo Charleton. *Exercit.* pag. 16.
- Smitten*, secondo Bosman. *Voyage de Guinée*, pag. 523.
- Barris*, secondo varj Viaggiatori.
- Pongo*, secondo Battel, Purchas ed altri.
- (b) *Jocko*. *Enjocko*, nome di quest' animale nel Congo, che noi abbiamo adottato. *En*, è l'articolo che noi abbiain lasciato. L' *Empakassa* del

Stor. Nat. degli Orang-Outang, ec. 51

Fra tutte le scimmie son quelli gli animali, che rassomigliano maggiormente all' uomo, quelli per conseguenza che maggiormente meritano d'essere osservati. Noi abbiám avuto vivo il piccolo orang-outang o jocke, e ne abbiám conservate le spoglie: ma non possiamo parlare del pongo o grande orang-outang che secondo le relazioni de' Viaggiatori: se esse fossero fedeli, se non fossero

C 2.

Congo si chiama *Pacassa* o *Pacasso*, e per conseguenza l' *Enjocko* debbesi chiamar *Jocko*. *Barris* nella Guinea secondo Fr. Pyard, pag. 369., e secondo altresì il P. du Jarric. *Champanzé*, *Quimperlé* dagl' Inglese, che frequentano la costa d'Angola. E' stato pure chiamato *Uomo selvaggio*; *Uomo dei boschi*, come il *Pongo*: altri l'han chiamato *Pigmeo della Guinea*. *Quojasincras*, in alcuni luoghi dell' Africa, secondo Dapper. *Quojavoran*, *Quinomorrou*, secondo altri: *Selvago*, o il *Selvaggio*, dai Portoghesi.

Satyrus Indicus. Tulpinus. *Observ. Med.* lib. III., cap. 56., fig. *ibid.*

Homo silvestris, *Ouvang-outang*. Tyson, *Anatomy of a Pigmie*. London, 1699., fig. pag. 108.

Barris five Barris. *Pygmeus Guineensis*, *Chimpanzé Anglis*. *Descrip. of some curious creatures, &c.* London, 1719., in 8. fig.

The man of the Woods Edwards: *Gleanings*. London, 1758., pag. 6. fig. *ibid.*

Satyrus simia ecaudata subtus nuda. Linn. *Syst. nat.* edit. x., pag. 25.

Simia unguibus omnibus, planis & rotundatis, dissimilem faciem cingente. *Homo silvestris*, l' *Homme des bois*. Briff. *Regn. anim.*, pag. 189.

spesso oscure, fallaci ed esagerate, non dubiteremmo ch'egli non fosse d'una specie diversa da quella del jocko, d'una specie più perfetta ed anche più vicina alla specie dell'uomo. Bonzio, ch'era il Medico principale in Batavia, e che ci ha lasciato delle buone osservazioni sulla Storia Naturale di quella parte dell'Indie, dice espressamente (a) ch'egli ha veduti con ammirazione alcuni individui di questa specie camminar ritti su' loro due piedi e tra gli altri una femmina [di cui dà la figura], che sembrava aver della verecondia, che si copriva colla sua mano alla vista degli uomini che non conosceva, che sospirava, piagneva e faceva le altre azioni umane, di modo che non le mancava altro che la parola. Il Sig. Linneo (b) dice in seguito a Kjoep e ad alcuni

(a) *Quod meretur admirationem, vidi ego aliquot utriusque sexus erecti incedentes imprimis. [cujus effigiem hic exhibeo]; satyram femellam tantâ verecundiâ ab ignotis sibi hominibus occultentem, tum quoque faciem manibus [liceat ita dicere] tegentem, ubertinique lacrymantem, gemitus cientem. Et ceteros humanos actus exprimentem, ut nihil humani ei deesse diceret præter loquelam. . . Nomen ei indunt Ourang-outang quod hominem silvæ significat. Jac. Bont. Hist. nat. Ind. cap. 32, pag. 84. & 85.*

(b) *Homo nocturnus. Homo silvestris. Orang-outang. Bontii. Corpus album, incessu erectum, nostro dimidio minus, pili albi contortuplicati, oculi orbi-*

altri Viaggiatori, che questa stessa facoltà non manca all' orang-outang, ch' egli pensa, che parla e s'esprime fischiando: egli lo chiama l'uomo notturno, e ne dà nel tempo stesso una descrizione, dalla quale sarebbe difficilissimo il decidere s' egli sia un animale o un uomo. Si dee solo notare che questo essere, qualunque egli sia, non ha secondo lui che la metà dell' altezza dell' uomo: e siccome Bonzio non fa veruna menzione della grandezza del suo orang-outang, si potrebbe pensare col Sig. Linneo ch' esso sia lo stesso: ma in tal caso quest' orang-outang di Linneo e di Bonzio non sarebbe il vero, ch' è della statura degli uomini più grandi; esso non sarebbe neppur quello che noi chiamiamo *jocko*, e ch' io ho veduto vivo, poichè sebbene esso sia della statura, che il Sig. Linneo dà al suo, nondimeno n' è diverso per tutti gli altri caratteri. Posso assicurare che, avendolo più volte veduto, non solo egli non parla nè fischia per espri-

C 3

culati, iridi pupillaeque aurea. Palpebrae antice incumbentes cum membrana nictitante. Visus lateralis, nocturnus. Aetas viginti quinque annorum. Die caecutit, latet; noctu videt, exit, furatur. Loquitur sibilo, cogitat, credit sui causam factam tellurem, se aliquando iterum fore imperantem, si fides peregrinatoribus. . . . Habitat in Java, Amboina, Ternata speluncis. Linn. Syst. nat. edit. x., pag. 24.

merfi, ma non fa neppur nulla di quello che un cane ben ammaestrato può fare. D'altra parte egli è diverso quasi in tutto dalla descrizione, che il Sig. Linneo dà dell'orang-outang, e si rapporta molto meglio a quella del *satiro* di questo stesso Autore. Io dubito dunque molto della verità della descrizione del sopraccennato *uomo notturno*; dubito pure della sua esistenza, e probabilmente egli è un negro-bianco, un *chacrelas* (a), che i Viaggiatori citati dal Sig. Linneo avranno mal veduto e mal descritto; imperciocchè siffatti *chacrelas* hanno realmente, come l'*uomo notturno* di quest'Autore, i capelli bianchi, lanosi e ricci, gli occhi rossi, la vista debole ec. Essi però son uomini, e tali uomini non fischiano nè sono pigmei di trenta pollici di altezza: eglino pensano, parlano e operano come gli altri uomini, e son pure della medesima grandezza.

Lasciando da parte adunque questo essere mal descritto; e supponendo altresì un poco d'esagerazione nel racconto di Bonzio, un poco di pregiudizio in ciò ch'egli narra della verecondia della femmina dell'orang-ou-

(a) Vedi ciò che abbiain detto di questa razza d'uomini nel nostro Discorso sulle varietà della specie umana. Tom. VI. di questa Storia Naturale.

tang , non ci refterà che un animale , una
 fcimia , di cui non troviamo altrimenti de-
 gl' indizj più precifi . Edward Tyfon (a)
 celebre Anatomico Inglefe , che ha fatta un'
 ottima defcrizione sì delle parti efteriori ,
 come interiori dell' orang-outang , dice che
 ve ne fono di due fpecie , e che quello ch'
 ei defcrive non è sì grande come l'altro ap-
 pellato *barris* (b) o *baris* dai Viaggiatori , e
 volgarmente *drill* dagl' Inglefi . Quefto *bar-
 ris* o *drill* è in fatti il grande orang-outang
 delle Indie orientali o il pongo della Gui-
 nea , e il pigmeo defcritto da Tyfon è il
 jocko che noi abbiain avuto vivo . Il Filo-
 fofo Gaffendi aveva avanzato , fulla fede del-
 la relazione d'un Viaggiatore per nome Sant'
Amand , ch' eravi nell' Ifola di Giava una
 fpecie di creatura che faceva il digradamento
 tra l'uomo e la fcimia , ma non fi ebbe poi
 difficoltà a negar quefto fatto : per provarlo ,
 Peirefc produce una lettera d'un certo Sig. Na-
 tale Medico , che dimorava in Africa , colla
 quale egli afficura (c) che fi trovano nella

C 4

(a) The anatomy of a Pygmie. London, 1699. in 4.

(b) The Baris or Barris, Which they describe to
 be much taller than our animal, probably may
 be what we call a Drill. Tyfon, anat. of a
 pygmie, pag. 1.

(c) Sunt in Guinea fimia , barba procera canaque
 & pexa propemodum venerabiles , incedunt lentè
 ac videntur præ cæteris fapere ; maximi funt &

Guinea delle scimmie grandissime chiamate *barris*, che camminano ritte su' due piedi, che hanno un' aria di maggior gravità, e molto maggior intendimento che tutte le altre scimmie, e che sono ardentissime per le donne. Darcos, e in seguito Nieremberg (a) e Dapper (b) dicono del *barris* presso a poco le stesse cose. Battel (c) lo chiama *pongo*, e assicura ch'egli è in tutte le sue proporzioni simile all'uomo, e che solamente n'è più grande: „ grande, dic' egli, come un „ gigante; che ha la faccia come l'uomo, „ gli occhi incavati, lunghi capelli ai lati „ della testa, il viso nudo e senza pelo, egualmente che le orecchie e le mani, il corpo „ po' leggermente pelofo, e che esteriormente „ egli non è diverso dall'uomo che per „ le gambe, perch' esse non hanno punto o „ ben poco di polpa; che per altro egli cammina sempre ritto in piedi; che dorme su

Barris dicuntur; pollent maximè judicio, semel dumtaxat quispian docendi. Vestè induti illico bipedes incedunt. Scitè ludunt fistula, cythara aliisque id genus Famina denique in iis patiuntur menstrua, Et mares mulierum sunt appotentissimi. Gassendi, lib. v.

(a) Nieremberg. *Hist. nat. Peregr.* lib. ix., cap. 44. & 45.

(b) Description de l'Afrique, par Dapper, pag. 249.

(c) *Purchas Pilgrims*, part. II., lib. vii., cap. 3. *Histoire générale des Voyages*. Tom. V., pag. 89.

„ gli alberi e si costruisce una capanna, un
 „ riparo contro il sole e la pioggia, che
 „ vive di frutti e non mangia carne; che
 „ non può parlare, benchè abbia maggior
 „ intendimento che gli altri animali; che
 „ quando i Negri accendono del fuoco ne'
 „ boschi, fissati ponghi vengono a sederse-
 „ ne all'intorno e a scaldarsi, ma che non
 „ hanno tanto di spirito da mantenere il
 „ fuoco mettendovi della legna; che vanno
 „ in truppa, e uccidono talvolta de' Negri
 „ in luoghi spartati; che attaccano anche
 „ l'elefante, che lo battono a colpi di ba-
 „ stone e lo cacciano da' loro boschi; che
 „ questi ponghi non si possono prender vivi,
 „ poichè sono sì forti, che dieci uomini non
 „ basterebbono per domarne un solo; che
 „ perciò non se ne può pigliare che i figlj
 „ affatto giovani; che la madre li porta
 „ camminando ritta in piedi, e ch'essi ten-
 „ gonsi attaccati al suo corpo colle mani,
 „ e colle ginocchia; che vi sono due specie
 „ di queste scimie somigliantissime all'uomo,
 „ il pongo ch'è egualmente grande e più
 „ grosso d'un uomo, e l'eniocko ch'è mol-
 „ to più piccolo ec.“ Questo è il passo pre-
 „ cisissimo, da cui ho cavati i nomi di *pongo*
 „ e di *jocko*. Battel dice in oltre che quando
 „ muore uno di quest'animali, gli altri co-
 „ prono il suo corpo con un ammasso di rami
 „ e di foglie. Purchas aggiugne in forma di

Nota , che nelle conversazioni che aveva avute con Battel , aveva da lui inteso che un pongo gli aveva portato via un piccol Negro , il quale passò un intero anno nella società di siffatti animali ; che il detto piccol Negro aveva detto al suo ritorno ch'essi non gli avevan recato verun male ; ch'erano comunemente dell'altezza dell'uomo , ma che son più grossi ed hanno presso a poco il doppio del volume d'un uomo ordinario . Jobson assicura d'aver veduta ne' luoghi frequentati da questi animali una specie d'abitazione composta di rami intrecciati , che poteva servire per lo meno per difenderli dall'ardore del sole (a) . „ Le scimie della Guinea , dice Bosman (b) , che in Fiammingo son chiamate *Smitten* , sono di color „ fulvo e divengono estremamente grandi : „ ne vidi , aggiugne , una co' miei propri „ occhi , che aveva cinque piedi d'altezza „ Queste scimie hanno una bruttissima figura , come pure quelle d'una seconda specie , che rassomiglian loro in tutto , se non „ che quattro di quest'ultime sarebbero appena della grossezza d'una sola della prima specie Si può loro insegnare quasi

(a) *Histoire générale des Voyages . Tom. III. , pag. 295.*

(b) *Voyage de Guinée , par Bosman , pag. 258.*

„ tutto ciò, che si vuole “..... Gauthier Schoutten (a) dice „ che le scimie dagl' Indiani chiamate *orang-outang*, sono quasi della stessa figura e della medesima grandezza che gli uomini, ma che hanno il dorso e i reni affatto coperti di pelo, senza però averne al dinanzi del corpo; che le femmine hanno due grosse mammelle; che tutte hanno il viso orrido, il naso piatto e anche incavato, le orecchie come gli uomini; che son robuste, agili e ardite; che si mettono sulle difese contro gli uomini armati; che hanno una forte passione per le donne, le quali son mal sicure passando pe' boschi, ove trovansi all'improvviso assalite e violate da siffatte scimie “. Dampier, Froger ed altri Viaggiatori assicurano che questi animali rubano delle piccole fanciulle di otto o dieci anni, che se le portano sugli alberi, e il ritorglierle loro è cosa difficilissima. Possiamo aggiungere a tutte queste testimonianze quella del Sig. de la Brosse, che scrisse il suo viaggio mentre dimorava alla costa d'Angola nel 1738., e di cui ci comunicò l'Estratto. Questo Viaggiatore racconta „ che gli *orang-outang*, ch'egli chiama *quimpezi's*, pro-

C 6

(a) Voyage de Gaut. Schoutten. *Amsterd.* 1707., in 12.

„ curano di sorprendere le donne Negre, che
„ le custodiscono presso di loro per trafil-
„ larsene, e che le nutrono assai bene. Ho
„ conosciuta, dic' egli, in Lowango una don-
„ na Negra, ch' era rimasta tre anni presso
„ i detti animali. Essi crescono all' altezza
„ di sei a sette piedi; sono d'una forza sen-
„ za pari; fanno le lor capanne e si servo-
„ no di bastoni per difendersi; hanno la fac-
„ cia piatta, il naso schiacciato e largo, le
„ orecchie piatte e senza cordone, la pelle
„ un poco più chiara di quella d'un mula-
„ stro, un pelo lungo e molto raro in va-
„ rie parti del corpo, il ventre estremamen-
„ te teso, i talloni piatti ed alti pel di
„ dietro un mezzo pollice in circa. Cam-
„ minano su' lor due piedi, e su i quattro
„ quando loro salta il capriccio. Noi ne
„ comperammo due giovani, un maschio
„ che aveva quattordici mesi, e una fem-
„ mina che non aveva che dodici mesi
„ d'età, ec.

Ecco ciò, che noi abbiain trovato di più
preciso e di più certo a proposito del gran-
de *orang-outang* o *pongo*: e siccome la gran-
dezza è il sol carattere notabile, pel quale
egli è diverso dal jocko, così sono tuttavia
indotto a credere ch'essi siano della mede-
sima specie; imperciocchè trovo qui due cose
possibili; la prima che il jocko sia una va-
rietà costante, cioè una razza molto più pic-

cola di quella del pongo; per verità sono tutteddue del medesimo clima, vivono alla stessa foggia, e dovrebbero per conseguenza rassomigliarsi in tutto, poichè sono egualmente soggetti e suscettibili delle medesime alterazioni e delle medesime influenze della terra e del cielo; e non abbiain noi nella specie umana un esempio di simile varietà? il Lappone e il Finlandese, che vivono sotto il medesimo clima, sono tra loro quasi altrettanto diversi per la statura e molto più per gli altri attributi, che il *jocko* o piccolo *orang-outang* dal grande. La seconda cosa possibile, si è che il *jocko* o piccolo *orang-outang*, che noi abbiain veduto vivo, quello di Tulpio, quello di Tyson e gli altri, che sono stati trasportati in Europa, forse non eran tutti che giovani animali, che non avevan per anco acquistata che una parte del loro accrescimento. Quello, ch'io ho veduto, aveva presso a due piedi e mezzo d'altezza. Il Sig. Nonfoux, che n'era il padrone, m'assicurò ch'esso non aveva che due anni; avrebbe dunque potuto arrivare a più di cinque piedi d'altezza, s'egli avesse potuto sopravvivere, supponendone il suo accrescimento proporzionale a quello dell'uomo. L'*orang-outang* di Tyson era anche più giovane, poichè non aveva che circa due piedi d'altezza, e i suoi denti non erano ancora interamente formati. Quello di

Talpio era presso a poco della medesima grandezza di quello ch' io ho veduto: lo stesso è da dirsi di quello ch' è inciso fra *les Glanures* del Sig. Edwards. Egli è dunque probabilissimo che questi giovani animali avrebbero acquistato coll' età un accrescimento considerabile, e che se fossero stati in libertà nel loro clima, avrebbero acquistata la medesima altezza, e le medesime dimensioni, che i Viaggiatori danno al loro grande orang-outang. Per lo che non considereremo più questi due animali come tra lor differenti, ma come costituenti una sola e medesima specie; attendiamo intanto che notizie più precise distruggano o confermino quest' opinione, che ci par ben fondata.

L' orang-outang, ch' io ho veduto, camminava sempre ritto su i due suoi piedi, anche portando delle cose pesanti la sua aria era molto trista, il suo andar grave, i suoi movimenti misurati, il suo natural dolce e diversissimo da quello delle altre scimie; non aveva nè l' impazienza del magot, nè la malignità del babbuino, nè la stravaganza dei guenoni. Egli sarà stato, mi si dirà, ben ammaestrato; ma gli altri che ho di sopra citaati e ad esso paragonati, erano stati in egual modo educati: il segno e la parola bastavano per far agire il nostro orang-outang; pel babbuino abbisognava il basto-

ne, e lo staffile per tutte le altre scimie che non obbedivano che alla forza dei colpi. Ho veduto quest' animale presentar la sua mano per ricondurre le persone che venivano a visitarlo; e passeggiar gravemente con loro e come di compagnia; l'ho veduto sedersi a tavola, spiegare il suo tovagliolino, ascingersene le labbra, servirsi del cucchiajo e della forchetta per recare i cibi alla bocca, versare egli stesso la sua bevanda nel bicchiere, farlo toccare un altro, quando n'era invitato, andare a prendere una tazza e una sottocoppa, recarla in tavola, mettersi del zucchero, versarvi del tè, lasciarlo divenir freddo per berlo, e tutto ciò senz'altro stimolo che co' segni o colla parola del suo padrone, e spesse volte da lui stesso. Egli non faceva del male a persona veruna, s'accostava anzi con circospezione, e si presentava come per chieder delle carezze. Amava prodigiosamente i dolci, e ognuno gliene dava; e perch'egli aveva una tosse frequente e qualche attacco di petto, una sì gran quantità di cose inzuccherate contribuì certamente ad abbreviargli la vita: non visse in Parigi che una state, e morì l'inverno seguente in Londra: mangiava quasi di tutto, preferiva soltanto i frutti maturi e secchi a tutti gli altri alimenti: beveva del vino ma in piccola quantità, e lo lasciava volentieri pel latte, pel tè o per altri li-

quori dolci. Tulpio (a) che ha data una buona descrizione colla figura d'uno di questi animali, ch'era stato presentato vivo a Federigo Enrico Principe d'Orange, ne racconta presso a poco le medesime cose che quelle, che abbiain vedute noi stessi e che

(a) *Erat hic satyrus quadrupes, sed ab humana specie quam præ se fert vocatur Indis Onrang-outang, Homo silvestris, uti Africanis Quojas-mortou: exprimens longitudine puerum trinum: ut crassitie sexennem, corpore erat nec obeso nec gracili, sed quadrato, habilissimo tamen ac perniciosissimo. Artibus vero tam strictis & musculis adeo vastis, ut quidvis & auderet & posset. Anterius undique glaber at pondè hirsutus ac nigris crinibus oblitus. Facies mentiebatur hominem, sed nares simæ & aduncæ rugosam & edentulam anum. Aures verò nil discrepant ab humana forma uti neque pectus ornatum utrinque mamma prætumida [erat enim sextus fæminei]. Venter habebat umbilicum profundiorẽ, & artus, cum superiores tum inferiores, tam exactam cum homine similitudinem ut vix ovum ovo videris similis. Nec cubito defuit debita commissura, nec manibus digitorum ordo; nedium pollicis figura humana vel cruribus suræ vel pedis calcis fulcrum. Quæ concinna ac decens membrorum forma in causa fuit, quòd multoties incederet erectus, neque uttolleret minus gravatè, quàm transferret facillè qualescunque gravissimi oneris pondus. Bibiturus præhendebat canthari ansam manu altera; alteram verò vasti fundo supponeus, abstergebat deinde madorem labiis relictum. . . . Eandem dexteritatem observabat cubitum iturus; inclinans caput in pulvinar & corpus stragulis convenienter operiens, &c. Tulpii. *Observ. Medicæ*, lib. III., cap. 56.*

abbiam riferite. Ma se si vuol comprendere ciò che apparteneva all' istinto proprio dell' animale, e distinguerlo da ciò ch' egli aveva appreso dal suo padrone; se si vuol separare la sua natura dalla sua educazione, che in fatti gli era straniera, poichè l' aveva ricevuta da uomini e non già dal suo padre e dalla sua madre, convien paragonare questi fatti, de' quali noi siamo stati testimonj, con quelli che ci han riferiti i Viaggiatori, ch' hanno veduti questi animali nel loro stato di natura, in libertà e in ischiavitù. Il Sig. de la Brosse, che aveva comperati da un Negro due piccoli *orang-outang* che avevano solamente un anno di età, non dice se il Negro gli avesse educati: sembra al contrario assicurare ch' egli no facessero da loro stessi una gran parte delle cose, che abbiam di sopra riferite.

„ Questi animali, dic' egli, hanno l' istinto
 „ di sedersi a tavola da loro stessi; mangia-
 „ no di tutto senza distinzione; si servono
 „ del coltello, del cucchiajo e della forchet-
 „ ta per tagliare e per prendere ciò che si
 „ porge loro sul tondo; bevono vino ed al-
 „ tri liquori; li portammo a bordo della
 „ nave; quand' erano a tavola, si facevano
 „ intendere dai Mozzi allorchè avevan bi-
 „ sogno di qualche cosa, e se per avven-
 „ tura questi ricusavano di dar loro ciò ch'
 „ essi domandavano, montavano in collera,

„ afferravan loro le braccia , le mordevano ,
„ e se li cacciavan sotto Trovandoci
„ alla spiaggia il maschio cadde malato , e
„ veniva curato come un uomo ; fu anche
„ salassato due volte al braccio destro. Tut-
„ te le volte poi ch' egli si trovò da qual-
„ che male incomodato , mostrava il suo
„ braccio perchè fosse salassato quasi avesse
„ saputo che ciò gli aveva giovato .

Enrico Grosse (a) dice „ che si trovano
„ di questi animali verso il Settentrione di
„ Coromandel , nelle boscaglie del dominio
„ del Raia di Carnate ; che se ne fece un
„ presente di due , l' un maschio e l' altro
„ femmina , al Sig. Horne , Governatore di
„ Bombay ; ch' essi avevano appena due pie-
„ di di altezza , ma la figura interamente
„ umana ; che camminavan ritti su' lor due
„ piedi e ch' erano d' un bianco pallido , senz'
„ altri capelli nè peli che ai siti ove noi ne
„ abbiamo comunemente ; che le loro azio-
„ ni erano per la maggior parte somiglian-
„ tissime alle azioni umane , e che la loro
„ malinconia faceva vedere ch' essi sentivano
„ assai bene il peso della loro schiavitù ; che
„ facevano con cura il lor letto nel sito del
„ vascello , in cui eran messi ; che quand'

(a) Voyage aux Indes orientales , par Henri Gros-
se , traduit de l' Anglois , Londres , 1758 , pag. 329.
Et suivantes .

„ erano mirati da alcuno, nascondevano col-
 „ le loro mani le parti che la modestia vieta
 „ di mostrare. La femmina, egli aggiugne,
 „ morì di malattia sul vascello, e il maschio
 „ dando ogni sorta di segni di dolore prese
 „ talmente a cuore la perdita della sua com-
 „ pagna, che ricusò di mangiare, e non le
 „ sopravvisse più di due giorni.

Francesco Pyrard (a) riferisce „ che nella
 „ provincia di Sierra-liona trovasi una spe-
 „ cie d'animali, chiamata *baris*, che son
 „ grossi e membruti, che hanno un'industria
 „ tale che se vengono allevati e ammaestrati
 „ da piccioli, servono come una persona;
 „ che ordinariamente camminano sulle due
 „ zampe di dietro solamente; che pestano
 „ ciò che si dà loro a pestare nel mortajo;
 „ che vanno a prender acqua al fiume in pic-
 „ cole brocche, ch'essi portano piene sulla
 „ loro testa, ma che arrivando ben tosto alla
 „ porta della casa, se non si devan loro le
 „ brocche, essi le lascian cadere, e veggen-
 „ do poi le brocche versate e rotte, si met-
 „ tono a gridare e a piangere“. Il Padre
 du Jaric, citato da Nieremberg (b), dice la
 stessa cosa e quasi nei medesimi termini. La

(a) *Voyages de François Pyrard de Laval. Paris, 1619. Tom. II., pag. 334.*

(b) Euf. Nieremberg. *Hist. nat. Peregrin.*, lib. 12., cap. 45.

testimonianza di Schoutten (a) s' accorda con quella di Pyrard a proposito dell' educazione di questi animali. „ Se ne prendono, „ dic' „ egli, con lacci, si addimesticano, s' insegna loro a camminar su i piedi posteriori, e a servirsi de' piedi anteriori; che sono pressa a poco come mani, per far certi esercizi, ed anche per gli usi domestici, come sciacquar bicchieri, dare a bere, voltar lo spiedo, ec. “. Il Gant dice (b): „ ho veduta in Giava una scimia molto straordinaria, la quale era femmina: era d'una grande statura e camminava sovente molto diritta su i piè di dietro: allora nascondeva con una delle sue mani la parte del suo corpo che distingue il sesso: aveva il viso senz' altro pelo che quello delle sopraacciglia, e in generale rassomigliava molto alle facce grottesche delle donne Ottentotte, che ho vedute al Capo. Ella faceva ogni giorno acconciamente il suo letto, vi si coricava appoggiando la testa sopra un guanciale, e si copriva con una coperta..... Quando aveva male alla testa, se la fasciava strettamente con un fazzoletto, ed era un piacere di vederla così aggiustata

(a) Voyages de Gant. Schoutten aux Indes orientales. *Amsterd.* 1707.

(b) Voyages de Fr. le Guat. *Tom. II.*, pag. 96. Et 97.

„ nel suo letto. Potrei raccontarne diverse
 „ altre piccole cose che sembravano estrema-
 „ mente singolari; ma confesso che ciò non
 „ poteva cagionarmi tanta meraviglia quan-
 „ ta la moltitudine; imperciocchè sapendo
 „ il disegno che si aveva di portar questa sci-
 „ mia in Europa per farla vedere, io era
 „ molto inclinato a supporre ch'essa fosse
 „ stata ammaestrata alla maggior parte del-
 „ le azioni, che il popolo riguardava come
 „ se fossero ad essa naturali. Questa per ve-
 „ rità era una supposizione: ella morì all'
 „ altezza del Capo di Buona-speranza in un
 „ vascello, sul quale io mi trovava. Egli è
 „ certo che la figura di questa scimia rasso-
 „ miigliava molto a quella dell'uomo, ec.
 „ Gemelli Careri dice d'averne veduta una che
 „ si lamentava come un fanciullo, che cammi-
 „ nava su i due piè di dietro, portando sotto
 „ il braccio la sua stuoja per coricarvisi e dor-
 „ mire. Queste scimie, egli aggiugne, sem-
 „ brano essere per certi riguardi più spiritoso
 „ che gli uomini; poichè quando più non tro-
 „ vano frutti su i monti, vanno alla riva del
 „ mare ove fanno preda di granchi, di ostriche
 „ e d'altre cose simili. Vi ha una specie d'ostriche,
 „ che son chiamate *tactova*, che pesano
 „ più libbre, e che spesso son aperte sulla riva.
 „ Or la scimia temendo che quando le vuol
 „ mangiare, non le afferrino la zampa rinser-
 „ randosi, getta un sasso nella conchiglia che

le impedisce di chiudersi, e in seguito vi mangia l'ostrica senza timore.

„ Sulle coste del fiume di Gambia, dice
 „ Froger (a), le scimie vi son più grosse, e
 „ peggiori che in verun altro sito dell' Africa.
 „ I Negri le temono, e non possono
 „ andar soli nella campagna senza correr rischio
 „ d'essere attaccati da queste scimie, che
 „ loro presentano un bastone, e gli obbligano
 „ a batterli Sovente sono state vedute
 „ portar sugli alberi de' fanciulli di sette
 „ a otto anni, che con fatica infinita li
 „ poterono loro ritogliere. La maggior parte
 „ dei Negri credono ch'esse siano una nazione
 „ straniera che sia venuta a stabilirsi
 „ nel lor paese, e che se esse non parlano,
 „ ciò provenga dal timore che hanno che
 „ non vengano obbligate a lavorare.

„ Sarebbe una cosa strana, dice un altro
 „ Viaggiatore (b), il vedere nel Macacar
 „ un sì gran numero di scimie, poichè il
 „ loro incontro è sovente funesto. Convien
 „ esser sempre ben armato per difendersene . . .
 „ Esse non han coda, stanno sempre diritte
 „ come gli uomini, e non vanno giammai
 „ che su i lor due piedi di dietro.

(a) Relation du Voyage de Gennes, par Froger, pag. 42. & 43.

(b) Description historique du royaume de Macacar. Paris, 1688., pag. 51.

Ecco per lo meno presso a poco tutto ciò, che i Viaggiatori men creduli e i più veridici ci raccontano di quest' animale. Ho creduto di dover riferire interamente i loro passi, perchè tutto può sembrare importante nella Storia d'una bestia cotanto rassomigliante all' uomo. E perchè si possa avvanzar parola anche con maggior cognizione sulla sua natura, esporremo ora tutte le differenze che scostano questa specie della specie umana, e tutte le conformità che ad essa l'avvicinano. Ella è diversa esteriormente dall' uomo pel naso che non è prominente, per la fronte ch'è troppo corta, pel mento che non è rilevato alla base: ha le orecchie proporzionalmente troppo grandi, gli occhi troppo l'uno all'altro vicini; l'intervallo tra'l naso e la bocca è pure troppo esteso. Queste sono le sole differenze tra la faccia dell' orang-outang e quella dell' uomo. Il corpo e le membra hanno le seguenti differenze; le cosce sono relativamente troppo corte, le braccia troppo lunghe, i pollici troppo piccioli, il palmo della mano troppo lungo e troppo serrato, i piedi fatti piuttosto a guisa di mani che a guisa di piedi: le parti della generazione del maschio non son diverse da quelle dell' uomo se non perchè al prepuzio non vi ha punto di freno; le parti della femmina sono esteriormente molto simili a quelle della donna.

Internamente questa specie è diversa dalla specie umana pel numero delle coste: l'uomo non ne ha che dodici, l'orang-outang ne ha tredici; essa ha parimente le vertebre del collo più corte, gli ossi del catino più serrati, le anche più piate, le orbite degli occhi più incavate; non vi ha veruna apofisi spinosa alla prima vertebra del collo; i reni son più rotondi di quelli dell'uomo, e gli ureteri hanno una forma differente, come pure la vescica e la vescichetta del fiele, che sono più strette e più lunghe che nell'uomo. Tutte le altre parti del corpo, della testa e delle membra sì esteriori come interiori, sono sì perfettamente simili a quelle dell'uomo, che non si può paragonarle insieme senza ammirazione e senza restar sorpreso che da una struttura sì eguale e da un'organizzazione, ch'è assolutamente la stessa, non ne risultino i medesimi effetti. Per esempio: la lingua e tutti gli organi della voce sono i medesimi che nell'uomo, e nondimeno l'orang-outang non parla; il cervello è assolutamente della stessa forma e della stessa proporzione, e pure non pensa: vi ha forse una più evidente prova che la materia sola, benchè perfettamente organizzata, non può produrre nè il pensiero nè la parola che n'è il segno, a meno che non sia animata da un principio superiore? L'uomo e l'orang-outang sono i soli che abbiano natiche e polpe, e che

che per conseguenza sieno fatti per camminar diritti; i soli che abbiano il petto largo, le spalle piatte e le vertebre formate l'uno come altro; i soli, il cui cervello, il cuore, i polmoni, il fegato, la milza, il pancreas, lo stomaco, le budella sieno assolutamente eguali; i soli che abbiano l'appendice vermiculare al cieco; finalmente l'orang-outang rassomiglia più all'uomo che a nessun altro animale, più ancora che ai babbuini ed ai guenoni, non solo per le parti sopraccennate, ma anche per la larghezza del viso, per la forma del cranio, delle mascelle, dei denti, degli altri ossi della testa e della faccia, per la grossezza delle dita e del pollice, per la figura delle ugne, pel numero delle vertebre lombari e sacre, per quello degli ossi del coccige, e finalmente per la struttura nelle articolazioni, nella grandezza e nella figura della rotella, in quella dello sterno, ec.; di modo che paragonando quest' animale con quelli che gli rassomigliano maggiormente, come col magot, col babbuino o col guenone, si trova ancora ch'egli ha maggior rassomiglianza coll'uomo che cogli animali, le cui specie non ostante sembrano essere sì vicine alla sua, che sono state tutte dinotate col nome di *Scimie*. Gl' Indiani pertanto sono scusabili d'averla associata alla specie umana col nome d'*Orang-outang*, uomo selvaggio,

poichè pel corpo egli rassomiglia più all' uomo che alle altre scimie o a verun altro animale. Siccome alcuni de' fatti, che abbi- am pur ora esposti, potrebbero sembrar sospetti a coloro che non avessero veduto quest' animale, così abbi- am creduto di doverli appoggiare all' autorità di due celebri Anatomici, Tyson (a) e Cowper, che l'han-

-
- (a) L' orang-outang rassomiglia più all' uomo che alle scimie o ai guenoni, 1. perchè ha i peli delle spalle diretti al basso, e quelli del braccio diretti all' alto; 2. per la faccia ch' è più simile a quella dell' uomo, essendo più larga e più piatta di quella delle scimie; 3. per la figura delle orecchie che rassomigliam più a quelle dell' uomo, eccettuato che la parte cartilaginosa è sottile come nelle scimie; 4. pe' diti che proporzionalmente son più grossi di quelli delle scimie; 5. perchè esso è fatto per tutt' i riguardi per camminar ritto su due piedi, invece che le scimie e i guenoni non son formati a questo fine; 6. perchè ha le natiche più grosse che tutte le altre scimie; 7. perchè ha le palpe alle gambe; 8. perchè il suo petto e le sue spalle son più larghe di quelle delle scimie; 9. perchè il suo tallone è più lungo; 10. perchè ha la membrana grassa situata come l' uomo sotto la pelle; 11. il peritonio intero e non forato o allungato, com' è nelle scimie; 12. gl' intestini più lunghi che nelle scimie; 13. il canale degl' intestini di differente diametro, come nell' uomo, e non eguale o pressò a poco eguale com' è nelle scimie; 14. perchè il cieco ha l' appendice vermicolare come nell' uomo, mentre questa appendice vermicolare manca in tutte

no insieme anatomizzato con una scrupolosa-
 attenzione, e che ci han dati i risultati dei

D 2

le altre scimie, e parimente perchè il principio del colon non è sì prolungato come lo è nelle scimie; 15. perchè l'inserzione del condotto biliare e del condotto pancreatico non hanno che un solo orifizio comune nell'uomo e nell'orang-outang, mentre nei guenoni le dette inserzioni sono a due pollici di distanza; 16. perchè il colon è più lungo che nelle scimie; 17. perchè il fegato non è diviso in lobi come nelle scimie, ma intero e d'un sol pezzo come nell'uomo; 18. perchè i vasi biliari sono gli stessi che nell'uomo; 19. la milza la stessa; 20. il pancreas lo stesso; 21. il numero dei lobi del polmone lo stesso; 22. il pericardo attaccato al diaframma come nell'uomo, e non come lo è nelle scimie o nei guenoni; 23. perchè il cono del cuore è più ottuso che nelle scimie; 24. perchè non ha borse al basso delle guance come le altre scimie e i guenoni; 25. perchè ha il cervello molto più grande che non lo hanno le scimie, e in tutte le sue parti esattamente formato come quello dell'uomo; 26. perchè il cranio è più ritondato e del doppio più grande che nei guenoni; 27. tutte le suture del cranio simili a quelle dell'uomo; gli ossi appellati *ossa triquetra Wormiana* si trovano nella sutura lambdoide, il che non è nelle altre scimie o guenoni; 28. ha l'osso cribiforme e la cresta di gallo, il che i guenoni non hanno; 29. la *sella equina* come nell'uomo, mentre nelle scimie e nei guenoni questa parte è più elevata e più prominente; 30. il *processus pterygoideus* come nell'uomo, la qual parte manca alle scimie e ai guenoni; 31. gli ossi delle tempie e gli ossi chiamati *ossa bregmatis* come nell'uomo, i quali

paragoni, ch'eglino han fatti di tutte le parti del suo corpo con quello dell' uomo.

ossi sono d'una figura differente nelle scimie e nei guenoni; 32. l'osso zigomatico piccolo, mentr' è grande nelle scimie e nei guenoni; 33. i denti son più simili a quelli dell' uomo che a quelli delle altre scimie, massimamente i canini e i molari; 34. le apofisi trasverse delle vertebre del collo, e le vertebre sesta e settima rassomigliano più a quelle dell' uomo che a quelle delle scimie e dei guenoni; 35. le vertebre del collo non son forate come nelle scimie per lasciar passare i nervi, esse son piene, e senza foro nell' orang-outang come nell' uomo; 36. le vertebre dorsali e le loro apofisi sono come nell' uomo; e nelle vertebre del basso non vi sono che due apofisi inferiori, mentre nelle scimie ve ne son quattro; 35. non vi sono che cinque vertebre lombari come nell' uomo, mentre nei guenoni ve ne sono sei o sette; 38. le apofisi spinose delle vertebre lombari sono diritte come nell' uomo; 39. l'osso sacro è composto di cinque vertebre come nell' uomo, mentre nelle scimie e nei guenoni non è composto che di tre; 40. il coccige non ha che quattro ossi come nell' uomo, i quali non son forati, mentre nelle scimie e nei guenoni il coccige è composto d'un maggior numero d'ossi, i quali son forati; 41. nell' orang-outang non vi sono che sette coste vere, e le estremità delle coste false sono cartilaginose, e le coste sono articolate col corpo delle vertebre; nelle scimie e nei guenoni vi sono otto coste vere, e le estremità delle coste false sono ossee, e la loro articolazione si trova situata nell' intervallo tra le vertebre; 42. l'osso dello sterno nell' orang-outang è largo come nell' uomo, e non istretto come

Ho creduto di dover tradurre dall' Inglese, e di qui presentare questo articolo delle loro

D 3

nei guenoni; 43. gli ossi dei quattro diti son più grossi che nelle scimie; 44. l'osso della coscia, sì nella sua articolazione come per tutti gli altri riguardi è simile a quello dell' uomo; 45. la rotella è rotonda e non lunga, semplice e non doppia come lo è nelle scimie; 46. il tallone, il tarso e il metatarso dell' orang-outang sono come quelli dell' uomo; 47. il dito medio nel piede non è sì lungo come nelle scimie; 48. i muscoli *obliquus inferior capitis*, *pyriformis* & *biceps femoris* sono simili nell' orang-outang, e nell' uomo, mentre son diversi nelle scimie, e nei guenoni, ec.

L'orang-outang è diverso dall' uomo più che dalle scimie o dai guenoni, 1. perchè il suo pollice è più piccolo a proporzione che quello dell' uomo, benchè sia nondimeno più grosso di quello delle altre scimie; 2. perchè il palmo della mano è più lungo e più stretto che nell' uomo; 3. è diverso dall' uomo e s'accosta alle scimie per la lunghezza delle dita dei piedi; 4. è diverso dall' uomo perchè ha il dito grosso dei piedi allontanato presso a poco come un pollice, essendo piuttosto quadrumano come le altre scimie che quadrupede; 5. perchè ha le cosce più corte che l' uomo; 6. il braccio più lungo; 7. perchè non ha le borse pendenti; 8. l'epiploon più dilatato che nell' uomo; 9. la vescichetta del fiele lunga e più stretta; 10. i reni più rotondi che nell' uomo e gli ureteri differenti; 11. la vescica più lunga; 12. perchè non ha il freno al prepuzio; 13. gli ossi delle orbite dell' occhio troppo incavate; 14. perchè non ha le due cavità al disopra della sella turcica come nell' uomo; 15. perchè i *processus mastoidei*

Opere , affinchè ognuno possa meglio giudicare della rassomiglianza quasi totale di quest

(1)

Et filioides sono piccolissimi e quasi invisibili; 16. perchè ha gli ossi del naso piatti; 17. è diverso dall' uomo perchè le vertebre del collo son corte come nelle scimie , piatte al dinanzi , e non già rotonde , e perchè le loro apofisi spinose non sono forcute come nell' uomo; 18. perchè non vi è l'apofisi spinosa nella prima vertebra del collo; 19. è diverso dall' uomo perchè ha tredici coste da ciascun lato , e l' uomo non ne ha che dodici; 20. perchè gli ossi degl' ilj sono perfettamente simili a quelli delle scimie , essendo più lunghi , più stretti e men concavi che nell' uomo; 21. è diverso dall' uomo perchè i muscoli seguenti si trovano nel corpo umano e mancano in quello dell' orang-outang; cioè , *occipitales* , *frontales* , *dilatatores alarum nasi seu elevatoros labii superioris* , *interspinales colli* , *glutaei minimi* , *extensor digitorum pedis brevis* & *transversalis pedis*; 22. i muscoli , che sembrano non trovarsi nell' orang-outang , e che si trovano talvolta nell' uomo , son quelli che si chiamano *Pyramidales* , *caro Musculosa quadrata*; il lungo tendine e l' corpo carnoso del muscolo palmare , i muscoli *attollens* & *retrahens auriculam*; 23. i muscoli elevatori delle clavicole sono nell' orang-outang come nelle scimie e non già come nell' uomo; 24. i muscoli , pe' quali l' orang-outang rassomiglia alle scimie ed è diverso dall' uomo , sono i seguenti; *longus colli* , *pectoralis* , *latissimus dorsi* , *gluteus maximus* & *medius* , *Psoas magnus* & *parvus* , *iliacus internus* & *gasteronamius internus*; 25. è diverso altresì dall' uomo per la forma dei muscoli *deltoides* , *pronator radii teres* & *extensor pollicis brevis*. *Anatomic de l' orang-outang* , par Tyson , *Londres* , 1699. , in 4.

animale coll' uomo. Osserverò soltanto per maggiore intelligenza di questa Nota, che gl' Inglese non si son ristretti come i Francesi ad un sol nome per dinotar le scimie: eglino hanno, come i Greci, due diversi nomi, l'uno per le scimie senza coda (*a*), ch' eglino chiamano *ape*, e l'altro per le scimie codate, che appellano *monkie*. Io ho sempre tradotta la parola *monkie* con quella di *guenone*, e la parola *ape* con quella di *scimia*; e quelle scimie, che Tyson dinota col nome *ape*, non posson esser che quelle che noi abbiain chiamate il *piteco* e il *magot*; e vi ha altresì ogni apparenza che al solo *magot* debbasi riferire il nome *ape* o *scimia* del paragone di Tyson. Debbo parimente osservare che quello Autore dà alcuni caratteri di rassomiglianza e di differenza, che non sono appoggiati ad un bastevole fondamento: ho creduto di dover fare sopra ciò alcune riflessioni. Forse mi si dirà che questa descrizione è troppo lunga, ma mi sembra che non si possa fare un esame troppo evidente d'un essere, che sotto umana figura non è tuttavia che un animale.

(a) *Simia dividuntur in cauda carentes quæ simia simpliciter dicuntur & caudatas quæ cercopitheci appellantur; quæ prioris generis sunt Anglice Apes dicuntur; quæ posterioris monkeys. Ray, Synops. quadrup., pag. 149.*

Primo. Tyson dà come un carattere particolare dell'uomo e dell'orang-outang, l'aver il pelo delle spalle diretto al basso, e quello del braccio diretto in alto. Egli è vero che la maggior parte dei quadrupedi hanno il pelo di tutte le parti del corpo diretto al basso o all'indietro, ma ciò non è senz'eccezione. Il pigro e il formichiere hanno il pelo delle parti anteriori del corpo diretto all'indietro, e quello della groppa e dei reni diretto all'innanzi. Questo carattere adunque non è d'un gran peso nel paragone di quest'animale coll'uomo.

Secondo. Ha parimente levate nella mia traduzione le prime quattro differenze, le quali, come queste, son troppo leggieri o mal fondate: la prima è la differenza della statura; questo carattere è molto incerto, e affatto gratuito, poichè l'Autore stesso dice che il suo animale era assai giovane: la seconda, terza e quarta non s'aggrano che sulla forma del naso, sulla quantità del pelo e sopra altri egualmente piccioli rapporti. Lo stesso dee dirsi di varj altri caratteri, ch'io ho levati, per esempio, del carattere 21. cavato dal numero dei denti. Egli è certo che questo animale e l'uomo hanno il medesimo numero di denti, e che s'egli non ne aveva che vent'otto, come dice l'Autore, è perchè era molto giovane, e si sa che l'uomo non ne ha di più nella sua giovinezza.

Terzo. L'undecimo carattere delle differenze dell'Autore è parimente molto equivoco. I fanciulli hanno le borse molto alzate; quest'animale essendo molto giovane non doveva averle pendenti.

Quarto. Il carattere 48. delle rassomiglianze, ed i 30, 31, 32, 33, e 34 caratteri delle differenze non dinotano che la presenza o la figura di certi muscoli, che nella specie umana variano per la maggior parte da un individuo all'altro, onde non debbono esser considerati come caratteri essenziali.

Quinto. Tutte le rassomiglianze e le differenze cavate da parti troppo piccole, come le apofisi delle vertebre, o prese dalla positura di certe parti, dalla loro grandezza, dalla loro grossezza, non debbono parimente esser considerate che come caratteri accessori, di modo che tutta la descrizione di questa tavola di Tyson si può ridurre alle differenze e alle rassomiglianze essenziali, che noi abbiamo additate.

Sesto. Credo di dover insistere sopra alcuni caratteri più generali, gli uni de' quali sono stati da Tyson ommessi, e gli altri male indicati; 1. l'orang-ourang è il solo fra tutte le scimie che non abbia borse al basso delle guance; tutt'i guenoni, tutt'i babbuini, ed anche il magot e il gibbono hanno fissate borse, ove possono conservare i loro alimenti prima d'inghiottirli: il solo orang-ou-

tang ha questa parte interna della bocca fatta come nell' uomo; 2. il gibbono, il magot, tutt' i babbuini e tutt' i guenoni, eccettuato il donc, hanno le natiche piatte e sopra di esse delle callosità: l'orang-outang è altresì il solo che abbia le natiche gonfie e senza callosità; anche il donc le ha senza callosità, ma piatte e pelose, cosicchè per questo riguardo il donc fa il digradamento tra l'orang-outang e i guenoni, come il gibbono e il magot fanno questo stesso digradamento rispetto alle borse delle guance, e il magot solo rispetto ai denti canini e all' allungamento del muso; 3. l'orang-outang è il solo che abbia polpe alle gambe, e le natiche carnose: questo carattere dinota ch' egli è fra tutti il meglio formato per camminar ritto in piedi: è solamente da notarsi che, siccome i diti de' suoi piedi son molto lunghi, e il suo tallone posa più difficilmente sul terreno che quello dell' uomo, così egli corre più facilmente che non cammina, ed avrebbe bisogno di talloni artificiali più alti di quelli delle nostre scarpe, se si volesse farlo camminar lungamente e con facilità; 4. benchè l'orang-outang abbia tredici coste e l' uomo non ne abbia che dodici, questa differenza non l' accosta più ai babbuini o ai guenoni di quello che lo allontani dall' uomo, perchè il numero delle coste varia nella maggior parte di queste specie, e perchè alcuni

di questi animali ne hanno dodici, altri undici ed altri dieci ec., di modo che le sole differenze essenziali tra 'l corpo di quest' animale e quello dell' uomo si riducono a due, cioè la struttura degli ossi del catino e la struttura dei piedi: queste sono le sole parti considerevoli, per le quali l' orang-outang rassomiglia più alle altre scimie che all' uomo.

In seguito a questa sposizione, che ho fatta con tutta quella esattezza di cui son capace, si comprende cosa debbasi pensare di quest' animale: se vi fosse un grado, pel quale si potesse discendere dalla natura umana a quella degli animali, se l' essenza di questa natura consistesse interamente nella forma del corpo e dipendesse dalla sua organizzazione, questa scimia si troverebbe più vicina all' uomo che a nessun altro animale; collocato nel second' ordine, s' egli non potesse comandare al primo, eserciterebbe almeno la sua superiorità sopra gli altri, e si sforzerebbe di non obbedire; se l' imitazione, che sembra copiare st' dappresso il pensiero, ne fosse il vero indizio o l' uno dei risultati, questa scimia si troverebbe anche ad una maggior distanza dagli animali e più vicina all' uomo. Ma, come già abbiain detto, l' intervallo, per cui quest' animale n' è realmente separato, non è meno immenso; e la rassomiglianza della forma,

84 *Stor. Nat. degli Orang-Outang, ec.*

la struttura dell'organizzazione, i movimenti d'imitazione, che sembrano risultare da siffatte rassomiglianze, nè lo accostano alla natura dell'uomo, nè tampoco lo sollevano al di sopra di quella degli animali.

Caratteri distintivi di questa specie.

L'orang-outang non ha borse alle guance, è senza coda, e senza callosità sulle natiche, le quali sono gonfie e carnose; ha tutt' i denti ed anche i canini simili a quelli dell'uomo; ha la faccia piatta, nuda e olivastro, le orecchie, le mani, i piedi, il petto e 'l ventre parimente nudi; ha de' peli sulla testa, che discendono a guisa di capelli dai due lati delle tempie, e del peto sul dorso e su i lombi ma in poca quantità; ha cinque o sei piedi di altezza, e cammina sempre ritto su i suoi due piedi. Non ci fu possibile di verificare se le femmine siano soggette come le donne ai periodici mestruai, ma lo presumiamo, e per analogia non ne possiam punto dubitare.

DESCRIZIONE

DEL JOCKO.

DEl jocko, che si faceva vedere in Parigi nel 1740., io non ho veduto che la pelle imbottita [tav. I.] e la maggior parte dello scheletro. Egli morì l'anno seguente in Londra, ove fu aperto; fu qui recato nell'acquavite e riposto nel Gabinetto; in seguito si fece imbottir la pelle e preparar lo scheletro. Questa scimia era stata presa in Africa nel fondo del Gabon, sulla costa d'Angola: essendo ritta in piedi, aveva due piedi e quattro o cinque pollici d'altezza, dal tallone fino alla sommità della testa. Era più grande di quella, che fu descritta da Tyfon sotto il nome di *pigmeo* (*), e che non oltrepassava l'altezza di due piedi. Dopo d'aver paragonata la descrizione del pigmeo di Tyfon col nostro jocko, ho trovati questi due animali sì somiglianti, che vi ha ogni luogo a credere ch'essi fossero della medesima specie, siccom' erano del medesimo paese.

La pelle, che ha servito di soggetto per questa descrizione, aveva alcuni peli duri full' orlo del labbro superiore e al dinanzi della mascella inferiore. Il resto della faccia era nudo, eccettuato

Tom. XXVIII.

E

(*) *Orang-outang, five homo silvestris*; on the anatomy of a pigmy, &c. Vol. I., in quarto, London, 1699.

le guance , ov' eranvi de' peli simili a quelli del rimanente del corpo . Trovavanfi delle ciglia sulle due palpebre , e alcuni peli al sito delle sopracciglia : ve n'erano de' grigj sul mezzo dello scroto e intorno all' ano . Il pelo della testa non era diverso da quello del resto del corpo pel suo color nero , nè per le altre sue qualità : il più lungo si trovava su i lati della faccia e sulle spalle ; esso aveva due pollici a due pollici e mezzo . Il pelo era bastevolmente folto per coprir la pelle sulla testa , sul dorso , sulle spalle , e sulla faccia esterna delle quattro gambe ; era molto raro , e lasciava veder la pelle sul petto , su i lati del ventre e sulla faccia interna delle quattro gambe : era diretto al basso su i lati della testa , e in alto sul lato esterno e posteriore della coscia , e sulla faccia esterna dell' avan-braccio , mentre il pelo del braccio era diretto al basso , cosicchè le punte de' peli al sito del gomito erano opposte le une alle altre . Tyson dà la direzione del pelo dell' avan-braccio del jocko , come un carattere comune coll' uomo , ma esso è comune altresì con molti animali .

Non potendo io prendere le misure esatte sopra una pelle imbottita , siccome è la pelle del jocko , che si trova nel Gabinetto del Re , riferisco nella seguente tavola le principali misure , che Tyson ha prese sul suo pigmeo , ch' era vivo ,

pied. poll. lin.

Altezza dal tallone fino alla sommità

della testa ————— 2. 0. '6.

pied. poll. lin.

Circonferenza del corpo presa sul bas-			
fo del petto —————	1.	3.	0.
La stessa circonfer. presa sulle anche	0.	9.	6.
Circonferenza della testa presa sugli			
occhi e le orecchie —————	1.	0.	6.
Apertura della bocca —————	0.	2.	1.
Altezza dal mezzo del labbro supe-			
riore fino alle sopracciglia ———	0.	2.	7.
Lunghezza dalle sopracciglia fino all'			
occipite —————	0.	7.	0.
Diametro dell' orecchia dal disopra			
al difotto —————	0.	2.	4.
Diametro trasversale —————	0.	1.	5.
Il giro dell' orecchia —————	0.	5.	2.
Circonferenza della parte dell' orec-			
chia, ch' era attaccata alla testa —	0.	2.	4.
Altezza dal difotto del pube fino alle			
clavicole —————	0.	9.	6.
Distanza tra l'ombelico e lo sterno —	0.	3.	3.
Distanza tra l'ombelico e 'l basso del			
pube —————	0.	2.	10.
Distanza tra i due capezzoli ———	0.	3.	0 $\frac{1}{2}$
Lunghezza del braccio dalla spalla			
fino all' estremità delle dita ———	1.	4.	0.
Circonferenza del braccio —————	0.	4.	1.
Circonferenza dell' avan-braccio ———	0.	4.	8.
Lunghezza della mano dalla giuntura			
fino all' estremità del dito medio —	0.	5.	2.
Lunghezza del pollice —————	0.	1.	3.

		<i>pie.</i>	<i>poll.</i>	<i>lin.</i>
Lunghezza del secondo dito —————	O.	1.	10	$\frac{1}{2}$
Lunghezza del dito medio —————	O.	2.	4.	
Lunghezza del quarto dito —————	O.	2.	3.	
Lunghezza del quinto dito —————	O.	1.	5.	
Circonferenza del pollice e del pic- col dito —————	O.	0.	11	$\frac{1}{4}$
Circonferenza degli altri diti —————	O.	1.	3.	
Lunghezza del palmo della mano ———	O.	2.	10.	
Larghezza —————	O.	1.	7	$\frac{1}{2}$
Altezza dal tallone fino all' estremità superiore dell' osso della coscia ———	O.	11.	3.	
Lunghezza dal tallone fino all' estre- mità del dito medio , ch' era il più lungo —————	O.	5.	5.	
Circonferenza della coscia —————	O.	5.	8.	
Circonferenza della gamba al sito più grosso —————	O.	4.	0.	
Circonferenza del piede presa all' ori- gine del pollice —————	O.	4.	8.	
Lunghezza del pollice —————	O.	1.	5.	
Lunghezza del secondo dito —————	O.	0.	11	$\frac{1}{4}$
Lunghezza del terzo —————	O.	1.	5.	
Lunghezza del quarto —————	O.	1.	2.	
Lunghezza del quinto —————	O.	0.	11	$\frac{1}{4}$
La maggior larghezza della pianta del piede all' origine del pollice ———	O.	1.	10	$\frac{1}{2}$
La stessa larghezza vicino al tallone	O.	1.	5.	
Circonfer. del pollice al sito più grosso	O.	1.	5.	
Circonferenza degli altri diti —————	O.	0.	11	$\frac{1}{4}$

Per dare qualche descrizione delle parti interiori del jocko, riferirò alcune osservazioni, che Tyfon ha fatte sulle viscere del suo pigmeo, cioè quelle che hanno maggior relazione al mio piano di descrizione.

Il ventre del pigmeo di Tyfon era piatto e largo come quello dell' uomo.

L'epiploon s'estendeva egualmente lungi che gl'intestini; esso era largo e molto sottile.

I giri degl'intestini e la loro situazione erano pressò a poco come nell'uomo.

Lo stomaco rassomigliava a quello dell'uomo; la sua gran circonferenza era di diciassette pollici, e la piccola di quasi un piede.

Gl'intestini avevano circa nove piedi di lunghezza, dal piloro fino al cieco; e la lunghezza del canale intestinale in intero, non compreso il cieco, era di dodici piedi in circa. L'appendice vermiculare era grossa come una penna d'oca. Gl'intestini tenui avevano due pollici e sette linee di circonferenza, e'l colon tre pollici e mezzo; esso era a proporzione un po' più lungo che nell'uomo, ma aveva la stessa situazione.

Il fegato rassomigliava a quello dell'uomo, aveva cinque pollici e due linee di lunghezza, due pollici e dieci linee di larghezza, e un pollice e otto linee di grossezza. La vescichetta del fiele era più lunga che nell'uomo e più staccata dal fegato: essa aveva tre pollici e nove linee di lunghezza.

La milza era di color piombato, e della stessa forma che quella dell' uomo: aveva due pollici e quattro linee di lunghezza, e un pollice e due linee di larghezza.

I reni rassomigliavano a quelli dell' uomo per la loro situazione, per l'estensione del catino, e per la struttura delle loro diverse sostanze; ma la loro cavità era men grande: essi avevano due pollici e una linea di lunghezza, un pollice e cinque linee di larghezza, e quasi un pollice di grossezza.

Il centro nervoso del diaframma era più esteso che nell' uomo.

I polmoni rassomigliavano a quelli dell' uomo: il destro era composto di tre lobi, e l' sinistro di due.

Il cuore era ottuso come quello dell' uomo.

La lingua era alquanto più stretta di quella dell' uomo.

Il cervello rassomigliava a quello dell' uomo, ed era a proporzione egualmente grande; pesava undici once e sette dramme. Il cervelletto rassomigliava parimente a quello dell' uomo.

I capezzoli erano al numero di due, uno da ciascun lato del petto, come nell' uomo.

Non vi era punto di scroto: i testicoli erano sotto la pelle nella regione del pube, ove formavano un' elevazione da ciascun lato della verga.

La verga era diversa da quella dell' uomo; aveva quasi due pollici di lunghezza, e un pollice e due linee di circonferenza alla radice; era composta di due corpi cavernosi, e puntuta all'estre-

mità; non vi era punto di freno.

La vescica era allungata, e meno sferica che nell' uomo. I testicoli, le vescichette feminali e le prostrati rassomigliavano a queste stesse parti vedute nell' uomo.

Lo scheletro del jocko, che mi ha servito di soggetto per questa Descrizione, fu tolto da un individuo giovane, e le epifisi non si erano interamente ossificate, onde l' ho paragonato ad uno scheletro di fanciullo, ch' è presso a poco nel medesimo stato, affine di poter conoscere con maggior precisione le somiglianze e le differenze, che sono tra 'l jocko e l' uomo rispetto alla figura degli ossi.

La testa del jocko è a proporzione men grossa di quella dell' uomo; ha minore altezza, minor larghezza, ed anche minor lunghezza, benchè le mascelle sian molto più sporgenti all' innanzi. L' osso del cranio ha minor capacità, principalmente nella sua parte posteriore; e in generale la testa del jocko è differentissima da quella dell' uomo per la sua figura. Le apofisi mastoide sono pochissimo apparenti. Non eravi punto di sutura coronale. Le grand' ali dell' osso sfenoide non sono sì estese come nell' uomo; esse non si prolungano tra l' osso temporale e il frontale fino all' osso parietale: al contrario il temporale e 'l frontale s' articolano insieme, ed il temporale tocca anche l' osso della guancia al disopra dello sfenoide; il che fa una gran differenza nella struttura della testa del jocko paragonata con quella dell' uomo. Pari-

mente la testa del jocko ha minore altezza dall' arco zigomatico fino alla sommità. Le mascelle son più lunghe che nell' uomo; gli ossi proprj del naso sono altresì più lunghi, e non formano punto di volta trasversale con quelli della mascella. L'apertura delle nari è situata più basso che nell' uomo, poich' essa è interamente al disotto delle orbite; essa ha minore altezza che nell' uomo, e la sua parte inferiore è molto più distante dall' orlo alveolare della mascella, e perciò il muso del jocko è allungato, e 'l suo labbro superiore è lunghissimo. Le orbite degli occhi son più grandi di quelle dell' uomo: il tramezzo osseo, che le separa, ha molto minor larghezza; per conseguenza gli occhi son molto meno distanti l' un dall' altro. Le orbite hanno maggior altezza che larghezza, mentre negli uomini sono ordinariamente più larghe che alte, o per lo meno queste due misure sono eguali. La parte superiore dell' orlo delle orbite è assai sporgente in forma di cordone che continua sul basso della fronte da un' orbita fino all' altra: siffatto cordone dà all' osso frontale del jocko una forma differentissima da quella dell' osso frontale dell' uomo, e sembra che con esso termini l' alto della faccia e ne separi la maggior parte dell' osso frontale. La faccia del jocko termina al basso coll' arco alveolare della mascella superiore. La base del mento, invece d' essere sporgente all' innanzi come nell' uomo, è rotonda e inclinata all' indietro: parimente il jocko non

ha punto di mento carnosso, sporgente e distinto dal labbro inferiore per via d'una piegatura trasversale, come il mento dell' uomo . Ho fatta la stessa osservazione sopra tutte le altre specie d'animali, che ho veduti in carne o in ischeletro .

Nello scheletro, di cui si parla, non vi restavano che due denti, ch' erano il secondo e l' terzo mascellare del lato destro della mascella inferiore . Essi rassomigliavano a quelli dell' uomo .

Paragonando le pareti interne del cranio del jocko con quelle del cranio dell' uomo, vi si trovano parimente delle differenze assai notabili nelle proporzioni di questa cavità: le fosse sono men grandi; non vi ha quasi nessun vestigio della prominenza dell'osso etmoide, chiamato *cresta di gallo ec.*

Il jocko è molto diverso dall' uomo per la situazione dell' articolazione della testa col collo, e per la direzione del piano del gran foro occipitale . Questo foro e i condili, che sono sul suo orlo, nel jocko si trovano situati più all' indietro cioè più vicino all' occipite e più lunghi dalla faccia, e per conseguenza l'apofisi basilar è molto più lunga (*). Supponendo il jocko ritto in piedi come un uomo, il piano del gran foro occipitale è diretto obliquamente dal basso all' alto, e

(*) Vedi le Memorie della Reale Accademia delle Scienze, anno 1754. Memoria sulle differenze della situazione del gran foro occipitale nell' uomo e negli animali .

dall' innanzi all' indietro , di modo che se nel jocko esso fosse prolungato all' innanzi , apparirebbe al di sotto della sua faccia . Al contrario nell' uomo questo piano è presso a poco orizzontale , e se fosse prolungato all' innanzi , passerebbe al di sotto degli occhi . Questa differenza tra 'l jocko e l' uomo relativamente all' articolazione della testa col collo fa che l' uomo avrebbe molto minor facilità che il jocko a presentare il suo viso all' innanzi , s' egli potesse le sue mani a terra per mettersi nell' attitudine dei quadrupedi , e che il jocko è costretto a inclinar la sua testa per presentar la sua faccia all' innanzi , quando è ritto in piedi nell' attitudine dell' uomo .

Le vertebre cervicali del jocko rassomigliano a quelle dell' uomo , ma le vertebre dorsali son diverse da quelle dell' uomo pel numero : ve ne son tredici , e per conseguenza tredici coste da ciascun lato , sette vere e sei false ; esse son men larghe e più grosse di quelle dell' uomo . Nello scheletro del jocko , che fa il soggetto di questa Descrizione , non essendo lo sterno interamente ossificato , non vi si distinguevano che i tre primi ossi . M' è sembrato che se l' ossificazione dello sterno fosse stata compiuta , le articolazioni delle coste collo sterno farebbero state disposte come nell' uomo . Le coste avevano minor curvatura e inclinazione al basso o all' indietro che nell' uomo , e per conseguenza lo sterno era più distante dalla colonna vertebrale .

Nello scheletro, di cui si parla, non eranvi che quattro vertebre lombari, ma ho scoperto che nel far questo scheletro era stata soppressa la seconda, onde credo che il jocko abbia cinque vertebre lombari, come asserisce Tyson (*). M'è sembrato che queste vertebre e le dorsali non fossero diverse da quelle dell' uomo se non perch' erano a proporzione più piccole.

L'osso sacro aveva cinque false vertebre come quello dell' uomo, ma era più piccolo, e s' allontanava meno dalla direzione della colonna vertebrale; era pure men concavo lungo la sua faccia interna.

Il coccix era composto di quattro o cinque pezzi, come nell' uomo, ma era più allungato, e molto men curvo verso il catino. Per queste differenze di direzione e di curvatura il jocko ha minor relazione all' uomo che ai quadrupedi, poich' essi hanno il sacro e le prime vertebre della coda situate presso a poco sulla stessa linea che la colonna vertebrale. Tyson ha osservato che il coccix del fatiro era alquanto sporgente, e formava un gonfiamento sulla pelle.

Gli ossi del catino del jocko hanno parimente maggior relazione a quelli de' quadrupedi che a quelli dell' uomo, non solo per la loro direzione, ma anche per la loro forma.

L'osso dell' anca è a proporzione più lungo e men largo che nell' uomo, e per conseguenza la sua

(*) Orang-outang, &c. pag. 69.

cresta ha minor lunghezza, il che diminuisce molto la larghezza dell' osso. La maggior differenza di lunghezza è in quella dell' orlo anteriore e dell' incavatura sciatica; così la parte dell' osso, che si trova tra 'l sacro e la cavità cotiloidea è lunghissima e dà al catino molto più di lunghezza che di larghezza, come nei quadrupedi, e al contrario di ciò ch' è nell' uomo. L' orlo anteriore dell' osso dell' anca non ha spine: non vi ha punto di convessità sulla faccia esterna, nè di concavità sulla faccia interna, come nell' uomo. Quest' osso è meno inclinato sulla colonna vertebrale che quello dell' uomo, e per conseguenza il piano dell' ingresso del catino forma colla colonna vertebrale un angolo più aperto nel jocko che nell' uomo.

Gli ossi pubi son più lunghi che nell' uomo, e contribuiscono cogli ossi delle anche a render l'ingresso del catino più lungo che largo, come nei quadrupedi. Gli ossi pubi s' articolano insieme, non solo col loro angolo, come nell' uomo, ma anche col loro ramo, come nei quadrupedi, di modo che formano una doccia sotto la vagina delle scimie femmine, come sotto quella delle femmine degli altri quadrupedi.

La tuberosità dell' ischio m' è paruta più grande che nell' uomo, benchè il jocko non abbia punto di callosità sopra quest' osso, come la maggior parte dell' altre scimie. Il foro ovale è più rotondo che nell' uomo al sito del suo orlo, ch' è formato dall' ischio, perchè il suo ramo s' allontana
di

di più dal corpo dell' osso per unirli al ramo del pube , oh' è parimente più allontanato dal corpo di quest' osso a cagione della sua unione col ramo dell' altr' osso pube .

L' omoplata è men largo e molto più lungo che quello dell' uomo ; per questa forma rassomiglia più all' omoplata dei quadrupedi . Il becco coracoide , l' acromion e le clavicole rassomigliano a queste stesse parti vedute nell' uomo .

La differenza più sensibile , ch' io abbia notata tra gli ossi del braccio e della coscia del jocko e dell' uomo , consiste nell' esser l' osso della coscia più corto .

Nello scheletro , che ha servito di soggetto per questa Descrizione , mancavano gli ossi dell' avanti braccio , della gamba , e dei piedi .

pied. poll. lin.

Lunghezza dall' estremità delle mascelle fino all' occipite —————	o.	5.	5.
La maggior larghezza della testa —	o.	3.	4.
Lunghezza della mascella inferiore dalla sua estremità anteriore fino all' orlo posteriore dell' apofisi condiloidea —————	o.	3.	5.
Groffezza della parte anteriore dell' osso della mascella superiore —	o.	o.	9.
Larghezza della mascella superiore al sito dei denti canini —————	o.	1.	7.
Distanza tra le orbite e l'apertura delle nari —————	o.	o.	5.
Lunghezza della detta apertura —	o.	o.	9.

98 *Descrizione del Jocko.*

	<i>pied. poll. lin.</i>		
Larghezza _____	o.	o.	8.
Lunghezza degli ossi proprj del naso	o.	1.	1.
Larghezza al sito più largo _____	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Larghezza delle orbite _____	o.	1.	1.
Altezza _____	o.	1.	2 $\frac{1}{3}$
Larghezza del foro della prima ver- tebra dall' alto al basso _____	o.	o.	8 $\frac{1}{4}$
Lunghezza da un lato all' altro _____	o.	o.	9.
Altezza dell' apofisi spinosa della se- conda vertebra _____	o.	o.	2.
Larghezza _____	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dell' ottava costa, ch' è la più lunga _____	o.	6.	2.
Lunghezza dello sterno _____	o.	3.	2.
Lunghezza del corpo della quarta ver- tebra lombare, ch' è la più lunga	o.	o.	7.
Larghezza della parte superiore dell' osso dell' anca _____	o.	2.	4.
Lunghezza dell' osso dal mezzo della cavità cotiloidea fino al mezzo del lato superiore _____	o.	4.	4.
Lunghezza dei fori ovali _____	o.	1.	2.
Larghezza _____	o.	o.	10.
Larghezza del catino _____	o.	1.	11.
Altezza _____	o.	3.	4.
Lunghezza dell' omoplata _____	o.	3.	6.
Larghezza nel mezzo _____	o.	1.	7.
Lunghezza dell' umero _____	o.	6.	9.
Lunghezza del femore _____	o.	6.	7.
			11.

IL PITECO (a).

VI sono, dice Aristotele, degli animali, la cui natura è ambigua ed ha parte di quella dell' uomo e parte di quella del quadrupede, come i *Pitechi*, i *Kebi* e i *Cinocefali*. Il kebe è un piteco con coda: il cinocefalo è tutto simile al piteco, solamente è più grande, e più forte, ed ha il muso più inoltrato, accostantesi quasi a quello dell' alano, e da ciò appunto egli tira il suo nome; egli è pure di costumi più feroci, e ha i denti più forti che il piteco, e più simili a quelli del cane. Conforme que-
 Tom. XXVIII. F 2

(a) Piteco. Πίθηκος, in Greco; *Simia*, in Latino; *Chinchin* nella Tartaria, secondo Rubruquis; e *Sinfin* nella China, secondo il P. du Halde.

Pithecus, Arist. *Hist. animal.* lib. II., cap. VII.

Simia, Gesner. *Hist. quad.*, pag. 847. fig. *ibid.*

Icon. quad., pag. 92. fig. *ibid.* *NOTA.* Questa è la stessa figura copiata.

Simia, Jonston, *de quad.* tab. 59. *Due figure.*

Simia simpliciter dicta, cauda carens. Ray, *Syn. quad.*, pag. 149.

Figura prima est earum simiarum quæ caudas non habent: hæc cæteris facilius & citius mansuefiunt, cæterisque solertiori ingenio præstant hilarioreque & versutiores existunt. Prosp. Alp. *Hist. Ægypti*, lib. IV., tab. 20., fig. 1.

Simia unguibus omnibus planis & rotundatis
 Le finge. Briss. *regn. anim.*, pag. 182.

sto passo, egli è chiaro che il piteco e il cinocefalo additati da Aristotele sono amendue sorniti di coda, poich' egli dice che i pitechi, che hanno coda, s'appellano *kebi*, e che il cinocefalo rassomiglia in tutto al piteco, eccettuato il muso ch' egli ha più inoltrato, e i denti ch' egli ha più grossi. Aristotele adunque fa menzione di due specie di scimie senza coda, il piteco e il cinocefalo, e d'altre scimie con coda, ch' egli chiama *kebi*. Noi però per paragonare ciò che sappiamo con ciò ch' era noto ad Aristotele, osserveremo che abbiain vedute tre specie di scimie, che non han coda, cioè, l'orang-outang, il gibbone e il magot, e che nessuna di queste tre specie è il piteco; poichè le prime due, cioè, l'orang-outang e'l gibbone non eran certamente note ad Aristotele, non trovandosi questi animali che nelle parti meridionali dell' Africa e dell' Indie, che a' suoi tempi non erano scoperte, e avendo essi de' caratteri differentissimi da quelli ch' egli dà al piteco. Ma la terza specie, che noi chiamiamo *magot*, è il cinocefalo d' Aristotele; egli ne ha tutt' i caratteri, non ha coda, ha il muso come un cane alano, e i denti canini grossi e lunghi: d'altra parte egli si trova comunemente nell' Asia minore e nelle altre provincie orientali, che ai Greci eran note. Il piteco è dello stesso paese, ma noi non lo abbiain

veduto, e non lo conosciamo che pel testimonio degli Autori; e benchè da vent'anni da che facciam ricerca di scimie, questa specie non ci sia mai capitata sotto gli occhi, non ostante non dubitiamo ch'essa non esista realmente del pari che quella del cinocefalo. Gesner e Jonston hanno date delle figure di questo piteco; il Sig. Brisson lo ha indicato come da lui veduto, lo distingue dal cinocefalo o magot, ch'egli pare dinota come da lui veduto, e conferma ciò che ha detto Aristotele, assicurando che questi due animali (a) si rassomigliano per tutt' i riguardi, eccettuato il muso, ch'è corto nel piteco o scimia propriamente detta, e allun-

F 3

- (a) Prima razza delle scimie, quelle che non han coda, e che hanno il muso corto. 1. La scimia. Ho vedute varie scimie, che non eran diverse tra loro che per la grandezza. La loro faccia, le loro orecchie e le loro ungue sono assai simili al viso, alle orecchie e alle ungue dell' uomo. Il pelo, che copre tutto il lor corpo, eccettuate le natiche che son nude, è milchiato di verdiccio e di gialliccio; il verdiccio domina nella parte superiore del corpo, e il gialliccio nella parte inferiore. Razza seconda delle scimie, quelle che non han coda, ed hanno il muso allungato. 1. La scimia cinocefalo: egli non è diverso dalla scimia che pel suo muso allungato come quello d'un cane; d'altra parte le rassomiglia in tutto. Ne ho veduti varj, che non eran tra lor diversi che per la grandezza. *Brisson regn. animal.*, pag. 189. e 191.

gato nel cinocefalo. Abbiain detto che l'orang-outang, il piteco, il gibbone e'l magot sono i soli animali, a cui debbesi applicare il nome generico di *scimia*, perch' essi sono i soli, che non han coda, i soli che camminano più volentieri e più spesso su due che su quattro piedi. L'orang-outang e il gibbone sono differentissimi dal piteco e dal magot; ma perchè quest' ultimi si rassomigliano in tutto, eccettuata la grandezza delle mascelle e la grossezza dei denti canini, sono stati sovente presi l'uno per l'altro; sono sempre stati indicati col nome comune di *scimia*, ed anche nelle lingue, che hanno un nome per le scimie senza coda e un altro per le scimie codate, non si è distinto il piteco dal magot; in Tedesco sono tuttedue chiamati collo stesso nome *aff*; e in Inglese *ape*: nella sola lingua Greca questi due animali hanno ciascuno il lor nome. Anche la parola *cinocefalo* è piuttosto una denominazione aggettiva che un sostantivo proprio, e per questa ragione noi non l'abbiamo adottato.

Dalle testimonianze degli Antichi sembra che il piteco sia il più mansucto e il più docile fra tutte le scimie che loro eran note, e ch' eran comuni nell' Asia egualmente che nella Libia e nell' altre provincie dell' Africa, le quali erano frequentate dai Viaggiatori Greci e Romani. Ciò mi fa presumere

che debbanfi riferire a questa specie di scimie i seguenti passi di Leone Africano e di Marmol. Eglino dicono che le scimie dalla coda lunga, che veggonsi nella Mauritania, e che gli Africani chiamano *Mone*, vengono dal paese de' Negri, ma che le scimie senza coda son naturali e si trovano in grandissima quantità nelle montagne della Mauritania, di Bugia e di Costantina: „ Esse „ hanno, dice Marmol, i piedi, le mani, „ e se si dee dir così, il viso dell' uomo; „ hanno molto spirito e malizia; vivono „ d'erba, di grano e d'ogni sorta di frutti, „ che vanno in truppa a rubare ne' giardini „ o ne' campi; ma prima d'uscire da' lor „ ricoveri ve n' ha una che sale sopra un' „ altura da dove scopre tutta la campagna, „ e quando non vede persona veruna, dà il „ segno alle altre con un grido per farle „ uscire, e mentre son fuori, essa non si „ move di là; ma tosto che scorge comparire qualcuno, getta altissime grida, e „ tutte saltando d'albero in albero si salvano nelle montagne. E' una cosa mirabile il vederle fuggire; poichè le femmine portano sul lor dorso quattro o cinque figli, e non lasciano con tutto ciò di far de' gran salti di ramo in ramo. Se ne prendono in quantità con diverse invenzioni, bench' esse sieno molto astute; allorchè divengono feroci, mordono, ma

„ per poco che vengano accarezzate s'addi-
„ mesticano facilmente, recano un gran dan-
„ no ai frutti e al grano, perchè non fan-
„ no altro che cogliere, tagliare e gettar
„ per terra sia esso maturo o no, e ne man-
„ dano in rovina molto più di quello che
„ mangiano e seco trasportano. Quelle che
„ sono addimesticate, fanno delle cose in-
„ credibili, imitando l'uomo in tutto ciò
„ che veggono (a) “. Kolbe riferisce pres-
sio a poco i medesimi fatti a proposito delle
scimie del Capo di Buona-Speranza, ma dal-
la figura e dalla descrizione, ch'egli ne dà,
si vede che tali scimie son babbuini, che
hanno una coda corta, il muso allungato,
le ugne aguzzate ec., e che son anche mol-
to più grosse e più forti delle sopraccennate
scimie della Mauritania (b). Si può adun-
que presumere che Kolbe abbia copiato il
passo di Marmol, ed abbia applicate ai bab-
buini del Congo le naturali abitudini dei
pitechi della Mauritania.

Il piteco, il magot e il babbuino, che
noi abbiain chiamato papione, erano tutti
e tre noti agli Antichi: parimente questi
animali si trovano nell'Asia minore, nell'
Arabia, nell'alto Egitto e in tutta la par-

(a) L'Africa di Marmol. *Tom. I.*, pag. 57.

(b) Vedi in seguito l'articolo del Papione.

te settentrionale dell'Africa ; si potrebbe adunque applicare egualmente questo passo di Marmol a tutti e tre . Ma egli è chiaro ch'esso non conviene al babbuino , poichè non vi si parla che di scimie senza coda ; e ciò che mi fa credere che questo Autore abbia parlato non già del magot ma del piteco , si è che il magot non è facile ad addimesticarsi , e che ordinariamente non produce che due figli , e non già quattro o cinque , come dice Marmol ; il piteco al contrario , ch'è più piccolo , ne dee produrre di più ; d'altra parte è più mansueto e più docile del magot , che non si addimestica che con fatica e non mai perfettamente . Mi son convinto per tutte queste ragioni che il citato passo degli Autori Africani non al magot ma al piteco debbesi riferire . Lo stesso dee dirsi di quello di Rubruquis , ov'è fatta menzione delle scimie del Cathay : egli dice „ ch'esse han-
„ no in tutto la forma e le maniere degli
„ uomini ; che non sonò più alte d'un
„ braccio e tutte coperte di peli ; che abitano in caverne ; che per prenderle vi si
„ portano delle bevande forti e da fare
„ ubbriacare ; ch'esse vengono tutte
„ insieme a gustare siffatta bevanda , e
„ gridando *chinchin* , per cui si è loro
„ dato il nome di *chinchin* , s'ubbricano
„ sì bene che s'addormentano , di modo
„ che i Cacciatori le prendono facilmente .

„ te (a) “. Quelli caratteri non convengono che al piteco, e niente affatto al magot. Noi abbiain veduto vivo quest' ultimo e non l'abbiamo mai sentito gridare *chinchin*; d'altra parte egli ha molto più d'un braccio d'altezza, e rassomiglia meno all'uomo di quello che dice l'Autore. Abbiamo avute le medesime ragioni per applicare al piteco e non già al magot la figura e l'indicazione di Prospero Alpino, colla quale egli assicura che le piccole scimie senza coda, che ha vedute in Egitto, s'addomesticano più presto e più facilmente che le altre, che hanno maggior intendimento e industria, e che sono altresì più allegre e più piacevoli di tutte le altre. Ora il magot è d'una statura grossa e assai grande, è sucido, tristo, feroce, e non s'addomestica che per metà. I caratteri adunque, che Prospero Alpino qui dà alla sua scimia senza coda, non convengono per nessun modo al magot, e non possono appartenere ad altro animale che al piteco.

Caratteri distintivi di questa specie.

Il piteco è affatto privo di coda, non ha i denti canini più grandi a proporzione di quelli dell'uomo, ha la faccia piatta, le

(a) Relations de Rubruquis, pag. 176. & suiv.

ngne parimente piatte e ritondate come quelle dell' uomo, cammina sopra i suoi due piedi, ha circa un braccio, cioè tutto al più un piede e mezzo d' altezza; il suo naturale è mansueto, e si addimestica facilmente. Gli Antichi hanno detto che la femmina è soggetta ai mestrui periodici, e l' analogia non ce ne lascia dubitare.



IL GIBBONE (a).

IL Gibbone si tien sempre ritto sulla persona, anche quando cammina a quattro piedi, perchè le sue braccia sono egualmente lunghe che il suo corpo e le sue gambe. Noi l'abbiam veduto vivo, e non aveva tre piedi d'altezza, ma era giovane ed era in ischiavitù: perciò si dee presumere ch'egli non avesse peranco acquistate tutte le sue dimensioni, e che nello stato di natura,

(a) *Gibbone*, questo è il nome, sotto il quale il Sig. Duplex ci ha data questa scimia, ch'egli aveva portata dalle Indie orientali: dapprincipio ho creduto che questa parola fosse Indiana, ma facendo delle ricerche sopra la nomenclatura delle scimie, in una nota di Dalechamp sopra Plinio ho trovato che Strabone ha dinotato il *Cephus* colla parola *Keipon*, da cui probabilmente è derivata la parola *Guibon*, *Gibbone*. Ecco il passo di Plinio, colla nota di Dalechamp; *Pompeii magni, primum laedi ostenderunt ex Æthiopia quas vocant cephos (*) quarum pedes posteriores pedibus humanis & cruribus, priores manibus fuere similes; hoc animal postea Roma non vidit.*

(*) *Cephos*) Strabo. lib. 15. *Kai wov vocat, esseque tradit facie satyro similem.* Dul. Plin. *Hist. nat.* lib. VIII. cap. xix. *Nota.* Mi pare che il *Cebus* dei Greci, e il *Cephus* di Plinio, che si debbono pronunziare *Kebus* e *Kephus* potrebbero bene derivare originariamente da *Koph* o *Kophin*, che in Ebreo e in Caldeo è il nome della scimia.

quand'è adulto, arrivi per lo meno a quattro piedi di altezza. Egli non ha nessuna apparenza di coda: il carattere però, che evidentemente lo distingue dalle altre scimmie, è una prodigiosa grandezza delle sue braccia, che sono egualmente lunghe che il corpo e le gambe prese insieme, di modo che l'animale stando ritto su i suoi piedi di dietro, le sue mani toccan terra tuttavia, e può camminare a quattro piedi, senza che il suo corpo si curvi. All'intorno della faccia egli ha un cerchio di peli grigi, cosicchè essa si presenta come se fosse circondata d'una cornice rotonda, il che dà a questa scimmia un'aria molto straordinaria. I suoi occhi son grandi, ma incavati; le sue orecchie nude e ben orlate, la sua faccia piatta, di color castagno e molto simile a quella dell'uomo. Il gibbone dopo l'orang-outang e il piteco è quello, che maggiormente s'accosterebbe alla figura umana, se la lunghezza eccessiva delle sue braccia non lo rendesse difforme; imperciocchè nello stato di natura anche l'uomo avrebbe una sembianza molto strana; la barba e i capelli se fossero negletti, formerebbero intorno al suo viso una cornice di pelo molto simile a quello, che circonda la faccia del gibbone.

Questo gibbone ci è paruto d'un natural tranquillo, e di costumi molto dolci; i suoi movimenti non erano nè troppo aspri nè trop-

po precipitati; prendeva mansuetamente ciò che gli si dava a mangiare; veniva nodrito di pane, di frutti, di mandorle, ec. Egli temeva molto il freddo e l'umidità, e non ha vivuto lungo tempo fuori del suo paese natio. E' originario delle Indie orientali, particolarmente delle terre di Coromandel, di Malaca e delle Isole Moluche (a). Sembra ch'egli si trovi parimente nelle provincie meno meridionali, e che debbasi riferire al gibbone la scimia del regno di Gannaure frontiera della China, che alcuni Viaggiatori hanno indicata sotto il nome di *sefè* (b).
Del

(a) Il P. le Comte dice di aver vedute nelle Moluche una specie di scimia, che camminava naturalmente sopra i suoi due piedi, si serviva delle sue braccia come un uomo, aveva il viso presso a poco come quello d'un Ottentotto, ma il corpo tutto coperto d'una specie di lana grigia, era esattamente come un fanciullo ed esprimeva perfettamente le sue passioni e i suoi appetiti. Aggiunge che queste scimie sono d'un natural mansuetissimo, che per mostrare la loro affezione alle persone, che conoscevano, le abbracciavano e le baciavano con trasporti singolari, che una di tali scimie da lui vedute aveva per lo meno quattro piedi di altezza, ed era estremamente destra ed anche più agile. *Mémoires sur la Chine, par Louis le Comte, pag. 510.*

(b) Nel regno di Gannaure, frontiera della China, si trova un animale, ch'è molto raro, e che gli abitanti chiamano *sefè*: egli ha quasi la forma umana, le braccia molto lunghe, il corpo nero e peloso, e cammina molto leggiermente

Del resto questa specie suol variare per la grandezza e pe' colori del pelo : ve ne son due nel Gabinetto, il secondo de' quali benchè adulto è molto più piccolo del primo, e non ha che del bruno in tutt' i siti ove l'altro ha del nero. Ma siccom'essi si rassomigliano perfettamente per tutti gli altri riguardi, così non dubitiamo che non sian tutt'edue d'una sola e medesima specie.

Caratteri distintivi di questa specie.

Il gibbone non ha coda; ha le natiche pelate con leggieri callosità; la sua faccia è piatta, bruna e circondata tutt' all' intorno d'un cerchio di peli grigi; egli ha i denti canini a proporzione più grandi di quelli dell' uomo; ha le orecchie nude, nere e ritondate; il pelo bruno o grigio secondo l'età o la razza; le braccia eccessivamente

e molto presto. *Récueil des voyages, &c. Rouen, 1716. Tom. III., pag. 168. NOTA.* 1. Questo carattere delle braccia molto lunghe non appartiene che a questa scimia, e per conseguenza dinota assai chiaramente che il *fefè* è lo stesso che il gibbone. *NOTA.* 2. Si può presumere che la parola *fefè* derivi da *jefef* o *sesef*, nome del babbuino nelle provincie dell' Africa vicine all' Arabia, e che si sia trasferito questo nome dal babbuino al gibbone; imperciocchè il babbuino non ha le braccia più lunghe delle altre scimie.

112 *Storia Natur. del Gibbone.*

lunghe ; cammina su i suoi due piedi di dietro ; ha due piedi e mezzo o tre piedi di altezza . La femmina è soggetta , come le donne , ai mestrui periodici .



DE-

DESCRIZIONE

DEL GIBBONE.

IL gibbone [*tav. II.*] ha la testa rotonda, gli occhi grandi e incavati, il naso piatto, le orecchie rotonde e orlate presso a poco come quelle dell'uomo. Vi sono delle callosità sulle natiche (*), ma non vi ho ritrovata nessun'apparenza di coda. Le gambe anteriori sono molto più lunghe delle posteriori e eccessivamente lunghe, poichè stando l'animale ritto in piedi, e tenendo pendenti le sue gambe anteriori, le loro dita toccavano terra. Ho udito dire che quello, che ha servito di soggetto per questa Descrizione, tenevasi spesso nella detta attitudine. Il contorno degli occhi, il naso e l'estremità delle due mascelle eran nude e di color bruno. Eravi una fascia in forma di circolo, formata da peli grigi, che passava al disopra degli occhi, sulle guance, e sotto la mascella inferiore: siffatto circolo grigio dava un'aria molto

Tom. XXVIII. G

(*) Tali callosità son formate da un'unione della pelle alle tuberosità delle ossa ischio, su cui havvi una piccola faccia coperta da una pelle callosa e nuda: in questi due siti le natiche sembrano esser pelate, e perciò le callosità, di cui si parla, si possono anche dinotare co i nomi di *natiche pelate*. Non ho notato questo carattere in verun sapajous, nè in verun fagoino.

straordinaria alla faccia di questa scimia. Le orecchie eran nude e di color nericcio. Il pelo della testa, del collo, del dorso, dei lati del corpo e delle gambe era nero: quello che copriva la faccia superiore dei piedi aveva un color grigio: la pianta era nuda e di color nero; le ugne eran parimente di questo colore.

pieđ. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero, misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano	1.	3.	6.
Lunghezza della testa dall' estremità del muso fino all' occipite	0.	4.	4.
Circonferenza dell' estremità del muso	0.	4.	2.
Circonferenza del muso presa sotto gli occhi	0.	5.	3.
Contorno dell' apertura della bocca	0.	2.	3.
Distanza tra le due nari	0.	0.	1.
Distanza tra l' estremità del muso, e l' angolo anteriore dell' occhio	0.	4.	3.
Distanza tra l' angolo posteriore, e l' orecchia	0.	0.	11.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro	0.	0.	6.
Apertura dell' occhio	0.	0.	4.
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi	0.	0.	10.
Circonferenza della testa presa tra gli occhi e le orecchie	0.	9.	6.
Lunghezza delle orecchie	0.	0.	7.

pied. poll. lin.

Larghezza della base misurata sulla			
curvatura esteriore —————	o.	2.	o.
Distanza tra le due orecchie presa al			
basso —————	o.	2.	o.
Lunghezza del collo —————	o.	3.	6.
Circonferenza del collo —————	o.	7.	6.
Circonferenza del corpo presa dietro			
le gambe anteriori —————	1.	1.	o.
Circonferenza al sito più grosso —	1.	3.	o.
Circonferenza dinanzi le gambe po-			
steriori —————	o.	11.	6.
Lunghezza dell'avan-braccio dal go-			
mito fino alla giuntura della mano	o.	9.	6.
Circonferenza della giuntura ———	o.	3.	8.
Lunghezza dalla giuntura fino all'			
estremità delle ugne —————	o.	6.	6.
Lunghezza della gamba dal ginocchio			
fino al tallone —————	o.	7.	o.
Lunghezza dal tallone fino all'estre-			
mità delle ugne —————	o.	5.	4.

Questa scimia era femmina e pesava nove libbre. L'epiploon s'estendeva fino al pube. Lo stomaco trovavasi in maggior parte a sinistra che a destra. Il fegato era interamente situato nel lato destro.

Il duodeno era molto corto; e si ripiegava all'indietro quau all'uscir dallo stomaco. Il digiuno faceva i suoi giri nella regione ombelicale e nel lato sinistro sopra quelli dell'ilco, che s'estende-

vano pure nella regione iliaca sinistra. Il cieco era situato nella regione ipogastrica e diretto dall'innanzi all'indietro. Il colon s'estendeva all'innanzi nel lato destro, passava da destra a sinistra dietro lo stomaco, si prolungava all'indietro lungo il lato sinistro sopra gl'intestini tenui, e si ripiegava sull'orlo del catino prima di unirsi al retto, ch'era molto corto.

Gl'intestini tenui avevan tutti presso a poco la stessa grossezza, eccettuato l'ileo [A B, *tav. IV.*, *fig. 1.*], che s'impiccioliva avvicinandosi al cieco [C]. Quest'intestino era grosso e corto, e terminava con un'appendice [D E] che aveva cinque pollici di lunghezza, e circa due linee e mezzo di diametro. Il colon [F G] era grossissimo vicino al cieco, e incurvato alla distanza di due pollici e mezzo in circa dal detto intestino. Il resto del colon si diminuiva di grossezza accostandosi al retto. Sul colon eranvi tre fasce tendinee.

Il fegato [*tav. IV.*, *fig. 2.*] era diviso in due parti per via d'una scissura [A] poco profonda, nella quale passava il legamento sospensorio. La parte destra del fegato era più grande che la sinistra: alla loro radice si trovava un lobetto [B]. Questo fegato aveva un color rossiccio, più pallido nel suo interno che all'esterno. Esso pesava cinque once tre dramme e mezzo.

La vescichetta del fiele [C, *tav. IV.*, *fig. 2.*] era verdiccia e situata sulla faccia posteriore del fegato, vicino alla scissura, ove si trovava il legamento sospensorio.

La milza [*tav. IV., fig. 3.*] era situata contro il fondo dello stomaco. La sua figura s'accostava a quella d'un triangolo, la cui base fosse al basso e la sommità all'alto. Essa aveva esteriormente e interiormente un color rossiccio, e pesava due dramme.

Il pancreas aveva una forma allungata, e s'estendeva dal duodeno fino alla milza. Esso rassomigliava molto al pancreas dell'uomo.

Il rene sinistro era più innoltrato che 'l destro d'un terzo in circa della sua lunghezza. Essi avevano una forma presso a poco ovale. La loro faccia superiore era piatta, e l'inferiore convessa: la cavità era poco profonda. La maggior parte dei capezzoli erano attaccati gli uni agli altri. La piccola pelvi era poco estesa.

Il polmon destro era composto di quattro lobi, situati e proporzionati come nella maggior parte degli animali quadrupedi. Nel polmon sinistro non eravi che un lobo, ma era diviso per via d'una profonda scissura in due parti, l'anteriore delle quali era più piccola dell'altra. Il cuore rassomigliava molto a quello dell'uomo per la sua figura e per la sua situazione.

La lingua era larga, grossa e rotonda all'estremità. La parte anteriore era coperta di papille piccolissime e di tubercoli rotondi e bianchi. Sulla parte posteriore eranvi delle grosse papille e varie glandule a calice, due delle quali erano situate sul mezzo della lingua, ma da ciascun

lato, a quattro linee di distanza l'una dall'altra. Il lor diametro era d'una linea in circa.

Il palato era attraversato da sei solchi molto larghi e poco elevati: essi erano separati per mezzo d'un solco longitudinale, e ciascuna delle loro parti era convessa all'innanzi. La parte posteriore del palato aveva un color nericcio. L'epiglottide era poco sporgente e tagliata in quadro alla sua estremità.

Il cervello era molto grande; s'estendeva tanto lungi nell'occipite quanto il cervelletto. Il cervello pesava due once due dramme e quarantotto grani, e'l cervelletto quattro dramme e dodici grani.

Eranvi due capezzoli sul petto, uno da ciascun lato. Essi non eran distanti l'un dall'altro che quindici linee.

La vulva era situata tra due callosità [A B, *tav. V., fig. 1.*] unite agli ossi ischi; ciascun d'essi aveva un pollice di lunghezza e nove linee di larghezza; non eran distanti l'un dall'altro che tre linee in circa.

Le labbra della vulva [C] eran poco grosse, e la sua parte anteriore terminava con un piccol becco curvato al basso. La ghianda della clitoride non era esteriormente apparente: non vedevasi che il prepuzio [D] che formava il becco inferiore della vulva, di cui si è fatta menzione. La vescica [A, *fig. 2.*] aveva minor diametro nel mezzo che alle due estremità. Gli orli dell'orifizio [B] erano in-

crespati ; il corpo terminava con due prolungamenti molto corti [C D] e differentissimi dai corni della matrice degli altri animali : le ovaje [E F , fig. 1. e 2.] avevano una figura accostantefi all' ovale , e un color gialliccio pallidissimo . Si son rappresentate fig. 2. le pareti interiori [G H] della vagina ; l' orifizio [I] dell' uretra contraffegnato da uno filetto K L , e le trombe [M N] della matrice .

pied. poll. lin.

Lunghezza degl' intestini tenui dal pi-

loro fino al cieco ————— 7. 0. 0.

Circonferenza del duodeno ————— 0. 2. 3.

Circonferenza del digiuno ————— 0. 2. 6.

Circonferenza dell' ileo nei fiti più

grossi ————— 0. 2. 9.

Circonferenza nei fiti più sottili — 0. 2. 2.

Lunghezza del cieco ————— 0. 1. 2.

Circonferenza del cieco al fito più

grosso ————— 0. 6. 0.

Circonferenza al fito più sottile — 0. 2. 0.

Circonferenza del colon nei fiti più

grossi ————— 0. 10. 0.

Circonferenza nei fiti più sottili — 0. 3. 9.

Circonferenza del retto vicino al colon 0. 3. 4.

Circonferenza del retto vicino all' ano 0. 5. 0.

Lunghezza del colon e del retto pref-

insieme ————— 1. 7. 0.

Lunghezza del canale intestinale in

intero , non compreso il cieco — 8. 7. 0.

Gran circonferenza dello stomaco — 1. 1. 6.

pied. poll. lin.

Piccola circonferenza —————	o.	10.	0.
Larghezza della piccola curvatura , dall' angolo che forma la parte de- stra fino all' esofago —————	o.	1.	8.
Profondità del fondo dello stomaco —	o.	1.	8.
Circonferenza dell' esofago —————	o.	3.	0.
Circonferenza del piloro —————	o.	1.	6.
Lunghezza del fegato —————	o.	2.	10.
Larghezza —————	o.	5.	2.
La sua maggior grossezza —————	o.	1.	3.
Lunghezza della vescichetta del fiele	o.	1.	9.
Il suo maggior diametro —————	o.	0.	7.
Lunghezza della milza —————	o.	2.	1.
Grossezza nel mezzo —————	o.	0.	4.
Grossezza del pancreas —————	o.	0.	3.
Lunghezza dei reni —————	o.	1.	8.
Larghezza —————	o.	1.	0.
Grossezza —————	o.	0.	8.
Lunghezza del centro nervoso del dia- framma , dalla vena-cava fino alla sua punta —————	o.	1.	0.
Larghezza —————	o.	1.	3.
Circonferenza della base del cuore —	o.	4.	9.
Altezza dalla punta fino all' origine dell' arteria polmonare —————	o.	1.	10.
Altezza dalla punta fino al sacco pol- monare —————	o.	1.	6.
Diametro dell' aorta preso exterior- mente —————	o.	0.	3.

pied. poll. lin.

Lunghezza della lingua —————	o.	2.	1.
Lunghezza della parte anteriore dal freno fino all' estremità —————	o.	o.	3.
Larghezza della lingua —————	o.	o.	9.
Lunghezza del cervello —————	o.	2.	9.
Larghezza —————	o.	2.	3.
Groffezza —————	o.	1.	4.
Lunghezza del cervelletto —————	o.	o.	11.
Larghezza —————	o.	1.	10.
Groffezza —————	o.	o.	10.

Nel Gabinetto del Re vi ha un' altra scimia [*tav. III.*] somigliantissima al gibbono [*tav. II.*], ma molto più piccola : bench' essa sia dissecata e imbottita , si possono nondimeno avere le sue misure con bastevole precisione , perchè si son lasciati tutti gli ossi sotto la pelle . Essa è circa un terzo men grande del gibbono , che abbiamo qui dietro descritto . Il piccol gibbono sembra aver tutte le proporzioni del grande ; ha le gambe e i piedi anteriori egualmente lunghi ; le stesse fattezze nella faccia ; la stessa forma nelle orecchie e nelle ugne ; lo stesso colore sulla faccia , sulle orecchie , sulle ugne e sulla pianta de' piedi : ha le natiche pelate e senza verun' apparenza di coda ; finalmente rassomiglia perfettamente al gibbono per la sua figura . Egli ha pure la faccia circondata di peli grigi , che formano un cerchio sul basso della fronte , sulle tempie , sulle guance e sotto la mascella inferiore : i suoi quattro piedi son parimente coperti

di peli grigi, ma i colori del pelo delle altre parti del corpo son diversi da quelli del gibbon grande. La testa, il disotto e i lati del collo, la parte anteriore del dorso, le spalle, il braccio, e la faccia esterna dell' avan-braccio son di color bruno e non già nero: il disotto del collo, la faccia interna dell' avan-braccio, il petto, il ventre, la coscia, i lati del corpo e la gamba propriamente detta, non son di color nero, come sul gibbon grande, ma di color grigio mischiato di bruno: la parte posteriore del dorso e la groppa hanno un color grigio, e non già nero. Io non so se questa differenza di colore dal grigio al nero non provenga che dalla differenza dell' età, supponendo che 'l piccol gibbon sia della medesima specie che 'l grande, ma di un' età meno avanzata. Egli è certo che queste differenze di colori non provengono dalla differenza del sesso, poichè questi due animali erano femmine. Il piccolo fu portato da Malaca, dal Sig. Comandante Godeheu, e il grande da Pondichery, dal Sig. Dupleix.

La testa dello scheletro [*tav. FV.*] del gibbon grande è meno allungata di quella del jocko: il cranio ha maggior estensione al sito dell' occipite: l' osso frontale è piatto: l' orlo superiore delle orbite è molto meno sporgente; il piccol cordone ch' esso forma non s' estende da un occhio all' altro come nel jocko. Al contrario lo spazio, che si trova tra i due occhi al disopra del naso, è un poco incavato. Le orbite degli occhi hanno mag-

gior larghezza che altezza come nell' uomo : il tra-
mezzo osseo , che separa le due orbite , è più largo
che nel jocko , e presso a poco egualmente largo
che nell' uomo . Gli ossi proprj del naso son molto
più lunghi di quelli dell' uomo , ma men lunghi
di quelli del jocko : parimente l'apertura delle nari
non è interamente al disotto di quelle delle or-
bite , e la sua parte inferiore è meno distante dall'
orlo alveolare della mascella , il che rende il muso
meno allungato . Così il gibbone ha maggior rela-
zione all' uomo che al jocko per le proporzioni
delle orbite degli occhi e per l'intervallo , ch' è
tra essi , per la situazione dell' apertura delle nari ,
ch' è situata in parte tra le orbite , e per la piccola
distanza che si trova tra l'apertura delle nari e l'orlo
alveolare della mascella ; il che fa che il labbro
superiore del gibbone è men lungo di quello del
jocko e più simile a quello dell' uomo . La forma
della mascella inferiore è presso a poco la stessa
in amendue questi animali .

I denti del gibbone rassomigliano a quelli dell'
uomo pel numero e per la situazione , ed anche
per la forma , eccettuati i canini , che son puntuti
e molto più lunghi : quelli del disopra hanno una
leggiere scanalatura longitudinale sul lato interno .

Le vertebre cervicali son diverse da quelle dell'
uomo e dell' jocko , perchè l'apofisi spinosa della
prima è più lunga , e perchè quelle delle altre ver-
tebre non son forcute .

Il gibbone non ha che dodici vertebre dorsali

come l'uomo, e dodici coste da ciascun lato, sette vere e cinque false; esse non sono sì grosse come quelle del jocko. Lo sterno è composto di sei ossi, i primi de' quali rassomigliano a quelli del jocko e dell'uomo. Le prime coste, una da ciascun lato, s'articolano colla parte anteriore del prim' osso dello sterno; l'articolazione delle seconde coste è tra 'l primo e 'l second' osso dello sterno; quella delle seconde tra 'l secondo e 'l terz' osso, e così di seguito fino alle sette e settime coste, che s'articolano tra 'l quinto e 'l sest' osso dello sterno.

Le vertebre lombari sono al numero di sei, onde ve n'ha una di più che nell'uomo e nel jocko.

L'osso sacro non è composto che di tre false vertebre. Nel coccide dello scheletro, su cui è stata fatta questa descrizione, non eranvi che tre pezzi, ma mi è sembrato che mancasse per lo meno un pezzo del coccide.

Gli ossi del catino son diversi da quelli del jocko, perchè gli ossi delle anche sono più stretti, e perchè il piano dell'ingresso del catino è sulla stessa linea che la colonna vertebrale: per questo riguardo il gibbone ha anche maggior relazione ai quadrupedi che al jocko. La tuberosità degli ossi ischj è molto più grande che nel jocko, ed ha una faccia piatta, su cui era la callosità, che si trova da ciascun lato dell'ano sulla pelle del gibbone.

L'omoplata e le clavicole son poco differenti da questi stessi ossi veduti nel jocko.

Gli ossi del braccio e dell'avan-braccio hanno

una lunghezza eccessiva . L'osso del braccio è più lungo di quello della coscia : gli ossi dell'avan-braccio son molto più lunghi di quelli della gamba , al contrario di ciò che vedesi nell' uomo , imperciocchè egli ha gli ossi del braccio e dell'avan-braccio molto men lunghi di quelli della coscia e della gamba . Gli ossi dell'avan-braccio del gibbone son molto più allontanati l'un dall'altro che nell'uomo .

Il carpo è composto di undici ossi , quattro nel prim'ordine , quattro nel secondo e tre soprannumerarj (*). Gli ossi del second'ordine son situati come nell'uomo , relativamente agli ossi del metacarpo , ma ne son diversi per la figura , principalmente il quarto , ch'è più lungo del terzo che corrisponde al grand'osso del carpo dell'uomo , di modo che mette capo al second'osso del prim'ordine . Il terz'osso di quest'ordine è situato sul quarto del second'ordine , e tocca il quinto del prim'ordine , che corrisponde al pisiforme dell'uomo , ma è bislungo come nella maggior parte dei quadrupedi . Il primo dei soprannumerarj si trova situato sull'unione , ch'è tra 'l terzo e 'l quart'osso del prim'ordine . Il second'osso soprannumerario è molto piccolo e situato al lato interno del carpo , in parte contro il prim'osso del prim'ordine , e in parte contro il prim'osso del second'ordine . Il terz'osso soprannumerario è tra i due ordini del carpo al disotto del primo e del second'osso del

(*) Prima di questa descrizione non se ne conosceva che uno ,

prim' ordine , e al disopra del secondo e del terz' osso del second' ordine .

Il tarso è composto di sett' ossi come nell' uomo . Il primo cuneiforme è molto men grosso di quello dell' uomo . Nel gibbono vi ha di più un ottavo osso situato al lato esterno del tarso , al sito ove il calcagno tocca il cuboide .

Gli ossi del metacarpo e dei diti sono a proporzione egualmente lunghi che quelli dell' avan-braccio e del braccio . Ma il prim' osso del metacarpo è molto men lungo che gli altri , e la prima falange del pollice ha parimente a proporzione minor lunghezza che nell' uomo .

Gli ossi del metatarso e degli ultimi quattro diti hanno una lunghezza proporzionata a quella degli ossi della gamba e della coscia . Il prim' osso del metatarso ha minor grossezza che quello dell' uomo , ed è molto allontanato dal second' osso colla sua estremità anteriore . Le due falangi del pollice sono men lunghe e men grosse che nell' uomo , relativamente alle falangi degli altri diti . Le falangi del terzo son più lunghe di quelle del secondo , ch' è della stessa lunghezza che il quarto , come in una mano . Il pollice dei piedi del gibbono è presso a poco della stessa lunghezza che quello delle mani ; ma relativamente alla lunghezza dei diti , è molto più lungo .

pie'd. poll. lin.

Lunghezza della testa dall' estremità

delle mascelle fino all' occipite — o. 3. $8\frac{1}{2}$

pied. poll. lin.

La maggior larghezza della testa —	o.	2.	$6\frac{1}{2}$
Lunghezza della mascella inferiore , dalla sua estremità anteriore fino all' orlo posteriore dell' apofisi con- diloidea —————	o.	2.	5.
Grosshezza della parte anteriore dell' osso della mascella superiore —	o.	o.	$2\frac{1}{2}$
Larghezza della mascella superiore al sito dei denti canini —————	o.	o.	11.
Distanza tra le orbite e l'apertura delle nari —————	o.	o.	$3\frac{1}{4}$
Lunghezza della detta apertura —	o.	o.	7.
Larghezza —————	o.	o.	6. /
Lunghezza degli ossi proprij del naso	o.	o.	$6\frac{1}{2}$
Larghezza al sito più largo ———	o.	o.	3.
Larghezza delle orbite —————	o.	o.	10.
Altezza —————	o.	o.	10.
Lunghezza dei denti canini ———	o.	o.	5.
Larghezza del foro della prima ver- tebra dall' alto al basso ———	o.	o.	$5\frac{1}{3}$
Lunghezza da un lato all' altro —	o.	o.	$5\frac{1}{4}$
Altezza dell' apofisi spinosa della se- conda vertebra —————	o.	o.	2.
Larghezza —————	o.	o.	$2\frac{3}{4}$
Lunghezza dell' ottava costa, ch' è la più lunga —————	o.	4.	10.
Lunghezza dello sterno ———	o.	2.	7.
Lunghezza del corpo della quarta ver- tebra lombare , ch' è la più lunga	o.	o.	5.

Larghezza della parte superiore dell'osso dell' anca	o.	1.	3.
Lunghezza dell'osso dal mezzo della cavità cotiloidea fino al mezzo del lato superiore	o.	3.	2 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dei fori ovali	o.	o.	9 $\frac{1}{2}$
Larghezza	o.	o.	6 $\frac{1}{2}$
Larghezza del catino	o.	1.	6 $\frac{1}{2}$
Altezza	o.	2.	5.
Lunghezza dell'omoplata	o.	2.	8.
Larghezza nel mezzo	o.	1.	4.
Lunghezza dell'umero	o.	7.	11 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dell'osso dell'ulna	o.	9.	o.
Lunghezza dell'osso del radio	o.	8.	10.
Lunghezza del femore	o.	7.	1.
Lunghezza della tibia	o.	6.	1.
Lunghezza del peroneo	o.	5.	8.
Altezza del carpo	o.	o.	7.
Lunghezza del calcagno	o.	o.	11.
Altezza del prim'osso cuneiforme, e dello scafoide presi insieme	o.	o.	7.
Lunghezza del prim'osso del metacarpo, ch'è il più corto	o.	1.	4.
Lunghezza del second'osso del metacarpo, ch'è il più lungo	o.	2.	4.
Lunghezza del primo e del quint'osso del metatarso, che sono i più corti	o.	1.	4 $\frac{2}{3}$
Lunghezza del terzo, ch'è il più lungo	o.	1.	7 $\frac{1}{2}$

pied. poll. lin.

Lunghezza della prima falange del			
pollice dei piedi anteriori —————	o.	o.	$8\frac{1}{2}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	$4\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del			
terzo dito —————	o.	l.	$7\frac{2}{3}$
Lunghezza della seconda —————	o.	l.	2.
Lunghezza della terza —————	o.	o.	5.
Lunghezza della prima falange del			
pollice dei piedi posteriori —————	o.	o.	$8\frac{5}{2}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	5.
Lunghezza della prima falange del			
terzo dito —————	o.	l.	1.
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	$7\frac{3}{4}$
Lunghezza della terza —————	o.	o.	$4\frac{1}{4}$



IL MAGOT (a).

Questo animale fra tutte le scimie, cioè, fra tutte quelle che non han coda (b),

(a) *Magot*, nome antico di questa Scimia in Francese, e che noi abbiamo adottato. *Monomet*, secondo Jonston; è itato altresì chiamato *Tartarin*, perchè è molto comune nella Tartaria meridionale.

Cynocephalus. Aristotelis. *Hist. anim.* lib. II., cap. VIII.

Cynocephalus primus. Jonston, fig. tab. 59.

Cynocephalus alter. Prosp. Alpin. *Ægypt.* Vol. II., pag. 241., fig. tab. 16.

Simia cynocephala omnibus unguibus planis & rotundatis. . . . La scimia cinocéfala. Brisson, *Regn. anim.*, pag. 191. *Nota*. Ci sembra che il Sig. Brisson si sia ingannato sulla forma delle ugne di questa scimia. Egli è vero che quelle dei pollici dei piedi anteriori e dei piedi posteriori sono piatte e ritondate presso a poco come quelle dell' uomo; le ugne però degli altri diti son curve e rovesciate in forma di doccia.

Sylvanus, simia ecandata clunibus tuberoso callosis. *Cercopithecus*, Jonston, quad. tab. 59., fig. 5. Linn. *Syst. nat.* edit. X., pag. 25. *Nota*. Ci pare che il Sig. Linneo si sia ingannato nel riferire quest' animale al *Cercopiteco* di Jonston, egli è piuttosto il *Cinocefalo* della stessa Tavola; egli è ben vero che questo *Cinocefalo* e questo *Cercopiteco* si potrebbero riguardare come il medesimo animale, se il pelo di quest' ultimo non fosse troppo folto e troppo lungo.

(b) Egli è certo che questa scimia è senza coda, benchè ne abbia una leggiera apparenza formata da una piccola appendice di pelle d' un mezzo

è quello che meglio s'adatta alla temperatura del nostro clima. Noi ne abbiám mantenuto uno per varj anni: di state egli stava volentieri esposto all'aria, e d'inverno si poteva tenerlo in una stanza senza fuoco. Sebben non fosse delicato, era nondimeno sempre tristo e sovente lucido; faceva eguali smorfie per dinotar la sua collera e per mostrare il suo appetito; i suoi movimenti erano aspri, le sue maniere grossolane e la sua fisionomia più difforme che ridicola; per poco ch'egli fosse agitato di passione, mostrava e digrignava i denti dimenando la mascella; riempiva le borse delle sue guance di tutto ciò che gli si dava, e mangiava generalmente di tutto, eccettuato la carne cruda, il formaggio ed altre cose fermentate; amava di andare a coricarsi per dormire sopra una grata di ferro; era sempre tenuto alla catena, perchè malgrado la sua lunga vita domestica, non era niente più civilizzato, niente più affezionato verso i suoi padroni; apparentemente egli era stato mal educato, poichè ne ho veduti altri della medesima

pollice in circa di lunghezza, che si trova al disopra dell'ano; una tale appendice non è una coda con vertebre, e non è che un' estremità di pelle che non è più particolarmente attaccata al coccige di quello che lo sia il restante della pelle.

specie, ch' eran tutti meglio educati, più riconoscenti, più obbedienti, e insieme più allegri e baltevolmente docili per imparare a danzare, a gestire in cadenza e a lasciarsi tranquillamente vestire e pettinare.

Questo animale può avere due piedi e mezzo o tre piedi di altezza quando è ritto sulle sue gambe di dietro; la femmina è più piccola del maschio, egli cammina più volentieri a quattro piedi che a due; quando è in riposo, sta quasi sempre seduto e il suo corpo è appoggiato sopra due callosità molto prominenti, che sono situate al basso della regione ove dovrebbero esser le natiche; l'ano è più elevato, onde egli sta seduto più basso che sopra il suo culo; parimente il suo corpo è più curvato che quello d'un uomo seduto. Egli è diverso dal *piteco* o *scimia* propriamente detta, 1. perchè ha il muso grosso e innoltrato come un cane alano, mentre il *piteco* ha la faccia piatta: 2. perchè ha de' lunghi denti canini, mentre il *piteco* non gli ha a proporzione più lunghi che l'uomo: 3. perchè non ha le ugne dei diti così piatte e così ritondate, e finalmente perchè è più grande, più membruto e d'un naturale men docile e men mansueto.

Del resto nella specie del magot vi sono alcune varietà; ne abbiám veduti di diverse grandezze, di peli più o meno scuri, e

più o men folti. Sembrami altresì che i cinque animali, di cui Prospero Alpino ha date le figure e che ha indicati sotto il nome di *cinocefali* (a), sian tutti cinque magotti, i quali non son diversi tra loro che per la grandezza e per alcuni altri caratteri troppo leggieri per doverne fare delle specie distinte e separate. Sembra parimente che la specie ne sia generalmente assai diffusa in tutt'i climi caldi dell'antico continente, e che la si trovi egualmente nella Tartaria, nell'Etiopia, nel Malabar (b), nella Barberia, nella Mauritania e perfino nelle terre del Capo di Buona-speranza (c).

(a) Prosp. Alpin. *Hist. nat. Egypt.* lib. IV. tab. 15., fig. 1., tab. 16., 17., 18. & 19.

(b) La terza specie di scimia nel Malabar è di color cenerino, senza coda, o non avendone che una cortissima; è famigliare e impara facilmente tutto ciò che le s'insegna..... eramene stata data una, mi determinai un giorno di batterla, ma alle sue grida ne accorse una sì gran quantità di selvagge, che temendone un mal esito le rendei la libertà. *Voyage du P. Vincent Marie*, cap. 17., pag. 405. Trad. par M. le Marquis de Montmirail.

(c) Verosimilmente è di questa specie la scimia, di cui parla Roberto Lade ne' termini seguenti.
 „ Ci si fece attraversare una gran montagna
 „ nelle terre del Capo di Buona-speranza, sulla
 „ quale ci divertimmo nel far caccia di grosse
 „ scimie, che vi sono in abbondanza.... Non
 „ posso rappresentare tutte le astuzie di questa

Caratteri distintivi di questa specie.

Il magot non ha coda, benchè abbia una piccola estremità di pelle che ne ha l'apparenza; ha delle borse alle guance, delle grosse callosità prominenti sulle natiche, e dei denti canini molto più lunghi a proporzione di quelli dell' uomo; ha la faccia rilevata al basso in forma di muso, simile a quello del cane alano; ha del pelo morbido sulla faccia, del pelo bruno-verdiccio sul corpo e giallo-biancastro sotto il ventre; cammina su i suoi due piedi di dietro, ma più frequentemente a quattro; ha tre piedi

„ animali, che c' insequivano, nè con quanta
„ leggierezza e sfrontatezza ritornassero contro
„ noi dopo aver presa la fuga; alcune volte ci
„ lasciavano loro accostare sì da vicino e a sì
„ poca distanza, che fermandomi a fronte di
„ loro per prender le mie misure, mi credeva
„ quasi sicuro di farne preda, ma d' un solo
„ salto si slanciavano dicci passi lungi da me,
„ salendo colla stessa velocità sugli alberi; resta-
„ vano quindi lassù tranquille a rimirarci come
„ se prendessero piacere di fare una scena della
„ nostra meraviglia. Ve n' era di sì grosse che
„ se il nostro interprete non ci avesse assicurati
„ ch' esse non erano d' una ferocia pericolosa,
„ il nostro numero non sarebbe sembrato bastevole
„ per difenderci da' loro insulti. Siccome
„ ci sarebbe stato inutile l'ucciderle, così non
„ facemmo verun uso del nostro fucile. Ma il
„ nostro Capitano deliberò di stenderne a terra

o tre piedi e mezzo d'altezza, e sembra che in questa specie sianvi delle razze anche più grandi. Le femmine sono, come le donne, ai periodici mestruai soggette.

„ una molto grossa, che dopo averci lunga-
„ mente stancati ad inseguirla era salita sulla
„ cima d'un albero; egli usò contro essa certe
„ specie di minacce che per avventura si ricor-
„ dava d'aver veduto talvolta praticarsi sopra
„ alcune delle sue simili, il che le cagionò tan-
„ to spavento, che cadde quasi immobile a' no-
„ stri piedi, e nello sfordimento della sua ca-
„ duta noi non durammo veruna fatica a pren-
„ derla; ma dopo ch'ella fu rinvenuta, noi
„ dovemmo usare tutta la nostra destrezza, e
„ tutt'i nostri sforzi per ritenerla, legandole
„ strettamente le zampe: ella si difendeva tut-
„ tavia co' suoi morsi, il che ci obbligò a co-
„ prirle e a fasciar la testa co' nostri fazzolet-
„ ti “. *Voyage traduit de l'Anglois. Tom. I.,*
pag. 80. & 81.



DESCRIZIONE DEL MAGOT.

IL magot [*tav. VII.*, *ov'è veduto di faccia*; e *tav. VIII.*, *ov'è veduto di profilo*] che ha servito di soggetto per questa Descrizione, aveva la testa grossa, il naso molto piatto, e il muso sporgente. I denti canini eran molto lunghi e gli occhi piccoli; non eravi tra gli occhi che pochissimo intervallo. Le orecchie eran corte e nude, e avevano molta relazione a quelle dell' uomo. La fisionomia del magot era trista; egli non l'animava giammai che mostrando i denti e agitando rapidamente la mascella inferiore, a segno di battere a colpi replicati i denti del di sotto con quelli del di sopra (*). Il collo era corto. L' ano [*A, tav. IX.*] sembrava esser collocato più alto che negli altri animali; ma le parti del corpo di questo animale, che si potrebbero paragonare alle natiche dell' uomo, perchè tutto il corpo restava al di sopra quando l' animale era nella situazione d' un uom seduto, si trovavano al dinanzi dell' ano, invece d' essere da ciascun lato come nell' uomo. Queste parti erano spogliate di peli, callose e molto dure, e formavano due callosità [BC] che avevan ciascuna

(*) Questo movimento è comune a varie specie di scimmie.

Descrizione del Magot. 137

scena due pollici di lunghezza e quindici linee di larghezza.

Vi ha nella bocca del magot, da ciascun lato della mascella inferiore, l'ingresso d'una borsa, che s'estende lungo il collo; siffatte borse si son chiamate in francese *abajours*: l'animale vi depone degli alimenti, e ve li conserva per masticarli e per inghiottirli in altro tempo. Ho mantenuto un magot per lo spazio di più d'un anno; egli amava molto il vino; l'ho veduto mangiare e bere di tutto ciò, che veniva recato in tavola, eccettuata la mostarda e i formaggi fermentati, ch'egli ha sempre rifiutati con qualunque preparativo gliel'abbia presentati. Non ho trovate le dette borse in nessuno dei *sapajous*, nè dei *sagoini*, ch'io ho anatomizzati. [*Vedi in seguito una Descrizione delle mentovate borse in quella della mona. E hamster ha pure delle borse. Vedi il Tomo XXVL di questa Storia Naturale, tav. XV., fig. 2.*].

Il magot, che m'ha servito di soggetto per questa Descrizione, non aveva ciglia alle due palpebre, ch'erano interamente nude, e di colore scarnatino assai chiaro. Il contorno e'l tramezzo degli occhi, il naso, la mascella superiore, e le labbra non avevano che pochissimo pelo, ed erano di colore scarnatino assai lionato. Le guance, la fronte, i lati della testa, il collo, eccettuata la strozza, il dorso, i lati del corpo, i reni, le spalle, le anche e la faccia esteriore delle gambe anteriori e posteriori, erano fornite d'un pelo molto

Tom. XXVIII.

H

fitto, che aveva fino a due pollici di lunghezza: questo pelo era di color grigio, era nericcio dalla radice fino alla metà incirca della sua lunghezza; in seguito era d'un grigio più chiaro, e più lungo anche di color fulvo, verdiccio: finalmente l'estremità era nera; all'esterno non vedevasi che il color fulvo verdiccio e l'nero. La mascella inferiore, la strozza, il ventre, le ascelle, le anguinaglie, la faccia anteriore delle gambe anteriori e posteriori erano fornite d'un pelo lungo circa un pollice e mezzo, e di color giallo pallidissimo. La pelle era biancastra. I diti avevan del pelo, ma la pianta [E E F F] de' piedi era nuda: l'estremità dei diti era grossa e rotonda; le ungue avevano un color nero o nericcio; quelle dei pollici eran piatte pressò a poco come nell'uomo, ma le ungue dei diti eran curve e disposte in doccia sulla loro lunghezza.

M I S U R E del Magot.	Magot maschio.	Magot femmina.
	pied. poll. lin.	pied. poll. lin.
Lunghezza del corpo intero, misurato in linea retta dall'estremità del muso fino all'ano —	2. 0. 0.	1. 8. 0.
Lunghezza della testa dall'estremità del muso fino all'occipite —	0. 5. 7.	0. 4. 6.
Circonferenza dell'estre-		

MISURE del Magot .	Magot maschio .	Magot femmina .
mità del muso ———	pied. poll. lin. o. 6. 6.	pied. poll. lin. o. 4. 6.
Circonferenza del muso , presa sotto gli occhi —	o. 8. 8.	o. 7. o.
Contorno dell' apertura della bocca ———	o. 4. 5.	o. 3. o.
Distanza tra i due nafali	o. o. 2 $\frac{1}{2}$	o. o. 2.
Distanza tra l' estremità del muso e l'angolo an- teriore dell' occhio —	o. 2. 3.	o. 1. 6.
Distanza tra l'angolo po- steriore e l' orecchia —	o. 2. 6.	o. 2. o.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro —	o. o. 7.	o. o. 6.
Apertura dell' occhio —	o. o. 3 $\frac{1}{2}$	o. o. 3.
Distanza tra gli angoli an- teriori degli occhi —	o. 1. 2.	o. o. 7.
Circonferenza della testa presa tra gli occhi e le orecchie ———	1. 1. 6.	o. 10. 6.
Lunghezza delle orecchie	o. o. 8.	o. 1. o.
Larghezza della base , mi- surata sulla curvatura esteriore ———	o. 2. o.	o. 2. 6.
Distanza tra le due orec- chie, presa al basso —	o. 3. 8.	o. 2. 8.
Lunghezza del collo —	o. 2. 5.	o. 2. 2.

M I S U R E del Magot.	Magot maschio.	Magot femmina.
Circonferenza del collo —	pie <i>d</i> . pol <i>l</i> . lin. o. 9. o.	pie <i>d</i> . pol <i>l</i> . lin. o. 6. 10.
Circonferenza del corpo, presa dietro le gambe anteriori —————	1. 3. 4.	1. 1. o.
La stessa circonferenza al fito più grosso —————	1. 4. o.	1. 1. 6.
La stessa circonferenza di- nanzi le gambe poste- riori —————	o. 11. 6.	o. 10. 6.
Lunghezza dell' avan-brac- cio dal gomito fino alla giuntura della mano —	o. 7. o.	o. 6. 4.
Circonferenza della giun- tura —————	o. 3. 8.	o. 3. o.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle ugne —————	o. 4. 6.	o. 4. o.
Lunghezza della gamba dal ginocchio fino al tallone —————	o. 8. 4.	o. 7. 3.
Lunghezza dal tallone fino all' estremità delle ugne	o. 6. 6.	o. 5. 4.
Lunghezza delle ugne più grandi —————	o. o. 7.	o. o. 4.

Il maschio pesava ventitre libbre . L'epiploon

s' estendeva fino al catino, e in alcuni siti era carico d'una grascia gialliccia.

Il duodeno, all'uscir dallo stomaco, si ripiegava all'indentro, e si univa al digiuno nella regione ombelicale. Il digiuno faceva i suoi giri nella stessa regione e nell'ipococondro sinistro. I giri dell'ileo erano nel lato sinistro e nella regione ombelicale, ove metteva capo al cieco, ch'era obliquamente diretto dall'innanzi all'indietro e dall'alto al basso nel lato destro. Il colon s'estendeva all'indietro nella regione iliaca destra; faceva i suoi giri nella detta regione, nell'ipogastrica e nell'iliaca sinistra, prima di unirsi al retto, che, invece di seguire le vertebre lombari, formava nel catino un arco, l'uno de' rami del quale metteva capo all'ano.

Lo stomaco s'estendeva più a destra che a sinistra: rassomigliava molto per la sua figura a quella dell'uomo, ma era più gonfiato sulla piccola curvatura allato dell'esofago e sulle due facce.

Gl'intestini tenui avevan tutti preso a poco la stessa grossezza: le loro membrane erano rosicce e assai sottili. Il cieco [A B, *tav. X, fig. 1.*] era corto e grosso. Il colon [C, D, E] era egualmente grosso che il cieco vicino a quest'intestino; in seguito si diminuiva preso a poco di grossezza sulla lunghezza d'otto pollici: il resto era preso a poco della stessa grossezza che il retto. Sul cieco, sul colon e sul retto eranvi tre fasce tendinose, l'una delle quali era poco apparente sul cieco, e non ve n'era che una sola, che s'estendeva fino all'

estremità del retto. Il cieco, e massimamente il colon, formavano varie piccole borse.

Il fegato era composto di tre gran lobi; ve n'era uno da ciascun lato, e l' terzo si trovava nel mezzo, separato per mezzo della scissura [A, *tav. X., fig. 2.*] del legamento sospensorio in due parti, la destra delle quali portava la vescichetta del fiele [B]; la parte sinistra aveva parimente una piccola scissura alla sua estremità inferiore. Alla radice del lobo destro sulla sua faccia posteriore eravi un piccol lobo [C] allungato e puntuto, e vicino all' origine del detto piccol lobo una prominenza [D]. Il colore di questa viscera era esteriormente e interiormente d'un rosso-bruno. Il suo peso era di sett' once e tre dramme. Il liquor del fiele era d'un color rancio-rossiccio, e del peso di ventiquattro grani.

La milza [*tav. X., fig. 3.*] era situata al lato sinistro dello stomaco, e s' estendeva obliquamente dall' innanzi all' indietro e dall' alto al basso. La sua parte superiore era molto più larga che l' inferiore; quest' ultima formava un globetto separato dal resto per mezzo d'una scissura. La milza aveva esteriormente e interiormente un color nericcio, e pesava tre dramme.

Il pancreas era di figura molto irregolare, e s' estendeva dalla curvatura, che formava il duodeno all' uscir dallo stomaco, fino alla milza e al rene sinistro.

I reni erano allungati, e la loro cavità aveva

poca profondità. Il rene destro era più inoltrato che 'l sinistro della metà in circa della sua lunghezza. I capezzoli eran molto grossi e insieme uniti gli uni agli altri. La piccola pelvi aveva poca estensione.

Il polmon destro era diviso in quattro lobi formati e situati come nella maggior parte dei quadrupedi. A sinistra non eranvi che due lobi, il primo de' quali era diviso in due parti per via d'una profonda scissura. Il cuore era poco puntuto. Dall'arco dell'aorta uscivano due rami.

Le papille della lingua erano cortissime, e all'estremità eravi una quantità di grani biancastri e rotondi. Questi grani erano più distanti gli uni dagli altri sul restante della lingua. Sull'estremità posteriore vedevansi tre glandule a calice d'una linea di diametro; esse eran situate in guisa che formavano un triangolo, la cui base era all'innanzi. L'epiglottide non aveva verun prolungamento in punta.

Il cervello pesava tre once, e 'l cervelletto tre dramme e mezzo: esso era interamente coperto dalla parte posteriore del cervello.

La ghianda [A, *tav. XI.*] era piatta su i lati, e terminava con un orlo [B] simile in qualche guisa alla testa d'un fungo. Il piccinolo [A] ch'era attaccato al detto orlo, formava il corpo della ghianda, ed era più sottile vicino al cappello del fungo che vicino alla verga. I testicoli [CC] erano grossissimi e quasi rotondi. L'epididimo [DD]

aveva pure un grandissimo volume . La sostanza interiore dei testicoli era di color grigiastro , ed eravi al mezzo un asse biancastro . I canali deferenti [EE] erano presso a poco dello stesso diametro in tutta la loro estensione ; la vescica [F] aveva poco volume , ed era quasi rotonda ; le vescichette feminali [GG] avevano una forma allungata ; e le prostrati [H] eran molto grosse .

Al disopra dell' ano eravi una specie di piccola coda in forma d'escrescenza , ch' era senza pelo , e che aveva cinque linee di lunghezza , due linee di larghezza , ed una linea di grossezza : questa coda si trovava all' estremità del coccide , ma non vi era attaccata nulla più che il resto della pelle .

La femmina del magot , le cui misure sono riferite nella tavola precedente , mi parve aver più del giallo e meno del verde che il maschio , sulla testa , sul collo , sulle spalle , sul petto , e sulla faccia esteriore delle gambe anteriori . Il suo peso era di dodici libbre e tre quarti .

L'ano era situato al disotto del dorso come quello del maschio : la vulva si trovava tra le due callosità delle ossa ischie , su cui l'animale si sede .

Questa femmina aveva due capezzoli sul petto , uno da ciascun lato : essi avevan tre linee di diametro , e si trovavano situati a un pollice e quattro linee di distanza l'un dall' altro .

In questa femmina il duodeno era egualmente corto che nel maschio , e aveva appena tre o quattro pollici di lunghezza ; esso formava un arco all'

uscir dallo stomaco, e metteva capo nella regione ombelicale. Il retto era cortissimo.

Gl' intestini tenui avevano sei piedi e mezzo di lunghezza dal piloro fino al cieco: quella del colon e del retto presi insieme era di tre piedi. L'estremità superiore della milza era puntuta.

La ghianda della clitoride [A, *tav. XII.*, che rappresenta la vagina aperta] era poco apparente, ed era situata sull' orlo della vulva; essa non formava che un tubercolo poco elevato, ma il corpo della clitoride era grosso. L' orifizio [B] dell' uretra si trovava a tre linee di distanza dall' clitoride [quest' orifizio è contrassegnato, *tav. XII.*, da uno stiletto CD]. La vagina [F] aveva poca lunghezza. L' orifizio [G] della matrice aveva tre linee di lunghezza. La matrice [H] aveva una forma triangolare; il suo collo [I] era molto grosso, e non v' erano corni: le trombe [KK] uscivano da ciascun lato del fondo della matrice, e mettevano capo ad un padiglione, che involgeva la maggior parte dei testicoli [LL], ch' erano di color biancastro, e d'irregolarissima figura, poichè la loro superficie superiore era piatta, e l' inferiore convessa. Nella *tav. XII.* vedesi la vescica [M] ed una porzione [NO] del retto.

pie. poll. lin.

Lunghezza degl' intestini tenui dal pi-

loro fino al cieco ————— 8. 0. 0.

Circonferenza del duodeno ————— 0. 2. 6.

Circonferenza del digiuno ————— 0. 2. 9.

Circonferenza dell' ileo nei siti più grossi —————	o.	2.	9.
Circonferenza nei siti più sottili —	o.	1.	3.
Lunghezza del cieco —————	o.	2.	o.
Circonferenza del cieco nei siti più grossi —————	o.	7.	o.
Circonferenza al sito più sottile —	o.	1.	6.
Circonferenza del colon nei siti più grossi —————	o.	7.	o.
Circonferenza nei siti più sottili —	o.	1.	9.
Circonferenza del retto vicino al colon	o.	2.	9.
Circonferenza vicino all' ano ———	o.	1.	3.
Lunghezza del colon e del retto presi insieme —————	o.	2.	6.
Lunghezza del canale intestinale in intero, non compreso il cieco ———	10.	6.	o.
Gran circonferenza dello stomaco —	1.	9.	o.
Piccola circonferenza —————	1.	3.	o.
Lunghezza della piccola curvatura, dall' angolo che forma la parte destra fino all' esofago —————	o.	3.	6.
Profondità del fondo dello stomaco —	o.	2.	6.
Circonferenza dell' esofago —————	o.	2.	o.
Circonferenza del piloro —————	o.	2.	6.
Lunghezza del fegato —————	o.	4.	6.
Larghezza —————	o.	6.	o.
La sua maggior grossezza —————	o.	o.	11.
Lunghezza della vescichetta del fiele	o.	1.	4.
Il suo maggior diametro —————	o.	o.	8.

pied. poll. lin.

Lunghezza della milza —————	o.	2.	3.
Larghezza dell' estremità inferiore —	o.	1.	o.
Larghezza dell' estremità superiore —	o.	o.	6.
Groffezza nel mezzo —————	o.	o.	6.
Groffezza del pancreas —————	o.	o.	3.
Lunghezza dei reni —————	o.	2.	1.
Larghezza —————	o.	1.	1.
Groffezza —————	o.	o.	8.
Lunghezza del centro nervoso , dalla vena-cava fino alla punta ———	o.	1.	6.
Larghezza —————	o.	2.	3.
Circonferenza della base del cuore —	o.	4.	6.
Altezza dalla punta fino all' origine dell' arteria polmonare ———	o.	1.	10.
Altezza dalla punta fino al sacco pol- monare —————	o.	1.	6.
Diametro dell' aorta preso exterior- mente —————	o.	o.	4.
Lunghezza della lingua —————	o.	3.	3.
Lunghezza della parte anteriore , dal freno fino all' estremità ———	o.	1.	o.
Lunghezza del cervello —————	o.	3.	o.
Larghezza —————	o.	2.	4.
Groffezza —————	o.	1.	2.
Lunghezza del cervelletto —————	o.	1.	1.
Larghezza —————	o.	1.	6.
Groffezza —————	o.	o.	8.
Distanza tra l' ano e lo scroto ———	o.	3.	3.
Distanza tra lo scroto e l' orifizio del			

	pied. poll. lin.		
prepuzio —————	o.	o.	8.
Lunghezza della ghianda —————	o.	1.	1.
Circonferenza —————	o.	1.	o.
Circonferenza del fungo —————	o.	1.	3.
Lunghezza della verga , dalla bifor-			
cazione dei corpi cavernosi fino all'			
inferzione del prepuzio —————	o.	2.	10.
Circonferenza —————	o.	1.	o.
Lunghezza dei testicoli —————	o.	2.	o.
Larghezza —————	o.	1.	8.
Groffezza —————	o.	1.	5.
Larghezza dell' epididimo —————	o.	o.	5.
Groffezza —————	o.	o.	5.
Lunghezza dei canali deferenti — —	o.	8.	o.
Diametro nella maggior parte della			
loro estensione —————	o.	o.	1.
Gran circonferenza della vescica —	o.	7.	6.
Piccola circonferenza —————	o.	6.	6.
Circonferenza dell' uretra —————	o.	1.	3.
Lunghezza delle vescichette feminali	o.	2.	6.
Larghezza —————	o.	o.	6.
Groffezza —————	o.	o.	4.
Lunghezza delle prostrati —————	o.	1.	o.
Larghezza —————	o.	o.	6.
Groffezza —————	o.	o.	4.
Distanza tra l' ano e la vulva ———	o.	o.	4.
Lunghezza della vulva —————	o.	o.	4.
Lunghezza della vagina —————	o.	1.	9.
Circonferenza —————	o.	2.	3.

pied. poll. lin.

Gran circonferenza della vescica —	o.	6.	o.
Piccola circonferenza —————	o.	5.	6.
Lunghezza dell' uretra —————	o.	o.	5.
Circonferenza —————	o.	o.	9.
Lunghezza del collo e del corpo della matrice —————	o.	1.	3.
Distanza in linea retta tra i testicoli e la matrice —————	o.	o.	4.
Lunghezza della linea curva, che traversa la tromba —————	o.	o.	9.
Lunghezza dei testicoli —————	o.	o.	5.
Larghezza —————	o.	o.	4.
Grossezza —————	o.	o.	2.

La testa dello scheletro del magot è diversa da quella dell' uomo, del jocko e del gibbono, principalmente pel muso ch'è più lungo, per la situazione dell' apertura delle nari, ch'è posta più basso al disotto delle orbite degli occhi, per l'estensione delle dette orbite che son più piccole, e per una resta trasversale ch'è sul occipite: questa resta si trova nella maggior parte dei quadrupedi, e serve d'attaccatura ai muscoli, che sostengono la testa: quanto essa è più grossa e più sporgente, tanto più dinota di sforzo che fanno questi muscoli per sostenere la testa dei quadrupedi e per rialzarla, perch'essa non è in equilibrio sul collo come quella dell' uomo. La fronte del magot non si solleva al disopra delle orbite: il loro orlo superiore forma un cordone molto sporgente all' in-

nanzi, il qual cordone s' estende da un' orbita all' altra al disopra del naso, ov' ha una faccia quasi perpendicolare a quella degli ossi propri del naso; questo stesso cordone si prolunga sul lato esteriore delle orbite, perchè l'apofisi orbitaria dell' osse frontale e quella dell' osse della guancia son grossissime. L' arco zigomatico è parimente più convesso che nell' uomo, nel jocko e nel gibbono, ed ha maggior relazione a quella della maggior parte dei quadrupedi. Le orbite degli occhi hanno molto maggior larghezza che altezza. L' apertura delle nari s' estende quasi fino all' orlo alveolare. La mascella inferiore è diversa da quella dell' uomo, del jocko e del gibbono, perchè i suoi rami sono men curvi e più simili a quelli della mascella della maggior parte dei quadrupedi.

I denti del magot rassomigliano a quelli dell' uomo pel numero; ma vi son delle differenze grandi per la forma, principalmente nei canini, che rassomigliano a quelli del gibbono, ma son molto più grandi. Il primo mascellare del disotto è a proporzione più grosso che nell' uomo, e presenta una lunga faccia anteriore formata dal frangimento del dente canino del disopra. L' ultimo mascellare, da ciascun lato delle due mascelle è il più grosso, come nella maggior parte degli animali, e al contrario di ciò ch' è nell' uomo; esso ha su ciascuna faccia due scanalature longitudinali. Tra gl' incisivi e i canini del disopra, e tra i canini e i mascellari del disotto vi ha uno spa-

zio voto, nel quale il dente canino della mascella opposta entra quando la bocca si ferra.

Nessuna delle vertebre cervicali ha l'apofisi spinosa forcuta. Il ramo inferiore dell'apofisi trasversa della sesta vertebra è largo e piatto come nella maggior parte dei quadrupedi.

Vi son dodici vertebre dorsali e dodici coste da ciascun lato, otto vere e quattro false. Lo sterno è composto di sett'ossi. Le prime coste, una da ciascun lato, s'articolano colla parte anteriore del prim'osso dello sterno: l'articolazione delle seconde coste è tra'l primo e'l second'osso dello sterno; quella delle terze coste tra'l secondo e'l terz'osso, e così di seguito fino alle settime e ottave coste, che s'articolano tra'l sesto e'l settimo osso dello sterno.

Le vertebre lombari sono al numero di sette.

L'osso sacro è composto di tre false vertebre: nel coccide non vi sono che due pezzi. L'osso sacro e'l coccide son quasi in linea retta colla colonna vertebrale.

L'osso dell'anca è concavo sulla sua faccia esterna, e ha due facce longitudinali, l'anteriore delle quali è la più stretta. Gli ossi pubi hanno molta larghezza al sito del loro angolo e del loro ramo; essi sono più sporgenti verso l'addomine che nel gibbone e nel jocko: la doccia, ch'essi formano, è convessa al di fuori nella sua lunghezza. La tuberosità di ciascuno degli ossi ischj è grandissima, e ha una faccetta molto estesa, su

cui era la callosità della pelle.

L'omoplata è più largo di quello del gibbono e del jocko, e per conseguenza più simile a quello dell' uomo, ma è più lungo.

Le clavicole rassomigliano a quelle dell' uomo, del jocko e del gibbono.

L'osso del braccio è men lungo dell' osso dell' ulna, al contrario di quello ch' è nell' uomo; così gli ossi dell' avan-braccio del magot son molto più lunghi di quelli dell' uomo; il braccio però del magot essendo applicato lungo il corpo non s' estende che fino al mezzo dell' osso della coscia, presso a poco come quello dell' uomo, perchè la gran lunghezza dell' avan-braccio è compensata dall' estensione dei lombi, che nel magot son molto più lunghi, essendo composti di sette vertebre, mentre nell' uomo non ve ne sono che cinque. L'osso del braccio del magot è convesso all' innanzi sulla lunghezza della sua parte media superiore. Al lungo di questa parte vi son tre coste longitudinali, l' una sul lato esterno, e le altre due sugli orli della doccia. Gli ossi dell' avan-braccio son più allontanati l' un dall' altro che nell' uomo.

Gli ossi della coscia e della gamba son diversi da quelli dell' uomo, perchè sono a proporzione molto più corti.

Nel carpo vi sono undici ossi, i quali rassomigliano a quelli del gibbono per la situazione, ma quanto alla figura ne son diversi per molti riguardi.

Il tarso non è composto che di sett' ossi , che son poco diversi da quelli del tarso dell' uomo .

Le differenze maggiori ch' io abbia notate negli ossi del metacarpo e del metatarso , e nelle falangi dei diti del magot paragonati cogli ossi , che ad essi corrispondono nell' uomo , consistono nell' essere il prim' osso del metacarpo e le falangi del pollice men grosse e più corte che nell' uomo , e nell' essere gli ossi del metatarso e dei cinque diti dei piedi posteriori del magot , disposti e proporzionati , come se facessero parte d' una mano e non d' un piede , come ho già osservato sul gibbono .

pied. poll. lin.

Lunghezza della testa dall' estremità delle mascelle fino all' occipite — o. 4. 11.

La maggior larghezza della testa — o. 3. 8.

Lunghezza della mascella inferiore dalla sua estremità anteriore fino all' orlo posteriore dell' apofisi condiloidea — o. 4. 1.

Groffezza della parte anteriore dell' osso della mascella superiore — o. o. 9.

Larghezza della mascella superiore al sito dei denti canini — o. 1. 4.

Distanza tra le orbite , e l' apertura delle nari — o. o. $7\frac{1}{2}$

Lunghezza della detta apertura — o. 1. 1.

Larghezza — o. o. 7.

Lunghezza degli ossi proprj del naso o. o. 9.

	pied. poll. lin.		
Larghezza al sito più largo	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Larghezza delle orbite	o.	1.	1.
Altezza	o.	o.	8 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dei denti canini	o.	1.	o.
Larghezza del foro della prima vertebra dall' alto al basso	o.	o.	6 $\frac{1}{2}$
Larghezza da un lato all' altro	o.	o.	7.
Altezza dell' apofisi spinosa della seconda vertebra	o.	o.	4.
Larghezza	o.	o.	3.
Lunghezza dell' ottava costa, ch' è la più lunga	o.	5.	2.
Lunghezza dello sterno	o.	4.	4.
Lunghezza del corpo della sesta vertebra lombare, ch' è la più lunga	o.	o.	9 $\frac{1}{2}$
Larghezza della parte superiore dell' osso dell' anca	o.	o.	11.
Lunghezza dell' osso dal mezzo della cavità cotiloidea fino al mezzo del lato superiore	o.	4.	o.
Lunghezza dei fori ovali	o.	1.	2 $\frac{1}{2}$
Larghezza	o.	o.	9 $\frac{1}{2}$
Larghezza del catino	o.	2.	o.
Altezza	o.	2.	9 $\frac{1}{2}$
Lunghezza dell' omoplata	o.	3.	9.
Larghezza nel mezzo	o.	2.	o.
Lunghezza dell' umero	o.	5.	10.
Lunghezza dell' osso dell' ulna	o.	6.	3.
Lunghezza dell' osso del radio	o.	5.	2.

pied. poll. lin.

Lunghezza del femore —————	o.	6.	7.
Lunghezza della tibia —————	o.	6.	$4\frac{1}{2}$
Lunghezza del peroneo —————	o.	5.	9.
Altezza del carpo —————	o.	o.	9.
Lunghezza del calcagno —————	o.	1.	5.
Altezza del prim' osso cuneiforme, e dello scafoide presi insieme ———	o.	o.	9.
Lunghezza del prim' osso del meta- carpo, ch'è il più corto —————	o.	1.	o.
Lunghezza del terz' osso del metacar- po, ch'è il più lungo —————	o.	1.	6.
Lunghezza del prim' osso del meta- tarso, ch'è il più corto —————	o.	1.	2.
Lunghezza del terzo, ch'è il più lungo —————	o.	2.	o.
Lunghezza della prima falange del pollice dei piedi anteriori ———	o.	o.	$6\frac{1}{2}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	$3\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del terzo dito —————	o.	1.	$o\frac{1}{2}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	$8\frac{1}{3}$
Lunghezza della terza —————	o.	o.	5.
Lunghezza della prima falange del pollice dei piedi di dietro ———	o.	o.	$8\frac{1}{2}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	4.
Lunghezza della prima falange del terzo dito —————	o.	1.	2.
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	9.
Lunghezza della terza —————	o.	o.	5.

DESCRIZIONE
DELLA PARTE DEL GABINETTO
Spettante alla Storia Naturale
DELLE SCIMIE.

Num. MCCXCI.

La pelle d' un jocko .

Questa pelle è imbottita ; vi si son lasciati gli ossi delle ultime falangi dei diti per meglio conservare la loro forma , che suol variare in differenti specie d' animali di questo genere per le proporzioni dei pollici relativamente a quelle degli altri diti . La pelle imbottita , di cui si parla , rappresenta il jocko seduto .

Num. MCCXCII.

Lo scheletro d' un jocko .

Questo scheletro non è compiuto ; vi mancano gli ossi dell' avan-braccio , delle gambe e dei piedi del jocko ; vi si sono sostituiti degli ossi d' uno scheletro umano , presso a poco della medesima altezza di quello del jocko riferito sotto il presente numero . La descrizione di questo scheletro e quella della pelle , di cui si è fatta menzione sotto il numero precedente , sono nella descrizione del jocko .

Num. MCCXIII.

La pelle d' un gibbono .

Questa è la pelle d' un piccol gibbono , ed è imbottita . Vi si vede il color grigio del ventre e del dorso , che distingue il piccol gibbono dal grande .

Descrizione del Gabinetto. 157

Num. MCCXCIV.

Lo scheletro d' un gibbone .

Questo scheletro è rimarchevole tra tutti quelli , che sono nel Gabinetto , per l' eccessiva lunghezza delle sue gambe anteriori . La sua descrizione e le sue principali misure si trovano nella descrizione del gibbone .

Num. MCCXCV.

L' osso ioide d' un gibbone .

Quest' osso non è composto che di tre pezzi , e non ha piccoli corni come quello dell' uomo : vi son pure alcune differenze nella forma e nelle proporzioni dei tre pezzi dell' osso ioide del gibbone , paragonati con quelli che loro corrispondono nell' uomo .

Num. MCCXCVI.

Un magot .

Quest' animale si trova nello spirito di vino , e rassomiglia al maschio . che ha servito di soggetto per la descrizione del magot .

Num. MCCXCVII.

Una pelle di magot .

Questa pelle è imbottita , e non è diversa da quella che ha servito di soggetto per la descrizione del magot .



158 *Descrizione del Gabinetto.*

Num. MCCXCVIII.

Lo scheletro d' un magot .

Questo è lo scheletro , che ha servito di soggetto per la descrizione e per le misure degli ossi del magot . Vi mancano varj denti .

Num. MCCXCIX.

Lo scheletro d' una femmina di magot .

Questo scheletro è di statura più piccola di quella del maschio : sull' occipite non vi son reste ossee : gli orli delle orbite degli occhi vi son meno gonfiati e meno sporgenti : del resto non ho scoperto nessun carattere , che possa dinotare la differenza del sesso , come negli scheletri umani .

Num. MCCC.

L' osso ioide d' un magot .

IN quest' osso vi son cinque pezzi , una base , due gran corni , e all' estremità di ciascun d' essi un pezzo largo e piatto . La base è di figura differentissima dalla base dell' osso ioide dell' uomo ; essa si prolunga al basso , e forma una doccia verticale .

Num. MCCC.I.

L' osso della verga d' un magot giovane .

Quest' osso ha quattro linee di lunghezza ; è curvo e più sottile all' una delle sue estremità che all' altra .



IL PAPIONE (a)

● BABBUINO PROPRIAMENTE DETTO .

Nell' uomo la fisonomia inganna , e la figura del corpo non decide della forma dell' anima . Ma negli animali si può

(a) *Papione* , parola derivata da *Papio* , nome di quest' animale in Latino moderno , e che noi abbiamo adottato per distinguerlo dagli altri babbuini . *Baboon* , in Inglese ; *Pavyon* , in Tedesco ; *Choac-kama* , al Capo di Buona-Speranza , secondo Kolbe .

Papio . Gefner , *Icon. Quad.* pag. 76. , *fig. ibid.*
NOTA . 1. Questa figura data da Gefner è stata copiata da Aldrovando . *Quad. digit.* pag. 260. , e da Jonston . *Quad. tab.* 61. , sub nomine *papio primus* . *NOTA* . 2. Gefner s' è molto ingannato prendendo quest' animale per l' Iena .

Babouin . Kolbe ; *Descrizione del Capo di Buona-Speranza* . *Tom. III.* , pag. 65. , *fig. 2.* Questa figura data da Kolbe è anche peggiore di quella di Gefner , e nondimeno questi sono i due soli Autori , che abbiano data la figura di quest' animale .

Papio . Le *Babouin* . Brisson , *regn. anim.* , pag. 192.

Sphinx . *Simia semicaudata* , ore vibrissato , unguibus acuminatis . Linn. *Syst. nat.* edit. X. , pag. 25.

NOTA . Il Sig. Linneo s' è ingannato dando de' mustacchi come carattere distintivo di quest' animale . Probabilmente dalla figura di Gefner egli ha preso quest' indizio , la qual figura è appunto in ciò difettosa , poichè realmente il babbuino non ha mustacchi . Vedi la figura che noi abbiamo fatta disegnare sull' animal vivo .

giudicare del naturale dall'aspetto, e di tutto l'interno da tutto ciò che appare al di fuori. Per esempio, gettando gli occhi sulle nostre scimie e su i nostri babbuini, egli è facile a comprendere che quest'ultimi debbon esser più selvaggi e più maligni delle altre: vi sono le stesse differenze e gli stessi digradamenti nei costumi che nelle figure. L'orang-outang, che rassomiglia più all'uomo, è il più intelligente, il più grave, il più docile di tutti: il magot, che comincia a scostarsi dalla forma umana, e che pel muso e pe' denti s'accosta a quella degli animali, è aspro, disobbediente, e spiacevole: i babbuini poi, che più non rassomigliano all'uomo che per le mani, e che hanno una coda, ugne aguzze, muso grosso ec., hanno l'aria di bestie feroci e in fatti lo sono. Io ho veduto vivo quello, di cui qui diamo la figura; egli non era orrido, ma nondimeno faceva orrore digrignando continuamente i denti, agitandosi e dimenandosi con collera: era d'uopo tenerlo rinchiuso in una gabbia di ferro, di cui scuoteva sì fortemente colle mani i cancelli che metteva paura agli spettatori. Egli è un animal membruto, il cui corpo raccolto e le membra nervose dinotano la forza e l'agilità; che coperto d'un pel folto e lungo sembra anche molto più grosso di quello che non è, ma che realmente è sì vigoroso e sì forte che facil-

facilmente la vincerebbe a fronte d'uno o di più uomini, s'eglino non fossero armati (a): oltre ciò egli sembra continuamente eccitato da quella passione, che rende furiosi gli animali più mansueti; egli è insolentemente lascivo, ed ama di mostrarsi in tale stato, di toccarsi e di prendersi diletto solo alla vista delle persone: siffatta azione, ch'è una delle più vergognose dell'umanità, e che nessun altro animale si fa lecito di fare, eseguita dalla mano del babbuino, eccita l'idea del vizio e rende abbominevole l'aspetto di questa bestia, che la Natura sembra aver particolarmente destinata a cotanta sfacciataggine; imperciocchè in tutti gli altri animali ed anche nell'uomo ell'ha coperte siffatte parti; nel babbuino all'opposto esse sono affatto nude e tanto più evidenti perchè il corpo è coperto di lunghi peli: egli ha parimente le natiche nude, e

Tom. XXVIII.

I

(a) Questa è la specie, a cui debbesi riferire l'animale chiamato nel Madagascar *trè trè trè trè*. Egli è, dice Flaccourt, grosso come un vitello di due anni, ha la testa rotonda e una faccia d'uomo, i piedi anteriori e i posteriori come una scimia, il pelo increspato, la coda corta, le orecchie come quelle dell'uomo. Rassomiglia al *tamach* descritto da Ambrogio Paré. E' un animal solitario, e gli abitanti del paese ne hanno un gran timore. *Voyage à Madagascar*, pag. 151.

d'un rosso color di sangue, le borse pendenti, l'ano scoperto e la coda sempre alzata: sembra ch'ei voglia far comparir di tutte queste nudità, presentando il deretano più sovente che la testa, massimamente quando scorge delle donne, per le quali egli mette in uso una tale sfrontatezza che non può nascere che dal desiderio più smoderato (a). Il magot e alcuni altri siffatti animali hanno pure le medesime inclinazioni, ma perch' essi son più piccoli e meno petulanti, si rendono modesti a colpi di staffile, mentre il babbuino non solamente è in ciò incorreggibile, ma intrattabile per ogni riguardo.

Per quanto sia violenta la passione di questi animali, ne' paesi temperati essi non pro-

(a) *Papio, animal ad libidinem prouum, cum mulieres videt alacritatem suam ostendit. . . . Papio quem vidi vivum, ad nutum haud secus, atque caput reliqua animalia, anum vertebat frequentius populo ostentans.* Gelsner, *Icon. Quad.* pag. 77. Nelle Filippine vi son de' babbuini sommamente lascivi, che non permettono alle donne d'allontanarsi dalle loro case. *Voyage de Gemelli Careri. Tom. V., pag. 409.* — I babbuini non han peli sulle natiche; esse sono sì piene di cicatrici e di graffiature che sembra non esservi neppur la pelle. Questi animali sono d'una lascivia inesplabile. *Description du Cap de Bonne-Espérance, par Kolbe. Tom. III., pag. 59.* *Papio, animal libidinosum, feminis facile vim infert.* Linn. *syst. nat. edit. X., pag. 25.*

ducono. La femmina non partorisce ordinariamente che un figlio, ch'essa porta fra le sue braccia e attaccato, per così dire, alla sua poppa; è soggetta, come le donne, ai mestrui periodici, il che è comune a tutte le altre femmine di scimie che hanno le natiche nude. Del resto questi babbuini, benchè cattivi e feroci, nondimeno non sono nel numero degli animali carnivori, e si nutrono principalmente di frutti, di radici, e di grani; s'uniscono insieme (a) e van d'ac-

I 2

(a) I babbuini amano appassionatamente le radici, le mele, e in generale i frutti che crescono ne' giardini.... I lor denti e i loro artigli li rendono terribili ai cani, che non li vincono che con istento, ammeno che qualche grosso pezzo di radice non li renda istupiditi.... Ho veduto ch'essi non mangiano nè pesce nè carne fuorch'essa non sia prima cotta e aggiustata alla maniera con cui gli uomini la mangiano, e ch'essi tranguggiano molto avidamente la carne e i pesci ben cucinati.... Ecco la maniera con cui essi saccheggiano un orto, un giardino, o una vigna; ordinariamente fanno queste spedizioni in truppa; una parte entra nel recinto, mentre un'altra parte resta sul muro o sulla siepe a far la sentinella per avvertir le altre quando veggono qualche pericolo; il resto della truppa è collocato fuori del giardino a una mediocre distanza gli uni dagli altri, e formano così una linea, che dal luogo del saccheggio arriva fino a quello del lor ricovero. Essendo il tutto così disposto, i babbuini cominciano a dare il guastato, e gettano a quelli, che stanno sul muro,

cordo per saccheggiare i giardini; gettansi i frutti da mano in mano disopra ai muri, e recano un gran guasto in tutte le terre coltivate.

Caratteri distintivi di questa specie.

Il papione ha delle borse alle guance, e delle larghe callosità sulle natiche, che son nude e di color sanguigno: ha la coda arcuata e di sette o otto pollici di lunghezza; i denti canini molto più lunghi e più grossi a proporzione di quelli dell'uomo; il muso grossissimo e lunghissimo, le orecchie nude, ma niente orlate, il corpo passuto, e raccolto, le membra grosse e corte, le parti genitali nude e di colore scarnato; il pel lungo e folto, d'un bruno-rossiccio e d'un colore molto uniforme sopra tutto il corpo.

i meloni, le mele, le pere, ec. a misura che le raccolgono; quelli che sono sul muro gettano i detti frutti a quelli che sono al basso, e così di mano in mano tutto al lungo della linea, che ordinariamente va a finire in qualche montagna; essi sono sì destri ed hanno la vista sì pronta e sì giusta che di rado lascian cadere i frutti a terra gettandoli gli uni agli altri. Tutto ciò si fa con un profondo silenzio e con molta prestezza. Quando le sentinelle scorgono qualcuno, gettano un grido, al qual segno tutta la truppa se ne fugge con una prestezza sorprendente. *Descrizione del Capo di Buona-Speranza, di Kolbe. Tom. III., pag. 57. e seg.*

del Papione o Babbuino. 165

Egli cammina più spesso a quattro piedi che a due; ha tre o quattro piedi d'altezza quando è ritto in piedi. Sembra che in questa specie vi siano delle razze anche più grandi, e delle altre molto più piccole. Il babbuino, che noi abbiain fatto rappresentare, è della specie piccola: l'abbiamo accuratamente paragonato col gran *Babbuino* o *Papione*, e tra essi non abbiain notate altre differenze che quella della grandezza, la qual differenza non proveniva da quella dell'età, poichè il piccol babbuino ci è paruto adulto egualmente che il grande. Le femmine sono, al pari delle donne, ai periodici mestruai soggette.



DESCRIZIONE DEL PAPIONE.

IL papione [*tev. XIII.*], benchè di statura grande, ha la testa e il corpo sì grossi, che sembrano mal proporzionati alla sua altezza. Il muso è molto lungo e grossissimo: il naso rassomiglia a quello d'un mastino; gli occhi son piccoli e situati molto vicino l'uno all'altro: gli orli delle orbite si trovano sopra un piano ch'è quasi perpendicolare al frontale: l'osso frontale non si solleva al disopra delle orbite, di modo che non si distingue punto di fronte, e la parte superiore delle orbite è al livello della sommità della testa. Le orecchie son nude e di color bruno, e formano una piccola punta nella loro parte superiore; esse non sono orlate e son senza il piccol'lobo. Il collo è grosso e molto corto. Il papione, che ha servito di soggetto per questa descrizione aveva il petto largo in paragone del ventre ch'era poco esteso. Le natiche eran magre, quasi interamente sfornite di pelo e callose. Il perineo era molto lungo e situato all'indietro al disotto dell'ano, che sembrava per questa struttura esser situato più alto che negli altri animali. La coda non aveva che sette pollici di lunghezza, ma non era intera; essa s'innalzava all'uscir del corpo, e si ricurvava al basso e all'indietro sulla sua estremità. Le gambe di dietro

Descrizione del Papione . 167

eran corte in paragone di quelle dinanzi e della lunghezza totale dell' animale . Egli aveva altresì i pollici dei quattro piedi molto corti . Le ugne dei pollici eran larghe e piatte ; quelle dei diti eran più strette , molto lunghe , adunche e piegate in doccia sulla loro lunghezza .

Questo papione aveva il pelo lungo circa sei pollici sull' occipite , sul collo , sulla parte anteriore del dorso , sulle spalle e sul dinanzi del petto , di modo che tutte queste parti non sembravan essere che una massa informe e sproorzionata pel suo volume in paragone del ventre fottile e piatto , delle natiche pelate e delle gambe corte che componevano il resto del corpo , e che sembravano ancor più piccole , perchè il lor pelo non aveva più di tre pollici di lunghezza .

I colori erano presso a poco gli stessi sopra tutte le parti del corpo . Ciascun pelo aveva un color bruno-nericcio e un color rosso-gialliccio , situati succellivamente dalla radice fino alla punta , di modo che il color dell' animale era mischiato di bruno e di giallo-rossiccio , che dominava quand' esso veniva mirato a una certa distanza . Il muso e il contorno degli occhi eran neri e nudi : le palpebre eran bianche , egualmente che le ascelle , il basso ventre , le anguinaglie , la verga , lo scroto , e il perineo , e sopra queste parti non e'avi quasi punto di pelo . Il disotto dei quattro piedi e i diti erano parimente spogliati di pelo , ed avevano un color nero egualmente che le ugne .

pied. poll. lin.

Larghezza del corpo intero , misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano —————	I.	10.	6.
Lunghezza della testa dall' estremità del muso fino all' occipite ———	o.	6.	6.
Circonferenza dell' estremità del muso	o.	7.	o.
Circonferenza del muso presa sotto gli occhi —————	o.	9.	6.
Contorno dell' apertura della bocca —	o.	o.	5.
Distanza tra i due nasali ————	o.	o.	2.
Distanza tra l' estremità del muso , e l' angolo anteriore dell' occhio ———	o.	3.	2.
Distanza tra l' angolo posteriore e l'o- recchia —————	o.	2.	5.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro —————	o.	o.	6.
Apertura dell' occhio —————	o.	o.	$3\frac{1}{2}$
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi —————	o.	o.	8.
La stessa distanza in linea retta ———	o.	o.	$6\frac{1}{2}$
Circonferenza della testa presa tra gli occhi e le orecchie —————	I.	2.	o.
Lunghezza delle orecchie —————	o.	I.	4.
Larghezza della base , misurata sulla curvatura esteriore —————	o.	2.	9.
Distanza tra le due orecchie presa al basso —————	o.	4.	o.
Lunghezza del collo —————	o.	2.	7.
Circonferenza —————	o.	II.	o.

piec. poll. lin.

Circonferenza del corpo , presa dietro le gambe anteriori —————	1.	5.	6.
La stessa circonfer. al sito più grosso	1.	6.	0.
Circonferenza presa dinanzi le gambe posteriori —————	1.	2.	0.
Circonfer. all' origine della coda (*)	0.	4.	0.
Lunghezza dell' avan-braccio , dal gomito fino alla giuntura della mano	0.	8.	6.
Circonferenza della giuntura —————	0.	4.	0.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle ugne —————	0.	4.	2.
Lunghezza della gamba , dal ginocchio fino al tallone —————	0.	8.	3.
Lunghezza dal tallone fino all' estremità delle ugne —————	0.	6.	4.

Quest' animale pesava ventisei libbre . L' epiploon s' estendeva fino al pube . Dopo d'aver levato l' epiploon , ho veduto lo stomaco e degl' intestini tenui , che occupavano la maggior parte dell' estensione dell' addomine , il cieco , ch' era nel lato destro e una porzione del colon , che s' estendeva da un lato all' altro .

Il duodeno si ripiegava all' indentro all' uscir dallo stomaco prima di unirsi al digiuno , che faceva i suoi giri nella regione ombelicale e nei lati : quelli dell' ileo eran pure nella regione ombelicale ,

I 5

(*) Non do la lunghezza della coda , perch' essa è intera : è corta in tutt' i papioni .

nelle regioni iliache e nell' ipogastrica , e metteva capo al cieco nel lato destro . Il cieco era diretto dall' innanzi all' indietro . Il colon s' estendeva all' innanzi , passava da destra a sinistra sopra gl' intestini tenui , e faceva alcuni giri nel lato destro prima d' unirsi al retto .

Lo stomaco era grande a proporzione della statura dell' animale , e si trovava situato più a destra che a sinistra . Il fondo dello stomaco era profondo . Gl' intestini tenui avevan tutti presso a poco la medesima grossezza , eccettuato l' ileo , la cui circonferenza si scemava alquanto vicino al cieco . Quest' intestino era grosso e corto , e aveva una figura conica , la cui punta era ottusa . Il colon era egualmente grosso alla sua origine che il cieco , si diminuiva a poco a poco di grossezza sulla lunghezza di nove pollici ; in seguito era molto sottile sulla lunghezza d' un mezzo piede , finalmente diveniva più grosso fino al retto , ma non ostante men grosso che alla sua origine .

Il fegato era situato un poco più a destra che a sinistra e composto di tre lobi : il più grande si trovava nel mezzo , ed era diviso in due parti per via della scissura del legamento sospensorio . La parte destra di questo lobo era la più grande , e rinchiudeva la vescichetta del fiele che vi era quas' interamente incrostata . Il lobo destro era il più piccolo di tutti , e aveva due appendici alla sua parte superiore vicino al rene . Il fegato aveva esteriormente e interiormente un color rosso-palli-

ditilmo, e pesava undici once e sei dramme. La veseichetta del fiele era molto allungata, e rinchiudeva un liquor verde-gialliccio, che pesava una dramma e quarantadue grani.

La milza aveva tre fasce longitudinali, come quella della maggior parte degli altri animali. La sua estremità inferiore era il sito più largo, e si diminuiva a poco a poco di larghezza fino all'altra estremità. Essa era esteriormente d'un rosso-pallido, e interiormente d'un rosso-nericcio, e pesava due once e tre dramme.

Il pancreas s'estendeva dal duodeno fino al rene sinistro, ove terminava in punta. L'altra sua estremità era molto più larga.

I reni erano piatti e avevano poca cavità: la piccola pelvi aveva molta piccolezza; i capezzoli e le differenti sostanze di questo viscere si distinguevano appena.

Il cuore era situato nel mezzo del petto, la punta diretta a sinistra. Il polmon destro era composto di quattro lobi, come nella maggior parte degli altri animali. Nel polmon sinistro non eranvi che due lobi.

La lingua era sparfa di piccole papille e di grani glandulosi, più numerosi sull'estremità della lingua che sul resto della sua estensione: sulla parte posteriore eranvi delle piccole glandule a calice disposte in fila vicino ai lati, e due grosse glandule parimente a calice situate a dieci linee di distanza dall'epiglottide, e a cinque linee l'una dall'altra:

ad una distanza eguale da queste due glandule e dall' epiglottide se ne trovava una terza alquanto più piccola e di color nero.

Il palato era attraversato da otto solchi, i cui orli erano interrotti nel mezzo e divisi in due parti convesse all' innanzi. Gli orli dell' epiglottide erano incavati nel mezzo.

Il cervello era assai convesso colla sua parte superiore e molto grosso nel mezzo; esso copriva il cervelletto, eh' era diverso da quello degli altri animali non solo per la sua positura, ma anche per la sua figura, poichè sul mezzo della sua superficie non eravi un rialzo trasversale convesso e rotondo, ma solo una resta eh' era continuata da una parte all' altra colla superficie di questa viscera. Esso pesava quattro dramme e trentadue grani, e il cervello tre once sei dramme e trentadue grani.

La verga e le borse avevano presso a poco la stessa forma che nell' uomo; ma la ghianda era molto diversa da quella dell' uomo: essa terminava con una specie di fungo che aveva otto linee di lunghezza sulla faccia superiore della ghianda, e solamente sei linee sull' inferiore. Il detto fungo era puntuto alla sommità, ov' era aperto per una fenditura assai profonda, formata dall' orificio dell' uretra.

I testicoli erano ovali e grossi in paragone della verga; la sostanza interiore aveva un color grigio leggermente tinto di giallo. Le vescichette semi-

nali erano parimente molto estese e composte di tubi aggomitolati , che avevano fino a due linee di diametro . Vicino alle vescichette seminali era-
vi un corpo lungo un pollice , largo cinque linee e grosso tre , ch' era sull' uretra , e che mi parve esser le prostatici , perchè non ne ho veduta nes-
sun' altra . Il detto corpo era cellulare e quasi cavernoso : comprimendolo ne ho fatto uscir del sangue .

*pie*d.* poll. lin.*

Lunghezza degl' intestini tenui dal			
piloro fino al cieco —————	9.	0.	0.
Circonferenza del duodeno —————	0.	2.	9.
Circonferenza del digiuno —————	0.	2.	9.
Circonferenza dell' ileo nei siti più			
grossi —————	0.	2.	9.
Circonferenza nei siti più sottili —	0.	2.	3.
Lunghezza del cieco —————	0.	2.	3.
Circonferenza del cieco al sito più			
grossi —————	1.	6.	10.
Circonferenza al sito più sottile —	0.	3.	3.
Circonferenza del colon nei siti più			
grossi —————	0.	6.	6.
Circonferenza nei siti più sottili —	0.	1.	0.
Circonferenza del retto vicino al colon	0.	5.	0.
Circonferenza vicino all' ano ———	0.	4.	0.
Lunghezza del colon e del retto presi			
insieme —————	3.	0.	0.
Lunghezza del canale intestinale in			
intero , non compreso il cieco —	12.	0.	8.

pied. pied. lin.

Gran circonferenza dello stomaco —	1.	9.	4.
Piccola circonferenza —————	1.	3.	0.
Lunghezza della piccola curvatura dall' angolo che forma la parte destra fino all' esofago —————	0.	3.	0.
Profondità del fondo dello stomaco	0.	3.	0.
Circonferenza dell' esofago —————	0.	2.	0.
Circonferenza del piloro —————	0.	2.	6.
Lunghezza del fegato —————	0.	4.	8.
Larghezza —————	0.	7.	1.
La sua maggior grossezza —————	0.	1.	1.
Lunghezza della vescichetta del fiele	0.	2.	9.
Il suo maggior diametro —————	0.	0.	9.
Lunghezza della milza —————	0.	4.	4.
Larghezza dell' estremità inferiore —	0.	2.	2.
Larghezza dell' estremità superiore —	0.	0.	9.
Grossezza nel mezzo —————	0.	0.	9.
Grossezza del pancreas —————	0.	0.	$1\frac{1}{2}$
Lunghezza dei reni —————	0.	3.	2.
Larghezza —————	0.	2.	1.
Grossezza —————	0.	0.	11.
Lunghezza del centro nervoso dalla vena-cava fino alla punta ———	0.	1.	8.
Larghezza —————	0.	2.	0.
Circonferenza della base del cuore —	0.	6.	0.
Altezza dalla punta fino all' origine dell' arteria polmonare —————	0.	2.	9.
Altezza dalla punta fino al sacco polmonare —————	0.	2.	0.

pied poll. lin.

Diametro dell' aorta preso esterior- mente	o.	o.	4.
Lunghezza della lingua	o.	3.	9.
Lunghezza della parte anteriore dal freno fino all' estremità	o.	1.	o.
Larghezza della lingua	o.	1.	1.
Lunghezza del cervello	o.	3.	4.
Larghezza	o.	2.	6.
Groffezza	o.	1.	5.
Lunghezza del cervelletto	o.	1.	o.
Larghezza	o.	1.	10.
Groffezza	o.	o.	9.
Lunghezza della ghianda	o.	1.	7.
Circonferenza	o.	1.	6.
Circonferenza del fungo	o.	1.	8.
Lunghezza della verga dalla b. forca- zione dei corpi cavernosi fino all' inserzione del prepuzio	o.	3.	2.
Circonferenza	o.	1.	6.
Lunghezza dei testicoli	o.	1.	3.
Larghezza	o.	o.	10.
Groffezza	o.	o.	7 $\frac{1}{2}$
Larghezza dell' epididimo	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$
Groffezza	o.	o.	o $\frac{1}{2}$
Lunghezza dei canali deferenti	o.	8.	6.
Diametro nell' a maggior parte della loro estensione	o.	o.	o $\frac{1}{2}$
Gran circonferenza della vescica	o.	6.	o.
Piccola circonferenza	o.	4.	o.

	pied. poll. lin.		
Circonferenza dell' uretra	o.	o.	7.
Lunghezza delle vescichette feminali	o.	2.	4.
Larghezza	o.	o.	7.
Groffezza	o.	o.	2 $\frac{1}{2}$

Vidi il maschio [*tav. XIV.*] e la femmina d'una specie d'animale, il cui corpo era quasi d'un quarto men lungo di quello del papione, ma che nella sua piccola statura aveva tanta rassomiglianza ad esso per le proporzioni del corpo (*) e pe' colori del pelo, che si farebbe potuto riguardare quest' animale come una varietà della specie del papione.

La femmina del piccol papione aveva il pelo della testa a proporzione men lungo di quello del papione grande. Quest' animale aveva il muso, il naso, il contorno degli occhi, le orecchie e la pianta de' piedi di color nericcio; il pelo era mischiato di gialliccio e di verdastro, di modo che il giallo o il verde si diminuiva successivamente in diversi aspetti: mirando dappresso si vedeva che ciascun pelo aveva un color cenerino vicino alla radice; il resto era di color mischiato di giallo e di verde, interrotto in due o tre fitti da un bruno-nericcio. La punta aveva pure un color bruno ch'era molto visibile sulla fronte, sulla

(*) Vedi le misure riferite nella tavola seguente, e paragonate con quelle delle parti esteriori del papion grande.

sommità della testa, sulla faccia esteriore dell'avan-braccio e su i quattro piedi. La faccia esteriore della coscia e della gamba era rossiccia; sul basso del ventre e sulle anguinaglie non eravi che poco pelo.

pied. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero, misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano	1.	5.	0.
Lunghezza della testa dall' estremità del muso fino all' occipite	0.	4.	9.
Circonferenza dell' estremità del muso	0.	5.	6.
Circonferenza del muso presa sotto gli occhi	0.	7.	0.
Contorno dell' apertura della bocca	0.	3.	6.
Distanza tra i nasali	0.	0.	1.
Distanza tra l' estremità del muso, e l' angolo anteriore dell' occhio	0.	1.	10.
Distanza tra l' angolo posteriore, e l' orecchia	0.	2.	2.
Lunghezza dell' occhio da un angolo all' altro	0.	0.	7.
Apertura dell' occhio	0.	0.	4.
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi	0.	0.	7.
Circonferenza della testa presa tra gli occhi e l' orecchie	0.	10.	6.
Lunghezza delle orecchie	0.	1.	6.
Lunghezza della base, misurata sulla curvatura esteriore	0.	2.	8.

Distanza tra le due orecchie presa al		
basso	_____	o. 3. 2.
Lunghezza del collo	_____	o. 2. 4.
Circonferenza del collo	_____	o. 7. 0.
Circonferenza del corpo presa dietro		
le gambe anteriori	_____	o. 11. 0.
La stessa circonferenza al sito più		
grosso	_____	1. 0. 8.
La stessa circonferenza dinanzi le		
gambe posteriori	_____	o. 9. 4.
Lunghezza del tronco della coda	_____	o. 6. 0.
Circonferenza all' origine	_____	o. 3. 6.
Lunghezza dell' avan-braccio dal go-		
mito fino alla giuntura della mano	_____	o. 6. 0.
Circonferenza della giuntura	_____	o. 3. 4.
Lunghezza dalla giuntura fino all'		
estremità delle ugne	_____	o. 3. 0.
Lunghezza della gamba dal ginocchio		
fino al tallone	_____	o. 7. 0.
Lunghezza dal tallone fino all' estre-		
mità delle ugne	_____	o. 5. 0.

Ho qui data la descrizione delle parti della generazione della femmina del piccol papione, perchè non ho mai veduta la femmina del grande. Quella, di cui si parla, pesava otto libbre e quindici once; aveva due mammelle sul petto, una da ciascun lato.

La clitoride era situata sull' orlo della vulva, e usciva al di fuori la lunghezza di due linee:

L'orifizio dell' uretra si trovava a otto linee di distanza dall' orlo della vulva, e la porzione della vagina, ch' era fra essi, formava delle grinze longitudinali grossissime: il resto delle pareti interne della vagina era tubercoloso, e i tubercoli più grossi si trovavano vicino all' orifizio della matrice. L' uretra era corta e la vescica aveva un gran volume e una forma ovale. La matrice era piatta, allungata e incavata dal suo orlo anteriore; non aveva corni; le trombe formavano varj angoli e mettevano capo ad un padiglione, ch' era attaccato al testicolo, ma non l' involgeva. I testicoli avevano la forma d' un rene piatto e di un color biancastro.

pied. poll. lin.

Distanza tra l' ano e la vulva	—	o.	o.	5 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della vulva	—	o.	o.	3.
Lunghezza della vagina	—	o.	2.	7.
Circonferenza	—	o.	1.	3.
Gran circonferenza della vescica	—	o.	10.	3.
Piccola circonferenza	—	o.	7.	9.
Lunghezza dell' uretra	—	o.	o.	9.
Circonferenza	—	o.	o.	7.
Lunghezza del collo e del corpo della matrice	—	o.	o.	9.
Circonferenza del corpo	—	o.	o.	8.
Lunghezza della linea curva che traversa la tromba	—	o.	1.	6.
Lunghezza dei testicoli	—	o.	o.	4.
Larghezza	—	o.	o.	2.
Grosshezza	—	o.	o.	1.

Il piccol papione maschio pesava nove libbre e mezzo, e aveva un piede e cinque pollici di lunghezza dall'estremità del muso fino all'ano, come la femmina su cui sono state prese le misure delle parti esteriori.

I colori di quest'animale erano quasi gli stessi sopra tutte le parti del corpo: essi eran rofficci, con alcune tinte di verdastro e di bruno; quest'ultima tinta dominava sul dorso. Del resto i colori di questo maschio rassomigliavano a quelli della femmina. I peli più lunghi avevano circa quattro pollici, e si trovavano sulle spalle, sul garrot, sul collo, sull'occipite e intorno alle orecchie, ch'essi avrebbero nascoste interamente se fossero stati più folti.

La verga e la ghianda rassomigliavano a queste stesse parti vedute nel papion grande: non eravi punto di scroto; le parti interiori della generazione non avevano ancor preso tutto il loro accrescimento; per altro le vescichette feminali, benchè piccolissime, avevano già de' canali molto apparenti.

Nella ghianda eravi un piccol osso cilindrico, alquanto curvo nella sua parte anteriore; quest'osso m'ha fatto presumere che ve ne sia un simile nella ghianda del papion grande, ma io non l'ho veduto.

La testa dello scheletro [tav. XV.] del papione rassomiglia più alla testa del mandrillo (*), che a

(*) Vedi in seguito la Descrizione dello scheletro del mandrillo.

quella di verun' altra scimia ; essa però è un poco men lunga e più grossa . L'occipite è più gonfiato alla sua parte superiore : la resta ossea dell' occipitale è interrotta sul mezzo dell' osso . Gli orli delle orbite degli occhi son più grossi che nel mandrillo ; gli ossi proprj del naso son più corti : l'apertura delle nari è più lunga : allato degli ossi del naso vi son dei solchi , ma hanno minor larghezza e profondità : i lati della mascella superiore formano una gran concavità al disopra dei denti mascellari .

I denti del babbuino rassomigliano a quelli del mandrillo per la situazione e pel numero . Nella formà dei denti di questi due animali non ho scoperte che leggierissime differenze .

Le apofisi delle vertebre cervicali del papione son più piccole di quelle del mandrillo .

Vi son tredici vertebre dorsali e tredici coste da ciascun lato , otto vere e cinque false : lo sterno non era interamente ossificato .

Le vertebre lombari sono al numero di sette . L'osso sacro è composto di tre false vertebre , come nel mandrillo e nel jocko , ma è più rovesciato e forma un angolo meno ottuso sulla colonna vertebrale .

Nella coda dello scheletro , che ha servito di soggetto per questa descrizione , non eranvi che dodici false vertebre , ma m'è paruto che ne mancassero varie all' estremità .

Le tuberosità delle ossa ischie son molto più larghe , e la loro faccia è molto più grande che nello

scheletro del mandrillo: parimente le callosità delle natiche del papione sono più estese che quelle delle altre scimmie.

L'omoplata è più allungato, e l' suo lato superiore è più lungo che nel mandrillo.

Le clavicole, e gli ossi del braccio e dell' avambraccio rassomigliano a quelli del mandrillo, ma l' osso della coscia, e principalmente quelli della gamba, son più corti.

Nel carpo non eranvi che dieci ossi; vi mancava il primo dei soprannumerarj: il tarso non era composto che di sett' ossi.

pieđ. poll. lin.

Lunghezza della testa dall' estremità delle mascelle fino all' occipite	—	o. 7. 1.
La maggior larghezza della testa	—	o. 4. 4.
Lunghezza della mascella inferiore, dalla sua estremità anteriore fino all' orlo posteriore dell' apofisi condiloidea	—	o. 5. 6.
Grosshezza della parte anteriore dell' osso della mascella superiore	—	o. o. 5.
Larghezza della mascella superiore al sito dei denti canini	—	o. 1. 11.
Distanza tra le orbite e l' apertura delle nari	—	o. 1. 6.
Lunghezza della detta apertura	—	o. 1. 4.
Larghezza	—	o. o. 9.
Lunghezza degli ossi proprj del naso	—	o. 2. o.
Larghezza al sito più largo	—	o. o. 2.

del Papione .

183

pie*d.* poll. lin.

Larghezza delle orbite —————	o.	1.	3.
Altezza —————	o.	o.	10.
Lunghezza dei denti canini —————	o.	1.	4.
Larghezza del catino —————	o.	2.	5.
Altezza —————	o.	2.	7.
Lunghezza delle vertebre più lunghe della coda —————	o.	1.	4.
Lunghezza dell' omoplata —————	o.	4.	5.
Lunghezza dell' umero —————	o.	7.	8.
Lunghezza dell' osso dell' ulna —————	o.	8.	10.
Lunghezza dell' osso del radio —————	o.	8.	1.
Lunghezza del femore —————	o.	8.	7.
Lunghezza della tibia —————	o.	7.	2.
Lunghezza del peroneo —————	o.	6.	8.
Lunghezza del prim' osso del meta- carpo , ch' è il più corto —————	o.	1.	3.
Lunghezza del terz' osso del metacar- po , ch' è il più lungo —————	o.	1.	9.
Lunghezza del prim' osso del meta- tarso , ch' è il più corto —————	o.	1.	4.
Lunghezza del terzo , ch' è il più lungo —————	o.	2.	$2\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del pollice dei piedi anteriori —————	o.	o.	8.
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	$4\frac{1}{2}$
Lunghezza della prima falange del terzo dito —————	o.	1.	$1\frac{1}{2}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o.	$7\frac{1}{3}$
Lunghezza della terza —————	o.	o.	5.

184 *Descrizione del Papione.*

pied. poll. lin.

Lunghezza della prima falange del pollice de' piedi posteriori ———	o.	o.	8.
Lunghezza della seconda ———	o.	o.	5.
Lunghezza della prima falange del terzo dito ———	o.	1.	1.
Lunghezza della seconda ———	o.	o.	8 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della terza ———	o.	o.	5 $\frac{1}{2}$



IL MANDRILLO (a).

Questo babbuino è d'una spiacevole, e disgustosa bruttezza: indipendentemente dal suo naso tutto piatto, o piuttosto da due nasi, da' quali continuamente scola un moccio, ch'egli raccoglie colla lingua.

Tom. XXVIII.

K

(a) *Mandrill*, nome, che gl' Inglese che frequentano le coste della Guinea, hanno dato a quest' animale, e che noi abbiamo adottato.

Specie singolare, che i Bianchi del paese della Guinea chiamano *Mandrill*. Io non saprei indovinare l'origine di questo nome, che per l'addietro non aveva inteso giammai. Que' medesimi, che lo nominano così, non saprebbero indicarne la ragione, almeno che ciò non sia a cagione della rassomiglianza di quest' animale coll' uomo, mentre egli non ne ha niente affatto colla scimia. [*Man*, in Inglese significa uomo]. *Nouveau voyage de Guinée, par Smith. Paris, 1751. Tom. I., pag. 104.*

Cercopithecus cynocephalus parte corporis anteriore longis pilis obfusa naso violaceo nudo, il *Magot* o *Tartarin*. Briffon, *regn. animal.*, pag. 214. **NOTA.** Mi sembra che il Sig. Briffon si sia ingannato, 1. dando a questa scimia il nome di *magot* o di *tartarin*, ch'egli avrebbe dovuto applicare alla sua scimia cinocefala; 2. riferendo quest' animale al *cinocefalo* di Gesner. *Icon. fig. pag. 93.*, al *cinocefalo secondo* di Jontton, *pag. 100.*, *tab. 59.*, e al *cinocefalo* di Clusio. *Exotic. pag. 370.*; poichè le figure di questi tre Autori non rassomiglian punto al babbuino, di cui qui si parla, il quale per altro si può fa-

gua; indipendentemente dal suo grossissimo e lungo muso, dal suo corpo grosso, dalle sue natiche di color sanguigno, e dal suo ano apparente e situato, per così dire, nei lombi; ha anche la faccia violacea e solcata dai due lati da grinze profonde e longitudinali, che ne accrescono di molto l'aria triste, e difforme: è in oltre più grande e forse più forte del papione, ma è nel tempo stesso più pacifico e men feroce. Noi diamo qui la figura del maschio e della femmina, che abbiain veduti vivi: o siano essi stati meglio educati, o fossero naturalmente più mansueti del papione, ci son paruti più trattabili, e meno inverecondi senz'esser meno spiacevoli.

Questa specie di babbuino si trova sulla costa d'Oto e nelle altre provincie meridionali dell'Africa, ove i Negri l'appellano *boggo* e gli Europei *mandrill*. Sembra che dopo l'orang-outang questo animale sia il più grande fra tutte le scimie e fra tutt'i bab-

cilmente distinguere da tutti gli altri pe' solchi longitudinali, che ha sulla faccia, e che lo stesso Sig. Brisson indica ne' termini seguenti: „ Il suo naso, dic' egli, è molto grosso, nudo „ di peli, scanalato su la sua lunghezza, e „ d'un color violaceo “. Or questi caratteri non convengono punto al cinocefalo di Clusio, di Gesner, e di Jonston.

buini. Smith (a) racconta che gli fu regalata una femmina mandrilla, che non aveva che sei mesi d'età, e che a tale età era già sì grande come un babbuino adulto. Egli dice pure che questi mandrilli camminano sempre su due piedi, che piangono e sospirano come uomini, che hanno una violenta passione per le donne, e che non mancano d'assalirle con buon esito quando le trovano in disparte.

K 2

(a) Il corpo del mandrillo, quand' ha acquistato il suo accrescimento, è egualmente grosso in circonferenza che quello d'un uomo ordinario; le gambe son molto più corte, e i piedi lunghi; le braccia e le mani sono nella stessa proporzione; la testa è d'una grossezza mostruosa; la faccia larga e piatta, senz' altri peli che alle sopracciglia; il naso è molto piccolo, la bocca larga e le labbra sottilissime; la faccia, ch' è coperta d'una pelle bianca, è d'una bruttezza spaventevole e tutta aggrinzata; i denti son larghi e molto gialli; le mani sono senza pelo; tutt' il resto del corpo, eccettuato il viso e le mani, è coperto di pel lungo e nero come quello dell' orso. Questi animali non camminano mai su' quattro piedi, come i guenoni; quando vengono tormentati, gridano precisamente come i fanciulli. Si pretende che i maschi cerchino spesso di violar le donne bianche, quando le incontrano sole nei boschi. Hanno quasi tutti il naso moccioso, ed amano di far entrare il moccio nella loro bocca. . . . Mi fu a Skerbro regalato uno di questi mandrilli: gli abitanti del paese li chiamano *boogoc*: esso era una fem-

Caratteri distintivi di questa specie.

Il mandrillo ha delle borse al basso delle guance e delle callosità sulle natiche: ha la coda cortissima e solamente di due o tre pollici di lunghezza; i denti canini molto più grossi e più lunghi a proporzione di quelli degli uomini; il muso grossissimo e lunghissimo, e solcato dai due lati da grinze longitudinali, profonde e notabilissime; la faccia nuda e di colore tirante al turchino; le orecchie nude egualmente che il didentro.

mina che non aveva che sei mesi, ma era già più grossa d'un babbuino, ec. *Nouveau voyage en Guinée, par Smith, traduit de l'Anglois. Parigi, 1751. Tom. I., pag. 104. NOTA.* Nel medesimo paese adunque chiamasi l'animale, di cui qui si parla, *boogoc* o *boggo* e *mandrill*, e si chiama parimente *pongo* e *drill*, *l'orang-outang*: questi nomi si rassomigliano, e verosimilmente sono derivati gli uni dagli altri; e in fatti il *pongo* e il *boggo*, o se si vuole, il *drill* e il *mandrill* hanno varj caratteri comuni; ma il primo è una scimia senza coda e quasi senza pelo, che ha la faccia piatta e ovale, mentre il secondo è un babbuino con una coda, con lunghi peli, e col muso grosso e lungo. La parola *man*, nelle lingue Tedesca, Inglese, ec. significa *l'uomo in generale*; e la parola *drill* nel gergone di alcune provincie della Francia, come nella Borgogna, significa un *uomo vigoroso e libertino*; i contadini dicono: *egli è un buon drill*, *ma maestro drill*.

delle mani e dei piedi ; il pel lungo , d'un bruno rossiccio sul corpo , e grigio sul petto e sul ventre ; cammina su due piedi più spesso che su quattro ; ha quattro o quattro piedi e mezzo d'altezza quando è ritto in piedi , e sembra che ve ne siano anche di più grandi . Le femmine sono , come le donne , soggette ai mestrui periodici .



DESCRIZIONE

DEL MANDRILLO.

IL muso del mandrillo [*tav. XVI.*] è grossissimo e molto allungato. Questa scimia ha il naso piatto in tutta la sua lunghezza, e situato in mezzo a piegature in forma di grinze, dirette obliquamente dall' infuori all' indentro e dall' alto al basso sulle guance, che hanno un color turchino. Le orecchie son nude, e non son molto diverso da quelle dell' uomo, quantunque sian alquanto puntute all' alto. Sulle natiche vi sono delle callosità. La coda è cortissima.

La fronte, l' occipite, la sommità e i lati della testa, la faccia esteriore del braccio e dell' avan-braccio d' una femmina [*tav. XVII.*] di mandrillo, su cui è stata fatta questa Descrizione, erano di color mischiato di bruno e di giallo leggermente tinto di verde. I peli avevano alternativamente del bruno e del giallo verdiccio dalla loro radice fino all' estremità, di modo che ciascuno aveva due o tre macchie d' un giallo verdiccio. La faccia superiore del collo, le spalle, la faccia interiore dell' avan-braccio, il dorso, l' alto dei lati del corpo, la groppa, la faccia esteriore della coscia, la gamba e l' di sopra dei piedi avevano presso a poco gli stessi colori, ma il bruno vi era più apparente che il giallo. Il pelo del di sotto

Descrizione del Mandrillo. 191

della mascella inferiore e della gola era di color fulvo-rossiccio. La parte anteriore del petto, le ascelle, la faccia inferiore del braccio, il basso dei lati del corpo e la pianta dei piedi erano di color cenerino-bruno. Il petto, il ventre, le anguinaglie e la faccia inferiore della coscia avevano un color biancastro, più o meno mischiato di giallo. I diti non son separati gli uni dagli altri che lungo la seconda e la terza falange. Il pollice dei piedi posteriori è molto grosso, e tutte le ungue son nere e piatte.

Le misure delle parti esteriori, riferite nella tavola seguente, sono state prese sopra un mandrillo maschio.

pieđ. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero, misu-			
rato in linea retta dall' estremità			
del muso fino all' ano	2.	1.	6.
Lunghezza della testa dall' estremità			
del muso fino all' occipite	0.	8.	6.
Circonferenza dell' estremità del muso	0.	8.	0.
Circonferenza del muso presa sotto			
gli occhi	1.	0.	0.
Contorno dell' apertura della bocca	0.	6.	6.
Distanza tra i nasali	0.	0.	3.
Distanza tra l' estremità del muso, e			
l' angolo anteriore dell' occhio	0.	4.	0.
Distanza tra l' angolo posteriore, e			
l' orecchia	0.	2.	7.
Lunghezza dell' occhio da un angolo			
all' altro	0.	0.	11.

	pied. poll. lin.		
Apertura dell' occhio —————	o.	p.	4.
Distanza tra gli angoli anteriori degli occhi —————	o.	o.	7.
Circonferenza della testa presa tra gli occhi e le orecchie —————	1.	3.	3.
Lunghezza delle orecchie —————	o.	o.	8.
Larghezza della base misurata sulla curvatura esteriore —————	o.	1.	8.
Distanza tra le due orecchie presa al basso —————	o.	3.	2.
Lunghezza del collo —————	o.	2.	10.
Circonferenza del collo —————	1.	o.	o.
Circonferenza del corpo, presa dietro le gambe anteriori —————	1.	5.	o.
La stessa circonferenza al sito più grosso —————	1.	6.	6.
La stessa circonferenza dinanzi le gambe di dietro —————	1.	2.	o.
Lunghezza del tronco della coda —	o.	2.	o.
Circonferenza all' origine —————	o.	3.	o.
Lunghezza dell' avan-braccio dal gomito fino alla giuntura della mano —	o.	9.	8.
Circonferenza della giuntura ———	o.	4.	2.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle ugne —————	o.	5.	o.
Lunghezza della gamba dal ginocchio fino al tallone —————	o.	9.	3.
Larghezza dal tallone fino all' estremità delle ugne —————	o.	7.	4.

La femmina del mandrillo, di cui si è già fatta menzione, e su cui ho descritte le parti interne e le esterne, aveva un forte odore che molto s'accostava a quello del muschio: essa pesava sedici libbre, e aveva un piede e nove pollici di lunghezza dall'estremità del muso fino all'ano. La lunghezza della testa era di sette pollici e mezzo, e la circonferenza d'un piede al sito più grosso. La coda aveva due pollici e tre linee di lunghezza, e un pollice e mezzo di circonferenza all'origine.

L'epiploon s'estendeva dallo stomaco fino al pube: una porzione del colon passava trasversalmente da destra a sinistra dietro lo stomaco, che pareva estendersi più a sinistra che a destra. Il fegato era più a destra che a sinistra. La milza era diretta dall'innanzi all'indietro.

Il duodeno si ripiegava all'indietro all'uscir dallo stomaco, e s'estendeva solamente fino alla colonna vertebrale, su cui si ricurvava a destra. Il digiuno faceva i suoi giri nella regione ombelicale e nel lato destro; l'ileo nel lato sinistro e nelle regioni iliache e ipogastrica. Il cieco era situato nel lato sinistro e diretto dall'innanzi all'indietro. Il colon s'estendeva a destra, si ripiegava a sinistra e passava dietro lo stomaco, in seguito s'estendeva all'indietro fino al pube, ove si ripiegava a sinistra e si prolungava all'innanzi per unirsi al retto.

Il duodeno era in alcuni siti alquanto più gros-

fo che gli altri intestini tenui, i quali tutti avevano presso a poco la stessa grossezza; eran sottili e biancastri, eccettuato l'ileo ch'era rossiccio. Il cieco era grosso; corto e rotondo all'estremità, e aveva la medesima grossezza alla sua origine che il colon. Eranvi tre fasce tendinose, che s'estendevano dall'estremità del cieco fino all'ano.

Il fegato aveva un gran lobo e due piccoli, che non eran separati fino alla radice. Il lobo grande era diviso in due parti ineguali per via d'una scissura, in cui passava il legamento sospensorio. La vescichetta del fiele si trovava incrostata nella porzion destra di questo lobo, ch'era la più grande: i lobi piccoli eran situati da ciascun lato alla radice del grande; il destro era alquanto più grosso del sinistro, e aveva due o tre punte in forma d'appendici, situate al dinanzi del rene. Il color del fegato era esteriormente e interiormente d'un rosso-pallido; pesava otto once.

La vescichetta del fiele aveva la forma d'una pera, più stretta nel mezzo che all'estremità più piccola: conteneva un poco di liquore molto denso e di color bruno alquanto verdiccio.

La milza aveva una forma triangolare e allungata; la punta era all'indietro, e la base all'innanzi; aveva interiormente un color rossiccio pesava un'oncia e una dramma.

Il pancreas era corto, grosso e terminato in punta, presso a poco come la milza, e situato nella curvatura del duodeno.

Il rene destro era più inoltrato che il sinistro di tutta la sua lunghezza. La loro cavità era poco profonda, e la piccola pelvi aveva poca estensione. I capezzoli si univan tutti insieme gli uni agli altri: le capsule subrenali eran ciascuna quasi sì grandi come la metà dell' uno dei reni.

Il centro nervoso era grosso e poco trasparente. Il polmon destro era irregolare a segno che non si potevan distinguere i suoi lobi: ve n'eran due a sinistra, l' anterior de' quali era diviso per via d' una profonda scissura.

Il pericardio era unito al cuore sopra tutta la base. Il cuore aveva la punta diretta all' indietro. La lingua era larga e grossa, eccettuato all' estremità, che aveva poca grossezza: essa era coperta di piccole papille e sparfa di piccoli grani rotondi e bianchi: non eravi che una piccola glandula a calice nel mezzo della parte posteriore.

L' epiglottide era sottile e rotonda e gli orli dell' ingresso della laringe formavano quattro tubercoli, due da ciascun lato: eranvi sul palato circa otto solchi, i primi de' quali e' gli ultimi erano molto irregolari, ed avevano i loro orli disposti ad angoli: gli orli degli altri solchi eran convessi all' innanzi e interrotti nel mezzo del palato.

Ho veduto un mandrillo maschio, il cui ano sembrava esser situato nei lombi, poich' era a due pollici al disopra delle parti che toccavan terra

quando l'animale era seduto. Egli portava la coda rovesciata lungo i lombi.

La ghianda era fessa all'estremità, e l'orifizio dell'uretra si trovava al mezzo della fenditura: i suoi orli eran gonfiati e formavano una specie di fungo all'estremità della ghianda.

Il restante delle parti della generazione aveva molte relazioni a quelle del magot, per quanto ne ho potuto giudicare sul mandrillo, che m'ha servito di soggetto, e ch'era in gran parte corrotto.

Le mammelle eran sul petto al numero di due, una da ciascun lato.

L'ingresso della vulva si trovava a un pollice di distanza dall'ano e a un pollice dalla clitoride. La ghianda della clitoride era circondata da un prepuzio e terminava con una specie di fungo composto di due lobi, come la ghianda della verga del maschio. Il prepuzio era attaccato al fungo colla sua parte inferiore, ma potevasi tirare la parte superiore della ghianda della clitoride alcune linee fuori del prepuzio.

Gli orli della vulva eran sottili, e le pareti interiori della vagina formavano varie grinze notabilissime. La vescica era grossa e in forma di pera. La matrice aveva molta relazione a quella d'una femmina: il suo collo s'innoltrava nella vagina e aveva la forma d'un becco di tinca; l'orifizio era allungato e trasversale; la cavità aveva poca estensione; le pareti eran molto grosse.

Questa viscera non aveva corni come nella maggior parte dei quadrupedi: le trombe uscivano dal corpo della matrice, trascorrevano una linea curva e mettevano capo ad un padiglione. L'ovaja era attaccata al padiglione ed era molto allungata, molto stretta, molto sottile e di color biancastro.

pied. poll. lin.

Lunghezza degl' intestini tenui dal

piloro fino al cieco —————	14.	6.	0.
Circonferenza del duodeno —————	0.	3.	0.
Circonferenza del digiuno —————	0.	2.	4.
Circonferenza dell' ilco nei fiti più grossi —————	0.	2.	7.
Circonferenza nei fiti più sottili —	0.	2.	3.
Lunghezza del cieco —————	0.	1.	8.
Circonferenza al fito più grosso —	0.	5.	3.
Circonferenza al fito più sottile —	0.	2.	6.
Circonferenza del colon nei fiti più grossi —————	0.	5.	8.
Circonferenza nei fiti più sottili —	0.	2.	3.
Circonferenza del retto vicino al colon —————	0.	2.	3.
Circonferenza vicino all' ano —	0.	3.	0.
Lunghezza del colon e del retto presi insieme —————	2.	8.	0.
Lunghezza del canale intestinale in intero, non compreso il cieco —	17.	2.	0.
Gran circonferenza dello stomaco —	1.	9.	0.
Piccola circonferenza —————	1.	3.	4.
Lunghezza della piccola curvatura,			

dall' angolo che forma la parte de-			
stra fino all' esofago —————	o.	2.	6.
Profondità del fondo dello stomaco —	o.	2.	6.
Circonferenza dell' esofago —————	o.	2.	0.
Circonferenza del piloro —————	o.	2.	6.
Lunghezza del fegato —————	o.	4.	10.
Larghezza —————	o.	5.	6.
La sua maggior grossezza —————	o.	1.	0.
Lunghezza della vescichetta del fiele	o.	1.	9.
Il suo maggior diametro —————	o.	0.	7.
Lunghezza della milza —————	o.	3.	0.
Larghezza dell' estremità inferiore —	o.	1.	6.
Larghezza dell' estremità superiore —	o.	0.	6.
Grossezza nel mezzo ——— ———	o.	0.	8.
Grossezza del pancreas —————	o.	0.	6.
Lunghezza dei reni —————	o.	1.	9.
Larghezza —————	o.	1.	4.
Grossezza —————	o.	0.	9.
Lunghezza del centro nervoso del			
diaframma dalla vena-cava fino			
alla punta —————	o.	1.	7.
Larghezza —————	o.	2.	6.
Circonferenza della base del cuore —	o.	4.	6.
Altezza dalla punta fino all' origine			
dell' arteria polmonare —————	o.	2.	4.
Altezza dalla punta fino al sacco			
polmonare —————	o.	1.	8.
Diametro dell' aorta , preso esterior-			
mente —————	o.	0.	4.

pied. poll. lin.

Lunghezza della lingua	o. 3. o.
Lunghezza della parte anteriore dal freno fino all' estremità	o. o. 9.
Larghezza della lingua	o. 1. 2.
Lunghezza del cervello	o. 3. o.
Larghezza	o. 2. 7.
Groffezza	o. 1. 1.
Lunghezza del cervelletto	o. 1. 5.
Larghezza	o. 1. 9.
Groffezza	o. o. 8.
Lunghezza della vulva	o. o. 8.
Lunghezza della vagina	o. 2. 1.
Circonferenza	o. 1. 9.
Gran circonferenza della vescica	o. 10. o.
Piccola circonferenza	o. 8. o.
Lunghezza dell' uretra	o. o. 9.
Circonferenza	o. 1. o.
Lunghezza del collo e del corpo del- la matrice	o. 1. 7.
Circonferenza del corpo	o. 2. o.
Distanza in linea retta tra i testicoli e la matrice	o. o. 5.
Lunghezza della linea curva , che trascorre la tromba	o. 1. 4.
Lunghezza dei testicoli	o. o. 6.
Larghezza	o. o. 2.
Groffezza	o. o. 1.

La testa dello scheletro del mandrillo è poco
diversa da quella del magot per la forma del cra-

nie, delle orbite, del loro orlo superiore e della parte inferiore dell' osso della fronte ch' è tra le orbite, per la grandezza delle apofisi orbitarie dell' osso della fronte e dell' osso della guancia, e per la convessità dell' arco zigomatico: ma il muso del mandrillo è molto più grosso e più lungo di quello del magot; e per conseguenza l' apertura delle nari è molto più distante dalle orbite, e gli ossi propri del naso son più lunghi; essi hanno poca larghezza: da ciascun lato di questi ossi vi è un largo solco, che s' estende dall' orbita fino all' apertura delle nari, e una piccola scanalatura men lunga e situata al lato esterno di ciascun solco: tali scanalature e tai solchi son contrassegnati sulla pelle, come ho già fatto osservare. La mascella inferiore è diversa da quella del magot, perchè i suoi rami son più curvi.

I denti del mandrillo rassomigliano a quelli del magot pel numero, per la situazione e per la forma, eccettuati i due incisivi del mezzo della mascella inferiore, che son più grandi degli altri due.

Il mandrillo e il magot si rassomigliano parimente per le vertebre cervicali, dorsali e lombari, per le coste e per le ossa dello sterno, che si trovavano nello scheletro del mandrillo, che ha servito di soggetto per questa descrizione: le ultime vi mancavano, onde non ho potuto saperne il numero totale, nè distinguere le coste vere dalle false.

L' osso sacro forma un angolo men ottuso per

mezzo della sua articolazione colla colonna vertebrale, che il sacro del magot. Eſſo è composto di tre falſe vertebre, e la coda di otto.

Gli oſſi del catino del mandrillo raſſomigliano a quelli del magot.

L'omoplata è differente da quello del magot perchè i fuſi due lati ſono preſſo a poco della medefima lunghezza, invece che nel magot il lato poſteriore è più lungo dell' anteriore.

Le clavicole di queſti due animali hanno preſſo a poco la medefima forma.

Gli oſſi del braccio, dell' avan-braccio, della coſcia e della gamba ſono a proporzione più lunghi di quelli del magot, ma men lunghi di quelli del gibbono. Gli oſſi dell' avan-braccio ſon più lunghi di quelli del braccio, ma queſta differenza non è sì grande come nel gibbono: del reſto tutti queſti oſſi raſſomigliano a quelli, che ad oſſi corriſpondono nel magot.

Il carpo dello ſcheletro del mandrillo, che ha ſervito di ſoggetto per queſta deſcrizione, non era compiuto: vi mancava il quart' oſſo del ſecond' ordine, e non eravi che un terz' oſſo ſoprannumerario; non ſo ſe nel mandrillo ſi trovino gli altri due. Nel tarſo non eranvi che ſett' oſſi.

pied. poll. lin.

Lunghezza della teſta, dall' eſtremità

delle maſcelle fino all' occipite — o. 7. 1.

La maggior larghezza della teſta — o. 4. $1\frac{1}{2}$

Lunghezza della maſcella inferiore

dalla sua estremità anteriore fino all' orlo posteriore dell' apofisi con- diloidea —————	o.	5.	5.
Groffezza della parte anteriore dell' osso della mascella superiore ———	o.	o.	4 $\frac{1}{2}$
Larghezza della mascella superiore al sito dei denti canini —————	o.	1.	11.
Distanza tra le orbite e l'apertura delle nari —————	o.	1.	11.
Lunghezza della detta apertura ———	o.	1.	3.
Larghezza —————	o.	o.	7.
Larghezza delle orbite —————	o.	1.	3.
Altezza —————	o.	o.	11.
Altezza dei denti canini —————	o.	1.	4.
Larghezza del catino —————	o.	2.	3.
Altezza —————	o.	2.	9.
Lunghezza della prima falsa vertebra della coda, ch' è la più lunga ———	o.	o.	5.
Lunghezza dell' omoplata —————	o.	4.	3.
Lunghezza dell' umero —————	o.	7.	10.
Lunghezza dell' osso dell' ulna ———	o.	9.	5.
Lunghezza dell' osso del radio ———	o.	8.	6.
Lunghezza del femore —————	o.	9.	2.
Lunghezza della tibia —————	o.	8.	1.
Lunghezza del peroneo —————	o.	7.	6.
Lunghezza del prim' osso del meta- carpo, ch' è il più corto —————	o.	1.	4.
Lunghezza del terz' osso del metacar- po, ch' è il più lungo —————	o.	2.	1.

del Mandrillo. 203

pied. poll. lin.

Lunghezza del prim' osso del metatarso, ch' è il più corto	o.	1.	9.
Lunghezza del terzo, ch' è il più lungo	o.	2.	4.
Lunghezza della prima falange del pollice dei piedi anteriori	o.	o.	9.
Lunghezza della seconda falange	o.	o.	5.
Lunghezza della prima falange del terzo dito	o.	1.	4.
Lunghezza della seconda	o.	o.	10.
Lunghezza della terza	o.	o.	6.
Lunghezza della prima falange del pollice dei piedi di dietro	o.	o.	9.
Lunghezza della seconda	o.	o.	5.
Lunghezza della prima falange del terzo dito	o.	1.	2.
Lunghezza della seconda	o.	o.	9.
Lunghezza della terza	o.	o.	4 $\frac{1}{2}$



L'OVANDERO' (a)

ED IL LOWANDO (b).

Quantunque questi due animali ci sembrano esser d'una sola e medesima specie, pure non abbiain tralasciato di conservare a ciascun di loro il nome, che

(a) *Ovanderò*, *Wunderu*, nome di quest' animale in Ceilan, che noi abbiain adottato.

Simia ex Aegypto Venetias deducta. Prosp. Alpin. Vol. II., pag. 245. tab. 20.

Ovanderou, specie di scimia in Ceilan, ove sembra che ve ne sian due specie. *Relation de Ceylan*, par Knox. Tom I, pag. 105. e 111; fig. *ibid.*

Cercopithecus niger barba incana promissa. *Wanderu Zeylanensibus*. Ray, *Syst. quad.*, pag. 158.

Silenus simia caudata, barbata, corpore nigro, barba nivea, proluxa. Linn. *syst. nat.* edit. X., pag. 26.

NOTA. Mi pare che Linneo si sia ingannato riferendo a quest' animale la *simia callitriches magnitudine cynocephalorum* di Prospero Alpino, pag. 242; ella è evidentemente quella della pag. 245., ch' abbiain di sopra acennata: per accertarsene basta paragonar la figura, che noi qui ne diamo, con quella di Prospero Alpino.

Cercopithecus barbatus niger, barba incana, scimia nera dalla barba incana. Brisson, *regn. anim.*, pag. 207. **NOTA**. Ci sembra che la scimia indicata dal Sig. Brisson sotto il nome di *scimia nera d' Egitto*, pag. 209. sia la medesima che questa, tanto più che vi ha rapporto la sopracitata di Prospero Alpino, pag. 245.

(b) *Lowando*, *Elwandu*, nome di quest' animale in Ceilan, e che noi abbiain adottato. **NOTA**. 1. Ci

portano nel lor paese natío, in Ceilan, perchè formano per lo meno due razze distinte e costanti: l'ovanderò ha il corpo coperto di peli bruni e neri, con una larga capellatura e una gran barba bianca; al contrario il lowando ha il corpo coperto di peli biancastri colla capellatura e colla barba nera. Vi ha eziandio nello stesso paese una terza razza o varietà, che potrebb'essere per avventura il ceppo comune dell'altre due, perchè ha corpo, capellatura e barba d'un colore uniforme e interamente bianco. Questi tre animali non sono scimie, ma habbuini; ne hanno tutti e tre i caratteri sì per la figura come pel naturale; sono molto selvaggi ed anche un poco feroci; hanno il mulo allungato, la coda corta, e sono pressò a poco della stessa grandezza e della medesima forza che i papioni; hanno soltanto il corpo men raccolto, e sembrano più deboli nelle parti posteriori del corpo. Quello, di cui noi diamo la figura, ci era stato presentato

sembra ch'esso non sia che una varietà dell'ovanderò. *NOTA.* 2. Ci pare che in questi animali vi sia una seconda varietà; l'ovanderò ha il corpo nero e la barba grigia; il lowando ha il corpo grigio e la barba nera, e ve ne sono altri della medesima specie che hanno la barba e il corpo interamente bianchi.

Simia alba seu incanis pilis barba nigra promissa: Elwandum Zeylonensibus. Ray, *syst. quad.*, pag. 158,

sotto una falsa denominazione sì rispetto al nome che al clima. Le persone, che lo possedevano, ci dissero ch' esso proveniva dal continente dell' America meridionale, e che si chiamava *cayouvassou*. Ho ben presto compreso che questa parola *cayouvassou* è un termine brasiliano, che si pronunzia *sajouvassou*, e che significa *sapajou*, e che per conseguenza questo nome era stato male applicato, poichè tutt' i *sapajous* hanno lunghissime code, mentre l' animale, di cui qui si parla, è un babbuino di coda cortissima: d' altra parte in America non si trova non solamente questa specie, ma anche nessun' altra specie di babbuino; per conseguenza erasi preso errore anche nell' indicare il clima, e ciò avviene molto frequentemente, soprattutto a coloro che vanno intorno a far vedere Orsi e Scimie, i quali, quando ignorano il clima e il nome d' un animale, non mancano di applicargli una denominazione straniera, che, sia vera o falsa, è egualmente buona per l' uso che ne fanno. Del resto, questi babbuini ovanderò, quando non son domati, sono sì cattivi che fa d' uopo tenerli in una gabbia di ferro, ove spesso si agitano furiosamente; ma se vengono presi giovani, si addimesticano facilmente, e sembrano anche esser più suscettibili di educazione che gli altri babbuini. Gl' Indiani amano d' istruirli, e pretendono che le altre scimie,

cioè, i guenoni, rispettinò molto questi babuini, i quali hanno maggior gravità, e maggior intendimento che quelli. Nel loro stato di libertà (a) sono estremamente selvaggi e se ne stanno ne' boschi (b). Se prestasi fede a' Viaggiatori, quelli, che sono affatto

(a) Nel Malabar si trovano quattro specie di scimmie; la prima tutto nera, col pel lustro, con una barba bianca che gli cinge il mento, e che ha un palmo e più di lunghezza: le altre scimmie hanno tanto rispetto per questa specie, che s'umiliano alla sua presenza come se fossero capaci di riconoscere in essa qualche superiorità. I Principi e i Grandi hanno in grande stima queste scimmie dalla barba, che sembran essere di maggior gravità e di maggior intendimento fornite che le altre. Vengono esse educate a far delle cerimonie e de' giuochi, e gli apprendono sì facilmente ch'ella è una cosa mirabile. *Voyage du Père Vincent Marie*, cap. 13., pag. 405., traduit par M. le Marquis de Montmirail.

(b) In Ceilan si trovano delle scimmie sì grandi come i nostri bracchi, che hanno il pel grigio, il viso nero con una gran barba bianca da un' orecchia all'altra... Se ne veggono altre della medesima grossezza, ma d'un color differente; esse hanno il corpo, il viso e la barba d'una somma bianchezza: sono tutte per altro chiamate col nome d'ovanderò, perchè siffatta differenza di colore non sembra cangiarne la specie. Esse recano poco male alle terre coltivate, e se ne stanno ordinariamente ne' boschi ove non vivono che di foglie e di germogli; ma allorchè vengon prese, mangiano di tutto. *Relation de Knox*. Tom. I., pag. 107. & 111. *Histoire générale des Voyages*. Tom. VIII., pag. 545.

208 *Stor. Nat. dell' Ovanderò, ec.*

bianchi, sono i più forti e i peggiori di tutti; sono ardentissimi per le donne, e abbastanza forti per violarle quando le trovano sole (a), e sovente le oltraggiano a segno di farle morire.

Caratteri distintivi di questa specie.

L'ovanderò ha delle borse al basso delle guance, delle callosità sulle natiche, la coda lunga sette o otto pollici, i denti canini più lunghi e più grossi di quelli dell'uomo, il muso grosso e allungato, la testa circondata d'una larga chioma e d'una gran barba di peli ruvidi, il corpo assai lungo e molto sottile al basso. In questa specie vi hanno delle razze che variano pel colore del pelo; gli uni hanno quello del corpo nero, e la barba bianca; gli altri hanno il pelo del corpo biancastro e la barba nera. Essi camminano più spesso a quattro piedi che a due, ed hanno tre piedi o tre piedi e mezzo d'altezza quando stanno ritti sul corpo. Le femmine sono soggette ai periodici meltrui.

DE-

(a) Le scimmie bianche, che talvolta sono sì grandi e sì cattive, come i cani atani più grossi d'Inghilterra, sono più dannose delle nere. Esse recano molto male principalmente alle donne, e spesso volte dopo aver loro fatti cento oltraggi, finalmente le strangolano. Talora s'innoltrano fino alle abitazioni, ma i *Mucacareù*, che sono gelosissimi delle loro donne, non usano la compiacenza di permettere l'ingresso nelle loro case a sì perniziosi galanti, e li cacciano a colpi di battono. *Description du Mucacaré*, pag. 50.

DESCRIZIONE

DELL' OVANDERO'.

HO veduto quest' animale [tav. XVIII.] alla fiera di San-Lorenzo in una gabbia, in cui era strettamente ferrato a cagione della sua ferocia. Egli era rimarchevole per una grandissima barba grigia, ch' era molto apparente, perchè il resto del corpo aveva un color nero; esso era più fino di quello della barba, che occupava non solo il mento, ma anche le guance; essa era alquanto riccia, e aveva un miscuglio di bruno e di grigio sulle guance, e solamente del grigio sul mento. Non so se questo colore provenisse dall' età, ma assicuravasi che quest' animale non aveva che diciotto mesi. Sul disopra della testa eravi un ciuffo nero in forma di spiga. Sul petto eranvi due mammelle. Le ugne erano piatte e nere. La coda era molto corta, e le natiche pelate.

pied. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero, misurato in linea retta dall' estremità del muso fino all' ano —————			2.	0.	0.
Circonferenza dell' estremità del muso			0.	6.	0.
Contorno dell' apertura della bocca —			0.	3.	10.
Distanza tra l' estremità del muso, e l' angolo anteriore dell' occhio —			0.	2.	0.
Distanza tra gli angoli anteriori de-					
Tom. XXVIII.			L.		

210 *Descriz. dell' Ovanderò.*

	<i>pied. poll. line.</i>
gli occhi —————	o. o. 9.
Lunghezza delle orecchie ———	o. 1. 6.
Larghezza della base misurata sulla curvatura esteriore —————	o. 1. o.
Circonferenza del collo ———	1. o. o.
Circonferenza del corpo, presa die- tro le gambe anteriori ———	o. 1. 2.
La stessa circonferenza dinanzi le gambe posteriori —————	o. 10. o.
Lunghezza del tronco della coda —	o. 7. o.
Circonferenza all' origine ———	o. 2. 6.
Lunghezza dell' avan-braccio dal go- mito fino alla giuntura della mano	o. 11. 6.
Circonferenza della giuntura ———	o. 4. o.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle ugne ———	o. 4. o.
Lunghezza della gamba dal ginocchio fino al tallone —————	o. 7. o.
Lunghezza dal tallone fino all' estre- mità delle ugne —————	o. 6. o.



IL MAIMONE (a).

LE scimie, i habbuini e i guenoni formano tre schiere, che lasciano tra esse due intervalli; il primo è riempito dal magot, e il secondo dal maimone; questo fa il digradamento tra i habbuini e i guenoni, come il magot lo fa tra le scimie e i habbuini: in fatti il maimone rassomiglia anche ai habbuini pel suo grosso e largo muso, e per la sua coda corta e arcuata; ma è diverso da essi e s'accosta ai guenoni per la sua statura, ch'è molto inferiore a quella dei habbuini. Il Sig. Edwards ci ha data la figura e la descrizione di quest'animale sotto la denominazione di *Scimia della coda di porco*. Quello carattere particolare basta per farlo distinguere, poichè fra tutt' i habbuini e i guenoni esso è il solo che abbia la coda nuda, sottile e tortuosa come quella del porco: è presso a poco della grandezza del magot, e rassomiglia sì grandemente al macaco che si potrebbe prenderlo per una varietà di

L 2

(a) Maimone. *Maimonct*, nome che negli ultimi secoli è stato dato alle scimie dalla coda corta, e che noi abbiamo applicato a questa scimia, aspettando che si venga a sapere il nome, ch'essa porta nel suo paese natìo, in Sumatra, e nelle altre provincie dell'India meridionale. La scimia dalla coda di porco. *Glanures d'Edwards*, pag. 8., fig. *ibid.*

quella specie, se la sua coda non fosse affatto differente: ha la faccia nuda e di color lionato, gli occhi castani, le palpebre nere, il naso piatto, le labbra sottili con alcuni peli ruvidi, ma troppo corti per fare un mustacchio apparente. Quell' animale non ha, come le scimie e i babbuini, le borse all' esterno e la verga sporgente; il tutto è nascosto sotto la pelle, e perciò il maimone, benchè vivacissimo e pieno di fuoco, non ha punto della sfacciata petulanza dei babbuini. E esso è mansueto, trattabile ed anche carezzevole; trovasi in Sumatra e verosimilmente nelle altre provincie dell' India meridionale, per lo che egli soffre con istento il freddo del nostro clima. Quello che noi abbi- am veduto in Parigi, non ha vivuto che poco tempo, e il Sig. Edwards dice di non aver conservato che un anno in Londra quello, che ha descritto (a).

(a) La scimia dalla coda di porco dell' Isola di Sumatra nel mar delle Indie fu portata in Inghilterra nel 1752..... Essa era estremamente vivace e attiva; s'accostava alla grossezza d'un gatto domestico ordinario era un maschio ha vivuto un anno nelle mie mani: incontrai una femmina della medesima specie, che si faceva vedere per curiosità in Londra, ed era la metà più grande del mio maschio; essi parvero molto consolati di vederli insieme, benchè questa fosse la prima volta che si vedessero. *Gleanures d' Edwards*, pag. 8. e 9.

Caratteri distintivi di questa specie.

Il maimone ha delle borse al basso delle guance e delle callosità sulle natiche; ha la coda nuda, ripiegata e lunga cinque o sei pollici; i denti canini più lunghi a proporzione di quelli dell'uomo; il muso larghissimo, e le orbite degli occhi molto sporgenti al di sopra; le orecchie, le mani e i piedi nudi e di colore scarnatino; il pelo d'un nero-uliva sul corpo, e d'un giallo rofficcio sul ventre. Egli cammina or su due piedi ed or su quattro: ha due piedi o due piedi e mezzo d'altezza quando è ritto in piedi. La femmina è soggetta ai mestruai periodici.



DESCRIZIONE DEL MAIMONE.

Quest' animale [tav. XIX.] è di mezzana statura; ha il muso lungo e la testa grossa a proporzione del corpo; ma il muso è anche più grosso relativamente alla grossezza della testa. Le orbite degli occhi son molto sporgenti nella loro parte superiore: il naso altresì è notabilmente sporgente alla sua origine tra i due occhi, ma nel resto della sua estensione è quasi interamente piatto, eccettuato sull' estremità ch' è alquanto rilevata. Il tramezzo delle nari ha pochissima grossezza, e per conseguenza le loro aperture si trovano situate sotto il naso. Le orecchie son di mediocre grandezza, e terminano all' alto con una piccola punta tuberculosa, come nei macachi e in varj altri animali di questo genere. L' estremità e 'l disopra del muso, il contorno degli occhi, le orecchie, la pianta dei piedi, e i diti quasi interamente sono sforniti di pelo. La pelle di tutte queste parti e del resto del corpo è di colore scarnatino. La coda è cortissima, e molto sottile, massimamente all' estremità; essa ha poco pelo, è quasi interamente nuda sul lato inferiore e si curva all' infotto come quella d'un porco; perciò si è dinotata questa scimia col nome di *Scimia colla coda di porco*: ha delle borse nella bocca e delle

Descrizione del Maimone . 115

callosità sulle natiche . Il numero dei denti è di trentadue ; i canini non son più lunghi degli altri . La ghianda è diversa da quella della maggior parte delle altre scimie per la forma della sua estremità ; essa termina con tre tubercoli , due de' quali sono allungati e situati su i lati , il terzo è rotondo , più piccolo degli altri due e situato sul dinanzi ; tra questi tre tubercoli si trova l'orifizio dell' uretra . Questa scimia è parimente diversa dalle altre perchè non ha la verga sporgente che nel tempo dell' erezione ; non ha borse ; i suoi testicoli son situati sotto la pelle , l'uno all' allato dell' altro , al dinanzi della verga . Sull' estremità del muso , al sito delle sopracciglia e al disotto del naso vi sono de' peli lunghi , rari e neri . Il pelo della fronte , della testa , del disopra del collo , del garrot , del dorso , dei lombi e del lato superiore della coda è mischiato di color olivastro e di nero . I lati della testa e del corpo , e la faccia esterna del braccio , dell' avan-braccio , della coscia e della gamba sono di colore olivastro , eccettuato il basso della gamba ch'è nero vicino al tallone . Il pelo del disotto e dei lati del collo , del petto , del ventre e della faccia interiore delle quattro gambe è raro e di color gialliccio , con una tinta di rosso sul ventre e sulle cosce .

pie'd. poll. lin.

Lunghezza del corpo intero , misu-

rato in linea retta dall' estremità

del muso fino all' ano ————— 4. 4. 8.

pied. poll. lin.

La stessa circonferenza al sito più grosso	1.	1.	0.
La stessa circonferenza dinanzi le gambe di dietro —————	0.	8.	6.
Lunghezza del tronco della coda —	0.	5.	4.
Circonferenza all' origine ————	0.	2.	3.
Lunghezza dell' avan-braccio dal gomito fino alla giuntura della mano	0.	6.	0.
Circonferenza della giuntura ———	0.	3.	1.
Lunghezza dalla giuntura fino all' estremità delle ugne —————	0.	3.	8.
Lunghezza della gamba dal ginocchio fino al tallone —————	0.	6.	7.
Lunghezza dal tallone fino all' estremità delle ugne —————	0.	5.	5.

Apprendo l' addomine ho veduto che l' epiploon s' estendeva fino al pube . Il fegato era interamente nel lato destro , e lo stomaco a sinistra .

Il duodeno s' estendeva fino al rene . Il digiuno faceva i suoi giri nella regione epigastrica e nell' ombelicale . I giri dell' ileo erano nella regione lombare destra , nell' ombelicale , nella lombare sinistra e nell' iliaca dello stesso lato : in seguito l' ileo passava nell' ipogastro e metteva capo al cieco nell' iliaca destra . Il cieco era situato in questa regione e diretto obbliquamente verso il pube . Il colon s' estendeva all' innanzi nella regione lombare destra e nell' ipocondro dello stesso lato fino all' epigastro , da dove si prolungava all' indietro e in seguito all' innanzi facendo de'

gran giri; finalmente si univa al retto senza aver curvatura come nell' uomo.

Il pancreas e lo stomaco eran poco diversi dallo stomaco e dal pancreas dell' uomo. M' è paruto che il fondo dello stomaco avesse minor diametro che nell' uomo.

Il cieco era più lungo di quello dell' uomo, e non aveva punto d'appendice vermicolare. Il retto non era grosso, e in generale le membrane avevan minor grossezza che nell' uomo.

Il fegato aveva quattro lobi; il più grande era situato nel mezzo e diviso in due parti ineguali per via d'una profonda scissura, in cui si trovava il legamento sospensorio. La veseichetta del fiele era incrostata nella faccia posteriore della porzion destra di questo lobo, ch' era il più grande. Eravi un lobo a sinistra e due a destra: il lobo posteriore del lato destro era il più piccolo di tutti. Nel fegato vi erano varj idatidi, i più grossi de' quali avevano fino a un pollice e mezzo di diametro, e rinchiudevano altri idatidi più piccoli, che avevan ciascuno il loro *kisto*; trovavansi pure de' kisti rotondi e rinchiusi in ciascuno dei detti idatidi. La veseichetta del fiele era allungata. La milza conteneva un grossissimo idatide, che la rendeva difforme, e che aveva più d'un pollice, e mezzo di diametro.

Il rene sinistro era più inoltrato che 'l destro della metà in circa della sua lunghezza: essi eran poco diversi da quelli dell' uomo per la loro for-

ma, per la loro cavità, per la loro piccola pelvi ec.

Il polmon destro era composto di quattro lobi, e il sinistro di due come nella maggior parte dei quadrupedi. Il cuore aveva la punta alquanto rivolta a sinistra, e rassomigliava molto a quello dell' uomo per la sua figura. Dall' arco dell' aorta non uscivano che due rami, ma il più grosso si divideva in altri due rami a una piccola distanza dalla sua origine.

La lingua era men larga e più lunga di quella dell' uomo, e men grossa all' estremità: era coperta di piccolissime papille e di grani bianchi e glandulosi; sulla parte posteriore vi erano alcune piccole glandole a calice, disposte sopra due file obbliquamente dirette dall' innanzi all' indietro e dall' infuori all' indentro, due a destra, tre a sinistra ed una all' angolo formato dalle due file.

La ghianda della verga terminava con un fungo, come negli altri animali di questo genere. I testicoli eran quasi rotondi: i canali deferenti avevano presso a poco lo stesso diametro in tutta la loro lunghezza. Le vescichette seminali eran grandi e ben formate. Le prostrati avevan poco volume; e la vescica era allungata.

ped. poll. lin.

Lunghezza degl' intestini tenui dal

piloro fino al cicco ————— 7. 6. o.

Circonferenza del duodeno ————— o. 1. 6.

Circonferenza del digiuno ————— o. 2. o.

Circonferenza dell' ileo nei siti più

	pied. poll. lin.		
grossi —————	o.	2.	o.
Circonferenza nei siti più sottili —	o.	1.	6.
Lunghezza del cieco —————	o.	2.	6.
Circonferenza del cieco al sito più grosso —————	o.	5.	9.
Circonferenza al sito più sottile —	o.	3.	o.
Circonferenza del colon nei siti più grossi —————	o.	5.	o.
Circonferenza nei siti più sottili —	o.	3.	o.
Circonferenza del retto vicino al colon	o.	1.	9.
Lunghezza del retto e del colon presi insieme —————	3.	9.	o.
Lunghezza del canale intestinale in intero, non compreso il cieco —	11.	3.	o.
Gran circonferenza dello stomaco —	1.	o.	9.
Piccola circonferenza dello stomaco —	o.	9.	10.
Lunghezza della piccola curvatura, dall' angolo, che forma la parte destra, fino all' esofago ———	o.	2.	o.
Profondità del fondo dello stomaco —	o.	2.	2.
Circonferenza dell' esofago ———	o.	1.	3.
Circonferenza del piloro ———	o.	1.	6.
Lunghezza del fegato ———	o.	3.	6.
Larghezza ———	o.	5.	o.
La sua maggior grossezza ———	o.	1.	o.
Lunghezza della vescichetta del fiele	o.	2.	5.
Il suo maggior diametro ———	o.	o.	7.
Lunghezza dei reni ———	o.	1.	6.
Larghezza ———	o.	1.	2.

Gros-

pied. poll. lin.

Groffezza	o. o. 7.
Lunghezza del centro nervoso dalla vena-cava fino alla punta	o. o. 10.
Larghezza	o. 1. 6.
Circonferenza della base del cuore	o. 4. o.
Altezza dalla punta fino all' origine dell' arteria polmonare	o. 1. 7.
Altezza dalla punta fino al sacco pol- monare	o. 1. 3.
Diametro dell' aorta preso esterior- mente	o. o. 3.
Lunghezza della lingua	o. 2. 6.
Lunghezza della parte anteriore, dal freno fino all' estremità	o. o. 8.
Larghezza della lingua	o. 1. o.
Lunghezza della ghianda	o. o. 11.
Circonferenza	o. o. 8.
Circonferenza del fungo	o. o. 10.
Lunghezza della verga, dalla bifor- cazione dei corpi cavernosi fino all' inserzione del prepuzio	o. 1. 10.
Circonferenza	o. o. 8.
Lunghezza dei testicoli	o. o. 6.
Larghezza	o. o. 5.
Groffezza	o. o. 4.
Larghezza dell' epididimo	o. o. $2\frac{1}{2}$.
Lunghezza dei canali deferenti	o. 4. 3.
Diametro nella maggior parte della loro estensione	o. o. $0\frac{1}{2}$.

	pied.	poll.	lin.
Gran circonferenza della vescica —	o.	5.	10.
Piccola circonferenza —————	o.	4.	3.
Lunghezza delle vescichette feminali b.	1.	1.	
Larghezza —————	o.	o.	3. $\frac{1}{2}$
Groffezza —————	o.	o.	1 $\frac{1}{2}$

Il maimone ha maggior relazione al macaco che al papione e al mandrillo per la forma della testa scarnata (*): gli orli però delle orbite degli occhi sono men grossi e meno elevati; il cranio è molto più grande; le coste dell' occipite son meno sporgenti, e gli angoli, che formano i rami della mascella inferiore, sono men rotondi.

I denti sono nello stesso numero che quelli del macaco, ma ne son molto diversi per la figura. I due incisivi del mezzo di ciascuna mascella del maimone son più larghi di quelli del macaco. I canini son piccolissimi.

Le vertebre dorsali e lombari, le coste e gli ossi dello sterno, rassomigliano a quelli del macaco pel numero, per la forma e per le articolazioni. I fori ovali son più lunghi.

La coda è composta di venti o ventuna false vertebre; le tre o quattr' ultime di esse sono estremamente piccole; le altre hanno sì poca lunghezza che la coda è cortissima, benchè abbia un numero assai grande di false vertebre.

Le

(*) Vedi nel Tomo XXIX. la descrizione dello scheletro del macaco.

Le clavicole sono men lunghe e più grosse di quelle del macaco . Gli ossi delle gambe son più lunghi e men curvi . Gli ossi del metacarpo , del metatarso e le falangi dei diti son pure più lunghe di quelle del macaco .

pieđ. poll. lin.

Lunghezza dall' estremità delle mascelle fino all' occipite ———	o. 4. 5 $\frac{1}{2}$
La maggior larghezza della testa —	o. 2. 7.
Lunghezza della mascella inferiore dalla sua estremità anteriore fino all' orlo posteriore dell' apofisi condiloidea ———	o. 3. 1.
Grosshezza della parte anteriore dell' osso della mascella superiore ———	o. o. 4.
Larghezza della mascella superiore al sito dei denti canini ———	o. 1. 4.
Distanza tra le orbite e l'apertura delle nari ———	o. o. 7 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della detta apertura ———	o. o. 7 $\frac{3}{4}$
Larghezza ———	o. o. 4 $\frac{1}{2}$
Lunghezza degli ossi proprj del naso ———	o. o. 9 $\frac{1}{2}$
Larghezza al sito più largo ———	o. o. 1 $\frac{1}{2}$
Larghezza delle orbite ———	o. 1. o.
Altezza ———	o. o. 10.
Lunghezza dei denti canini ———	o. o. 3 $\frac{1}{2}$
Larghezza del catino ———	o. 1. 5.
Altezza ———	o. 1. 11.
Lunghezza delle più lunghe false vertebre della coda ———	o. o. 3.

224 *Descrizione del Maimone.*

	<i>pied. poll. lin.</i>	
Lunghezza dell' omoplata —————	o.	2. 9.
Lunghezza dell' umero —————	o.	5. 3.
Lunghezza dell' osso dell' ulna ———	o.	5. 10.
Lunghezza dell' osso del radio ———	o.	5. 3. $\frac{1}{2}$
Lunghezza del femore —————	o.	5. 9 $\frac{1}{2}$
Lunghezza della tibia —————	o.	5. 5.
Lunghezza del peroneo —————	o.	4. 10.
Lunghezza del prim' osso del meta- carpo, ch' è il più corto —————	o.	o. 9.
Lunghezza del terz' osso del metacar- po, ch' è il più lungo —————	o.	1. 3.
Lunghezza del prim' osso del meta- tarso, ch' è il più corto —————	o.	1. 1.
Lunghezza del terzo, ch' è il più lungo —————	o.	1. 6.
Lunghezza della prima falange del pollice dei piedi anteriori —————	o.	o. 5 $\frac{x}{2}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o. 3.
Lunghezza della prima falange del terzo dito —————	o.	o. 11.
Lunghezza della seconda —————	o.	o. 7.
Lunghezza della terza —————	o.	o. 4.
Lunghezza della prima falange del pollice dei piedi posteriori ———	o.	o. 6 $\frac{x}{5}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o. 3 $\frac{x}{2}$
Lunghezza della prima falange del terzo dito —————	o.	o. 11 $\frac{x}{2}$
Lunghezza della seconda —————	o.	o. 7 $\frac{x}{2}$
Lunghezza della terza —————	o.	o. 4.

DESCRIZIONE

DELLA PARTE DEL GABINETTO

Spettante alla Storia Naturale

DEI BABBUINI.

Num. MCCCII.

La pelle d'un papione.

Questa è la pelle d'un papion grande, ed è imbottita. I colori del pelo rassomigliano a quelli del papione, che ha servito di soggetto per la descrizione di quest' animale.

Num. MCCCIII.

Lo scheletro d'un papione.

Questo è lo scheletro d'un papion grande, ed ha servito di soggetto per la descrizione e per le misure degli ossi di quest' animale.

Num. MCCCIV.

Altro scheletro di papione.

Questo scheletro fu tolto da un papione di piccola statura, ma adulto; poichè le restie ossie dell' occipite e del cranio son più grosse e più sporgenti che sullo scheletro precedente. Quello di cui ora si parla, n'è diverso per la forma dei lati della mascella, che son meno incavati. L'osso sacro è composto di quattro false vertebre, e la coda di diciassette, la quale sembra essere intera: quantunque nell' osso sacro di questo scheletro vi sia una falsa vertebra di più che in quello dello scheletro precedente, pure questa differenza può non essere che una varietà fra individui d'una medesima specie: essa si trova nella specie umana.

226 *Descrizione del Gabinetto.*

Num. MCCCIV.

Altro scheletro di papione.

Questo terzo scheletro è anche men grande del secondo, e la testa è a proporzione men grossa. Appajono sopra alcuni ossi le giunture delle epifisi: sull'occipite non vi ha che una piccola resta trasversale: gli orli delle orbite degli occhi sono poco sporgenti e hanno poca grossezza: i denti canini son corti ec. Vi ha luogo a credere che questo scheletro provenga da una femmina giovane di papione: bench' esso sia più piccolo e men formato che i due precedenti, nondimeno vi ha da ciascun lato del naso una prominenzia ossea più grande che negli altri due.

Num. MCCCVI.

Oss. della verga d'un papione.

Quest' osso proviene da un papione della razza piccola: ha un mezzo pollice di lunghezza e due terzi di linea di diametro: è quasi diritto e di figura tirante alla cilindrica.

Num. MCCCVII.

Lo scheletro d'un mandrillo.

Num. MCCCVIII.

Lo scheletro d'un maimone.

LE descrizioni e le misure di questo scheletro, e di quello ch'è riferito sotto il numero precedente, fanno parte delle descrizioni del mandrillo e del maimone.

Fine del Tomo XXVIII.

INDICE.

<i>Nomenclatura delle Scimie.</i>	pag. 3
<i>Gli Orang-outang , o sia il Pongo ed il</i>	
<i>Jocko .</i>	50
<i>Il Piteco .</i>	99
<i>Il Gibbone .</i>	108
<i>Il Magot .</i>	130
<i>Il Papione o Babbuino propriamente det-</i>	
<i>to .</i>	159
<i>Il Mandrillo .</i>	185
<i>L'Ovanderò ed il Lowando .</i>	204
<i>Il Maimone .</i>	211

Di M. de Buffon .

<i>Descrizione del Jocko .</i>	85
<i>Descrizione del Gibbone .</i>	113
<i>Descrizione del Magot .</i>	136
<i>Descrizione della parte del Gabinetto spettante alla Storia Naturale delle Sci-</i>	
<i>mie .</i>	156
<i>Descrizione del Papione .</i>	166
<i>Descrizione del Mandrillo .</i>	190
<i>Descrizione dell' Ovanderò .</i>	209
<i>Descrizione del Maimone .</i>	214
<i>Descrizione della parte del Gabinetto spettante alla Storia Naturale dei Babbui-</i>	
<i>ni .</i>	225

di M. Daubenton .

1910

1910

1910

1910

1910

1910

1910

1910

1910

1910


1910


1910

1910


1910

1910






L' JOCKO.



IL GRAN GIBBONE.

1847

1847



PICCOLO GIBBONE.






Fig. 1.






Fig. 3.




Fig. 2.















IL MAGOT.





IL MAGOT










Fig. 3.



Fig. 2.





7


1871

1871

1871

1871

1871






THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS







IL GRAN PAPIONE





IL PICCOL PAPIONE








IL MANDRILLO MASCHIO








MANDRILLO FEMMINA



OVANDERO





MAIMONE





2056D



